# SYSTÈME NATUREL
## DU
# *REGNE ANIMAL.*

*Omne quod vocavit Adam, ipsum est nomen ejus.*

*Apellavit Adam nominibus suis cuncta Animantia, & universa Volatilia cæli, & omnes Bestias terræ.*

Gen. c. II. ℣. 19. 20.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30528008_0001

JACOBUS THEODORUS KLEIN

*Secr. Civ. Gedan. Soc: Reg. Lond.*

*Et Acad. Scient. Bonon. Sodalis. Æt. LIX. 1743.*

*Maisonneuve. Sculps. 1764. Lut. Paris*

# SYSTÊME NATUREL
## DU
# *REGNE ANIMAL,*
PAR

CLASSES, FAMILLES OU ORDRES, GENRES ET ESPECES.

AVEC

*UNE NOTICE DE TOUS LES ANIMAUX;*

Les noms Grecs, Latins, & vulgaires, que les Naturaliſtes leur ont donnés;

Les citations des Auteurs qui en ont écrit;

Une Table pour chaque Claſſe, qui déſigne la Famille ou l'Ordre, le Genre & l'Eſpece, de chaque Animal.

*Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.*

TOME PREMIER.

*CONTENANT les Claſſes des QUADRUPEDES, OISEAUX, AMPHIBIES, ſuivant la méthode de M. KLEIN; avec une Notice de celle de M. LINNÆUS ſur ces mêmes Animaux; & l'Ordre des POISSONS ſuivant la diviſion d'ARTEDI.*

[Par François Alexandre AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS]

A PARIS,

*Quay des Auguſtins,*

Chez Cl. J. B. BAUCHE, Libraire, à Sainte Geneviéve, & à S. Jean dans le déſert.

M. DCC. LIV.

*AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.*

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

# PRÉFACE.

*L'Hiſtoire des Animaux par* ARISTOTE *paſſe pour l'Abrégé le plus ſavant que nous ayons.* PLINE *eſt grand dans tout ce qu'il a écrit ſur la Nature & ſur les Sciences. L'un & l'autre n'ont traité que l'hiſtorique de la vie & des meurs des Animaux ; & ils ont paru, dit M.r de* Buffon, *en négliger les deſcriptions, quoique très-capables de les bien faire. Ainſi ces deux Anciens (on le peut dire) ont jetté les premiers fondemens de* l'Hiſtoire Naturelle. GESNER, ALDROVANDE, JONSTON, *& les autres, y ont joint des deſcriptions. Ces Auteurs célebres, mais épris du merveilleux, & Ecrivains prolixes, en donnant pour Animaux réels des Animaux imaginaires, en rapportant dans l'Hiſtoire de ceux qui ſont exiſtans, des faits incroyables, en mêlant des choſes tout-à-fait étrangères à la matière qu'ils ont traitée, ont fait de trop immenſes volumes ſous la forme d'une diſtribution méthodique.*

*Il faut l'avouer, ſi la lecture d'*ARISTOTE *&* de PLINE *donne un grand goût pour l'étude de* l'Hiſtoire Naturelle, *ce goût n'eſt plus le même dans les Ouvrages écrits depuis eux, par l'obſcurité dans les faits, l'inexactitude dans les deſcriptions, & le faux qui s'y trouve, mêlé avec le vrai. De-là la peine & la patience qu'il faut eſſuyer pour diſtinguer un Animal d'avec un autre, & en connoître la vie & les mœurs. Ce n'eſt pas tout, les Grecs ont donné aux Animaux qui leur etoient connus, des noms convenables.* PLINE, *vû la diſette de ſa langue, les a latiniſés. Les Ecrivains des derniers ſiécles & les Voyageurs, ſuivant les pays où ils ont écrit, y en ont ajouté d'autres, & en multipliant les noms, ont ſouvent auſſi multiplié le même Animal, & l'ont repréſenté, ou ſous diffé-*

*rentes formes, ou sous différens caractères. Tel est, par exemple, l'*Abada *des Indes, Animal à qui chaque Voyageur a donné un nom particulier, & qui n'est autre, malgré un grand nombre de descriptions, toutes différentes les unes des autres, que le* Rhinoceros. *Ce n'est donc qu'en se familiarisant avec les Modernes, en lisant leurs descriptions, faites sur des découvertes & des observations répétées, que l'on peut connoître & les erreurs des Anciens, & celles qu'ont commises certains Historiens Naturalistes & Voyageurs, qui se sont contentés de compiler sans scrupule.*

*Un* Dictionnaire de tous les Animaux *que je prépare depuis plusieurs années, & que le même Libraire doit incessamment mettre sous presse, m'a mis à portée de faire ces rémarques. Le* Système Naturel *du Regne Animal que je donne aujourdui, en est l'annonce, & comme l'abregé; mais il ne renferme qu'une simple notice de tous les Animaux connus, leurs différens noms, & les citations des Auteurs qui en ont écrit. Pour les descriptions, on aura recours au Dictionnaire.*

*On trouve dans la* Genese *les Animaux divisés en Quadrupedes, Oiseaux, Reptiles, & Poissons.* ARISTOTE *s'est aussi contenté de divisions simples & générales. Pour* PLINE, *son* Histoire Naturelle *est une compilation de tout ce qui a été écrit avant lui sur les Animaux, les Plantes, les Minéraux, le Ciel, la Terre, les Sciences & les Arts. Cet Ancien n'a point eu l'idée d'aucune méthode.* BELON *sur les Oiseaux,* RONDELET *sur les Poissons, comme* ARISTOTE, *se sont tenus aux divisions générales.* GESNER, ALDROVANDE, JONSTON, CHARLETON, RAI, *Messieurs* LINNÆUS & KLEIN, *ont distribué les Animaux par Classes, Ordres ou Familles, Genres & Especes. Messieurs de* BUFFON & DAUBANTON *ont trouvé leurs méthodes défectueuses. L'ordre le plus simple & le plus éloigné de toute dis-*

*tribution méthodique, eſt celui que ces deux Savans ſuivent dans leur Hiſtoire Naturelle*

*Cependant, comme mon* Dictionnaire des Animaux *ſera accompagné d'un Volume de Planches, & que ces Planches rangées par Claſſes, doivent auſſi l'être par Familles, Genres & Eſpeces, je n'ai pû me diſpenſer d'adopter un ordre méthodique. Je préfere aux autres celui de M.* KLEIN *pour les Quadrupedes, Oiſeaux & Amphibies, & celui d'*ARTEDI *pour les Poiſſons, en faiſant connoître en même-tems l'arrangement de M.* LINNÆUS. *Ainſi ce ſont ces trois Naturaliſtes que je donne dans le premier Volume du* Syſtême Naturel du Regne Amimal. *Le ſecond contient les* Inſectes *& les* Vers, *ſuivant la diviſion qu'en a fait M.* LINNÆUS. *C'eſt en abregé ſa* Fauna Suecica *pour les* Inſectes *& pour les* Vers, *dont je fais connoître toutes les Eſpeces qu'il a obſervées. Pour l'Hiſtoire étendue & circonſtanciée des* Abeilles, *des* Chenilles *& de leurs* Papillons, *des* Guêpes, Fourmi-Lion, Ichneumons, Mouches *à quatre & à deux ailes*, &c. *pour celle de* certains Vers ſinguliers, *comme du* Tænia, *on conſultera le* Dictionnaire des Animaux.

*M.* LINNÆUS *a mis les* Cruſtacés *dans la Claſſe des* Inſectes, *& les* Teſtacés *dans celle des Vers. Je n'ai rien changé de ſa méthode. Je le ſuis ſcrupuleuſement pour la ſeconde partie du* Syſtême du Regne Animal. *Mais je dois avertir que dans la diſtribution des Planches du* Dictionnaire des Animaux, *on trouvera les* Cruſtacés *ſéparés d'avec les* Inſectes, *& les* Teſtacés *d'avec les* Vers. *Toutes les* grandes Bêtes marines, *je veux dire le Genre des* Baleines, *connues ſous le nom de* Cetacés, *comme Animaux vivipares, feront auſſi dans l'ordre des Planches une Claſſe particuliere : car il m'a ſemblé que les* Cétacés, Cruſtacés, & Teſtacés, *méritoient bien, les premiers, d'être diſtingués des* Poiſſons Ovipares ; *les ſeconds, des* Inſectes ; *les troiſiémes, des* Vers ; *quoiqu'à*

*proprement parler, les* Baleines, *le* Nerwal *des Iſlandois, le* Dauphin, *l'*Eſpadon, *&c. ſoient véritablement des Poiſſons ; les* Ecreviſſes, *les* Cancres, les Houmars *des eſpeces d'*Inſectes *de mer & de riviere ; les* Huitres, *les* Chames, *les* Moules, *les* Limaçons, *&c. des eſpeces de* Vers *enfermés dans leur coquille.*

*Peut-être que quelqu'un trouvera à redire ſur le titre de* Syſtême Naturel du Regne Animal, *que je donne à cet Ouvrage. Voici ma réponſe. La méthode de M.* KLEIN *que je ſuis pour les* Quadrupedes, *les* Oiſeaux, *& les* Amphibies ; *l'*Ichthyologie *d'*ARTEDI, *qui ſans contredit eſt ce que nous avons de meilleur ſur les* Poiſſons ; *m'ont paru très-*naturelles, *ainſi que la diviſion des* Inſectes *& des* Vers *par M.* LINNÆUS,

*Quand des Savans qui travaillent, les uns à marquer les Genres & les caractères des Quadrupedes & des Oiſeaux, les autres à étudier les Inſectes & leur maniere de vivre, auront fait part au Public de leurs Obſervations & nouvelles Méthodes, j'en profiterai alors pour corriger ce que je trouverai défectueux dans ce que j'aurai dit d'après Meſſieurs* LINNÆUS *&* KLEIN.

*Les Planches qui ſont à la tête de chaque Claſſe des Animaux, ſont celles qui ſe trouvent dans le* Syſtême de la Nature *de M.* LINNÆUS ; *elles font voir du premier coup d'œil ſa diſtribution. Je donne l'explication de chacune de ces Planches, c'eſt-à-dire, à la tête du premier Volume celle des Quadrupedes, Oiſeaux, Amphibies & Poiſſons ; & à la tête du ſecond, celle des Inſectes & des Vers.*

# *EXPLICATION DES PLANCHES*

## Qui ſont à la tête de chaque Claſſe de ce premier Volume du Syſtême Naturel du Regne Animal.

*Ce ſont les mêmes que celles que M. LINNÆUS a fait mettre dans ſon Syſtême de la Nature.*

### PLANCHE PREMIERE. *Tom. I. p.* 1.

### *QUADRUPEDES.*

1. Tête d'un Animal à figure humaine, de l'Ordre des Anthropomorphites, *Anthropomorpha.* Ce ſont les Singes, & le Bradype ou Pareſſeux, à la tête deſquels il met l'Homme.

2. Tête d'un Animal de l'Ordre des *Feræ*, Bêtes féroces: tels ſont l'Ours, le Genre des Belettes, le Lion, le Tigre, &c.

3. Tête d'un Animal de l'Ordre des *Agriæ*, Bêtes ſauvages, qui ſont les Myrmecophages & le Manis.

4. Tête d'un Animal de l'Ordre des *Glires*, Loirs: tels ſont l'Hériſſon, l'Ecureuil, le Lievre, le Caſtor, le Rat & le Didelphe.

5. Tête d'un Animal de l'Ordre des *Jumenta*, Bêtes de charge, où l'Eléphant, le Rhinoceros, l'Hippopotame, ſont compris.

6. Tête d'un Animal de l'Ordre des *Pecora*, Bétail, dans leſquels M. LINNÆUS fait entrer le Chameau, le Moſchus, le Cerf, la Chevre, la Brebis & le Bœuf.

### PLANCHE II. *Tome I. p.* 69.

### *OISEAUX.*

1. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre des Oiſeaux de proie,

*Accipitres*, qui ſont les Genres d'Oiſeaux de nuit, de Faucons & de Perroquets.

2. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre des Pies, *Picæ* : tels ſont les Genres de Corbeau, de Coucou, de Hupe, &c.

3. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre de ceux nommés *Anſeres* : tels ſont les Genres d'Oyes, de Canards, de Plongeons, de Colymbes, de Mouettes ; le Phœnicoptere, le Pelican, &c.

4. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre de ceux nommés à long bec, comme les Bécaſſes, *Scolopaces*. Tels ſont les Genres de Hérons, le Bec courbé, l'Hæmantopus, *l'Ortigometra*, les Pluviers, &c.

5. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre de ceux nommés *Gallinæ*, Poules. Tels ſont l'Autruche, le Caſoar, l'Otis, le Paon, le Cocq d'Inde, le Cocq, le Faiſan, le Cocq de Bruyere, la Foulque, &c.

6. Tête d'un Oiſeau de l'Ordre de ceux nommés *Paſſeres*, Moineaux. Tels ſont les Genres de Pigeons, de Grives, d'Etourneaux, d'Alouettes, de Roitelets, d'Hirondelles, &c.

7. Figure du pied d'un Oiſeau de proie.

8. Figure du pied d'un Oiſeau de l'Ordre des *Gallinæ*.

9. Figure du pied d'un Oiſeau aquatique.

10. Figure du pied d'un Oiſeau du Genre des Perroquets.

11. Queue d'un Oiſeau, compoſée d'onze grandes plumes, nommées *rectrices*.

12. Une aile d'Oiſeau étendue, compoſée de dix-neuf grandes plumes, nommées *remiges*.

## PLANCHE III. *Tome I. p.* 201.

## *AMPHIBIES ET REPTILES.*

1. Amphiſbœne.
2. Couleuvre écailleuſe.
3. Anvoye.
4. Boiguacu.
5. Dragon, ou Lézard volant.

# DES PLANCHES.

## PLANCHE IV. *Tome I. p. 247.*

## *POISSONS.*

1. Figure d'une Baleine, Poiſſon Cétacé, de l'Ordre des Plagiures, *Plagiuri.*

2. Figure d'une eſpece de Raie, de l'Ordre des Poiſſons à nâgeoires cartilagineuſes, *Chondropterygii.*

3. Figure d'un Poiſſon dont les ouies ſont cachées, de l'Ordre de ceux nommés *Branchioſtegi.*

4. Figure d'un Poiſſon à nâgeoires épineuſes, de l'Ordre de ceux nommés *Acanthopterygii.*

5. Figure d'un Poiſſon à nâgeoires molles, de l'Ordre de ceux nommés *Malacopterygii.*

A

SYSTEM

Tab. I.
pag. I. Tom. I.

1.



2.

3.

4.



5.

6.

Maisonneuve Sculp

# SYSTÊME NATUREL
## DU
# *REGNE ANIMAL,*
## Par CLASSES, FAMILLES, GENRES ET ESPECES.

## PARTIE PREMIERE.

## *CLASSE DES QUADRUPEDES.*

### Rangés ſuivant la Méthode de M. KLEIN.

*Avec la Notice de celle de M. LINNÆUS ſur ces mêmes Quadrupedes.*

M. KLEIN, *Quadrup. diſp.* §. 1. *pag.* 1. fait deux grands Ordres de tous les *Quadrupedes*. Dans le premier, ſont ceux qui ont les pieds ongulés, *pedes ungulati, ſive cheliferi*. Dans le ſecond, ceux qui ont les pieds digités, *pedes digitati*. Les Ongulés compoſent cinq Familles; ſavoir, les *Monochela*, *Dichela*, *Trichela*, *Tetrachela*, & *Pentachela*. Les Digités, ou Onguiculés

en compoſent pareillement cinq ; ſavoir , les *Didactyla* , les *Tridactyla* , les *Tetradactyla* , les *Pentadactyla* , & les *Anomalopes* , Animaux à pieds irréguliers. M. KLEIN ne diſtingue les Quadrupedes que par les figures des pieds de devant.

Quelques Naturaliſtes ont donné le nom de *Jumenta* à tous les Quadrupedes ongulés. Aldrovande dérive le mot *Jumenta* du verbe *juvare* , parceque quelques-uns de ces Animaux , comme le Cheval , l'Ane , le Bœuf, rendent beaucoup de ſervice à l'Homme. C'eſt ce que dit auſſi Eſchyle. D'autres donnent ce nom à tous les Quadrupedes quel'on tuë pour nous ſervir de nourriture.

Tous les Ongulés , & les Digités ſont couverts de poils , & Vivipares : il y en a quelques-uns parmi ces derniers , qui au lieu de poil , ont des piquans , comme l'*Hériſſon* , & le *Porc-Epic* ; & d'autres qui ſont couverts d'écailles , comme l'*Armandille* : mais en général tous les Vivipares , en Grec Ζωοτοκα , ont du poil ſous le ventre ; & les Ovipares Ωοτοκα , tels que la *Tortue* & le *Crocodile* , n'ont point de poil ſous le ventre. Ceux-ci , à proprement parler , ne ſont que des *Quadrupedes rampans* ; car leurs pieds ſont ſi courts , que leur ventre touche à terre ; & ils entrent chez M. LINNÆUS dans la Claſſe des Amphibies.

# ORDRE PREMIER.

## QUADRUPEDES ONGULÉS.

## *QUADRUPEDIA UNGULATA.*

### FAMILLE PREMIERE.

Monochelon, *Solipes* en Latin, en François *Solipedes.*

I.

*Animaux, qui portent les oreilles élevées*, auribus erectis; *mis par M.* LINNÆUS *dans le cinquiéme Ordre, nommé Jumenta.* Syſtêm. Nat. p. 11. n. 27. édit. 6.

A. CHEVAL, en Grec Ιππος, la Cavale Ιππαδα, les Hébreux le nomment *Sous*, & la femelle *Souſah*, en Latin *Equus*, *Equa*, en Allemand *Pferd*, en Suedois *Haeſt*, par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 34. & *Syſt. Nat. édit.* 6. n. 27. *Equus caudâ undique ſetoſâ. Cavallus*, peut-être du verbe *cavare*, creuſer, parce que cet Animal cave la terre par la peſanteur de ſes pieds, & *Sonipes* à cauſe du bruit que ſes pieds font en marchant. Le Septentrion fournit beaucoup de *Chevaux ſauvages*. Pline nomme le Cheval *Equiferus*, Oppien Ιππαργος. Les Theſſaliens ont les premiers appris à dompter le Cheval, & la maniere de s'en ſervir, d'où eſt venue la Fable des *Centaures*, c'eſt-à-dire, *demi-Chevaux*. Les Chevaux d'Arabie, d'Egypte, de Perſe, de Calabre, d'Eſpagne & d'Angleterre, paſſent pour les meilleurs. Geſner, *Quad.* 132. Aldrovande, *Quad.* 12. Jonſton, Charleton & Rai, ont écrit ſur cet Animal; nous avons en François beaucoup de bons Ouvrages ſur la connoiſſance des *Chevaux*.

B. ZEBRE, *Zebra*, *Zecora*; par les Portugais, *Burro*

*do matto* ; par M. LINNÆUS, *Syſtêm. Nat. édit. 6. p.* 11. *Ord.* 5. *n.* 27. 3. *Equus lineis tranſverſis verſicolor.* Animal des Indes, & du Païs de Congo, qui va d'une grande viteſſe. C'eſt un Cheval ſauvage, dit M. KLEIN. Le nom *Burro do matto*, que les Portugais lui donnent, veut dire *Ane ſauvage* ; & Ludolphe le plaint, & trouve le *Zebre* malheureux, en ce qu'ayant de ſi riches couleurs les Portugais l'appellent *Ane*. Voyez ſon *Commentaire p.* 150. où il en donne la figure.

## II.

*Animaux qui portent négligemment les Oreilles*, auribus neglectis, *du même Ordre que les précédens, chez M.* LINNÆUS, *c'eſt-à-dire, dans celui des* Jumenta. Faun. Suec. n. 35. & Syſt. Nat. pag. 11. n. 27.

A. ÂNE, en Grec ὄνος, en Latin *Aſinus*, qui ſelon Bartholomeus, *l.* 18. *c.* 7. vient de l'a privatif, *ſine*, & de *ſenſus. Sine ſenſu*, ſtupide. Les Allemands le nomment *Eſel*. M. LINNÆUS, *Equus caudâ extremâ ſetoſâ.* Geſner, *Quad.* 40. Aldrovande, *Quad.* 295. Jonſton, *Quad.* 12. Rai, *Quad.* 63. Charleton, *Onom.* 3. Severinus, IV. *Zootom.* Stenon, *act. de Dannemarck. Obſerv.* 89. *l.* 2. parlent de cet Animal.

B. MULET, *Aſinus biformis*, *Hybridus*, *Mulus*, du Grec μόλος, *labor*, travail. Il provient de deux Animaux d'eſpece différente. Columelle dit que le nom de *Mulet* eſt commun à trois eſpeces d'Animaux, à l'Animal qui provient d'un *Cheval* & d'une *Aneſſe*, à celui qui provient d'un *Ane* & d'une *Cavale*, & à celui qui eſt engendré d'un *Ane ſauvage* & d'une *Cavale*.

C. ÂNE SAUVAGE, *Aſinus Sylveſtris*, *Aſini ferus*, *Onager*. M. KLEIN ne nie pas qu'il y a des *Anes ſauvages*, mais il croit que l'*Ane ſauvage* diffère de l'*Ane domeſtique*, comme le *Cheval ſauvage* diffère du *Cheval ordinaire*.

# FAMILLE II.

*Animaux à Pieds fourchus, portans des Cornes & ruminans, mis par M.* LINNÆUS *dans ſon ſixiéme Ordre, qui eſt celui des* Pecora.

A. TAUREAU, *Taurus*, Vache, *Vacca*, Bœuf, *Bos*; eſt le *Taureau* qu'on coupe pour le rendre plus propre au labourage, & que l'on engraiſſe pour nous ſervir de nourriture. Le mot *Taurus* vient du Grec Ταῦρος, comme qui diroit Ταυυουρος à cauſe de la longueur de ſa queue; ou γαυρος, *ſuperbus*, parce que cet Animal eſt fier. Les Syriens le nomment *Taur* & *Tor*. Dans le premier âge on appelle en Latin le petit de la Vache, *Vitulus* le mâle, & *Vitula* la femelle; dans le ſecond, *Juvencus* & *Juvenca*; dans le troiſiéme âge, *Taurus* & *Vacca*. Le Taureau Domeſtique, avec la Vache, eſt nommée par M. LINNÆUS *Bos cornibus teretibus, flexis.*

Ludolphe, *dans ſes Commentaires p.* 145. fait mention d'un *Taur-Elephant*, du double plus grand que nos *Tauraux*. On en amena un d'Afrique à Conſtantinople. L'Afrique, dit-il, nourrit de ces Animaux, qui ſont de très-grands *Bœufs*, & qu'on nomme *Taur-Elephants*, parcequ'ils ont la figure du Taureau, & que pour la peau, la couleur & la grandeur, ils reſſemblent preſque à l'*Eléphant*: c'eſt ce que Bernier confirme en diſant qu'il a vû une de ſes Cornes chez le Grand Mogol. Les Allemands nomment le Taureau *Stier*, *Boll*, la Vache *Kuh*, le Bœuf *Oſchs*, le Veau *Kalb*.

BUFFLE. *Buffellus*, en Allemand *Bueffel*. Il approche du Bœuf domeſtique, & c'eſt comme une eſpece de Bœuf ſauvage. Il n'y a rien de certain ſur le *Bufle* des Anciens. Aujourdui on nomme *Bufle* des Bœufs d'une extrême grandeur, & qui ont les cornes très-longues. Belon, *l.* 2. *c.* 50. dit que le Bœuf d'Afrique eſt petit, quarré, bien fait dans ſa taille, & que ſon poil eſt poli. Il penſe que c'eſt l'Animal, que les Grecs nomment *Bubalon*. M. LINNÆUS nomme le Bufle: *Bos cornibus vaſtis, intortis, reſupinatis.*

B. TAUREAU SAUVAGE, *Taurus ferus*, Animal, dont le regard eſt farouche. C'eſt ou l'*Urus* ou le *Biſon* : mais le *Biſon* ne paſſe aujourdui, que pour être une varieté de l'*Urus*. On croit que le *Biſon* differe de l'*Urus* par l'épaiſſe criniere qu'il a depuis le col, juſqu'aux épaules.

URON BISON, *Urus Biſon*, en Allemand *Urochs*, *Aver Ochs*, du Grec Οφων, parce qne cet Animal ne fréquente que les Montagnes, ou du mot *Ur*, ancien mot Allemand qui ſignifie Sauvage, *Sylveſtris*. Cet Animal eſt particulier à la Pruſſe & à la Lithuanie. Maſſecovius, *Diſſert. l.* 11. donne une diſſertation de l'*Urus*. On a de la peine, dit Aldrovande, à diſtinguer cet Animal dans les Auteurs. La plûpart le confondent avec le *Biſon*, d'autres avec le *Bonaſus*, & d'autres avec le *Buſle*. Cromorus, *lib.* 1. dit que le *Biſon* eſt le même que l'*Urus*. La Ruſſie blanche, ou la Moſcovie, qui tient à une partie de la Lithuanie, nourrit dans la forêt d'Hercynie des *Urus*, que quelques-uns nomment *Biſons*. Schott, *Ph. cur. l.* 8. *c.* 10. dit que ceux d'entre ces Animaux, qui ont de la barbe, ne ſont pas des *Urus*, mais des *Biſons*. Mais ſelon Munſter *l. V. de Germ.* à la ſeule figure il y a une grande différence entreux. Suivant la figure d'un *Biſon*, que le Baron d'Herbeſtein a, & dont parle Maſſecovius dans ſa Diſſertation, il paroît que ce *Biſon* eſt un *Urus*. Au bas de cette figure on a écrit: Je ſuis un *Urus*, les Polonnois m'appellent *Tur*, les Allemands *Aurochs*, & les Ignorans *Biſon*. En 1595. 28 Février, Jean Sigiſmond de Brandebourg, Duc de Pruſſe, tua un *Urus*, dont Henneberg, *H. Gr. p.* 251. fait mention. Laurent Surius, Chartreux, met de la différence entre l'*Urus* & le *Biſon*; mais quand ce Chartreux avance que les cornes du *Biſon* ſont ſi fortes & ſi longues, que trois Hommes bien fournis y peuvent être aſſis, cela convient mieux à ces grands Bœufs d'Afrique, nommés *Taur-Elephans*, qu'au *Biſon*. Il eſt parlé dans *les Tranſactions Philoſophiques n.* 426. *p.* 427. d'un prodigieux crâne; dans Bernier, *Tom.* 1. *p.* 182. d'une corne de Bœuf pleine de civette, préſentée au Grand Mogol. J'en meſurai l'ouverture, dit Bernier, elle avoit plus de demi pied de diametre.

BONASUS. Ariſtote, *l.* 2. *c.* 1. eſt le ſeul ou le premier qui ait parlé de cet Animal ; car Élien & Pline l'ont copié, & Solin a ſuivi Pline, comme le marque Adrovande. M. KLEIN penſe que l'*Urus*, le *Biſon* & le *Bonaſus* ne ſont qu'un même Animal. M. LINNÆUS diſtingue l'*Urus* du *Bonaſus*. Il nomme l'*Urus*, *Bos cornibus teretibus flexis* : le *Bonaſus* : *Bos juba longiſſimâ, cornibus in ſe flexis.* Syſt. Nat. p. 15. édit. 6. n. 34.

BISON de l'Amérique, ſelon Cateſby, *Append. pag.* XXVII. *Tabl. dern.* Il le nomme *Bufle*, & en Anglois *The Bufalo.*

M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt le *Taureau* du Mexique de Jean Faber Linceus. Suivant la deſcription qu'il en fait, il a plutôt la queue d'un Cheval, que celle d'un Bœuf. Eſt-ce celui de Thevet, ou celui dont parle Ambroiſe Parée *l.* 24. qu'on voit à la Floride ? Les Negres l'appellent *Butrol.* Cet Animal ne s'apprivoiſe jamais, à moins qu'on ne l'enleve petit de deſſous le ventre de la mere.

Il y a un *Taureau* du Mexique, dont parle Hernandez ; il y a apparence que c'eſt le *Biſon* de Cateſby, & M. LINNÆUS le nomme *Bos Jubâ longiſſimâ, dorſo gibboſo*, Syſt. Nat. p. 15. n. 34.

## II.

BELIER, *Aries*, en Allemand *Widder*. BREBIS, *Ovis*, en Allemand *Schaaf*. MOUTON, *Vervex*, en Allemand *Der Hammel Schoeps*. AGNEAU, *Agnus*, en Allemand *Das Lamm*. Dans les Pays Septentrionaux, il y a un grand nombre de Beliers & de Brebis. Celles-ci portent des cornes comme leurs mâles ; elles ſont arquées. Ariſtote a nommé le *Belier* τον ουν, τον Κριον, les Anciens Αρην, la *Brebis* προβατον, le *Mouton* Εθριν. Varinus appelle la *Brebis* Καρ, Βηκα, παρα το Βη Βη. Ce genre d'Animaux eſt mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Pecora*. Il le nomme *Ovis cornubus compreſſis lunatis.* Syſt. Nat. édit. 6. p. 15. n. 33. Faun. Suec. n. 43.

Les *Brebis d'Afrique* reſtent toute l'année dans les Campagnes ; elles ne ſont pas pour cela Sauvages. La

*Brebis* eſt un Animal très-fécond. On en voit d'immenſes Troupeaux en Armenie & en Arcadie, où on les appelle πολυπροβατοι.

BELIERS & BREBIS d'Orient nommés en Grec πλατυκερως ; ils ont la queue large, groſſe & graſſe, & peſant plus de quarante livres ; ils tirent avec cette queue de petits Chariots. Il y a une autre eſpece, dont la queue eſt groſſe & aſſez grande. L'une & l'autre portent des cornes.

On voit en Arabie deux genres de *Brebis*. L'un a la queue longue de trois coudées ; on attache ces Animaux par leur queue à des Chariots, qu'ils traînent. L'autre porte une queue de la longueur d'une coudée, & l'un & l'autre n'ont point de cornes à la tête.

BÉLIER nommé *Strepſiceros*. C'eſt le *Belier de Candie*. Il porte des cornes élevées & canelées tout au tour. M. LINNÆUS le nomme *Ovis cornubus erectis ſpiralibus*. Syſt. Nat. édit. 6. p. 15. n. 33. Belon en parle *Obſerv.* 1. *c.* 14. Les Allemands le nomment *Hochghoernter Widder*.

BELIER de Guinée. Il a les oreilles pendantes, un grand *Scrotum* (*a*) preſque placé au milieu du ventre, de petites cornes torſes & courbées du côté des yeux. Au lieu de laine, il eſt couvert de poils courts. M. LINNÆUS le nomme *Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente*. Syſt. Nat. n. 33.

Aldrovande donne la figure d'un *Belier* velu d'Italie, à poils très-longs, dont la tête & les pieds ſont d'une couleur très noire, & la queue très-longue.

*Belier blanc* de Judée, que M. KLEIN nomme en Allemand *Berſoehn-Bos*, qu'on peut comparer avec le *Belier* de Guinée de Ruiſch. *Theat. om. anim.* Tab. XLVI.

Les *Belis* de la Betique, aujourdui Andalouſie, ſont de couleur rouge, ſi l'on en veut croire Martial *l.* 9. *Epig.* 62. Au rapport de Varon, on en tire deux grands avantages. Le premier, la belle laine d'Andalouſie ſi eſtimée. Le ſecond, le lait de ces Brebis, dont on fait d'excellens fromages. Les laines varient ſuivant les Païs. Celles de la Pouille ſont fort eſtimées. Celles d'Angleterre ſont bonnes, & celles d'Eſpagne les meilleures de toutes.

(*a*) C'eſt la peau qui envelope les Teſticules.

III.

Bouc, *Tragus*, du Grec Τραγος, *Hircus*. La Femelle, *Chevre* en François, *Capra* en Latin. Le *Bouc* coupé, *Caper*. Ce Genre d'Animaux eſt nommé par M. LINNÆUS *Capra cornubus carinatis arcuatis*. Syſt. Nat. édit. 6. p. 14. n. 32.

Le *Bouc domeſtique* a des cornes crochues, longues & pointues, & beaucoup de barbe ſous le menton. Les *Chevres*, comme les *Brebis*, ont deux mamelles. Selon Elien & Jean Fabricius p. 80. celles de Lybie les ont placées à la poitrine. Les Troupeaux de *Chevre* aiment les lieux montagneux, & preſque inacceſſibles. En Afrique on tond les *Chevres*, comme on fait en Europe les *Brebis*, & l'on employe leur poil à faire des voiles & des habits.

Varinus d'après Heſichius parle de *Boucs*, qui n'ont point de cornes, *cornibus mutilis*, κολος, ou κολον en Grec Κολος τραγος, *Hircus cornubus mutilis*. Κολος βους, *Bos mutilus*, Bœuf, qui n'a point de cornes.

BOUCS SAUVAGES, *Feri montani*. Il y a en Candie, dit Belon, un grand nombre de *Chevres ſauvages*. Solin prend pour une *Chevre ſauvage*, une eſpece ſemblable à la *Chevre domeſtique*. Aldrovande marque qu'il y a des *Chevres* particulieres à l'Italie, qui proviennent de Chevres ſauvages. Varron eſt du même ſentiment. Nous nourriſſons, dit-il, des *Chevres* provenues de *Chevres ſauvages*. Elles ont donné le nom d'Iſle des Chevres à une Iſle d'Italie. Kolbe *p.* 141. marque qu'il y a beaucoup de *Boucs* en Afrique.

A. BOUC-ÉTAIN., *Ibex*, par quelques-uns *Capricornus*, en Grec Αιγοκερως, * en Allemand *Steinbock*, Homere le nomme Ιξαλον αιγα. M. LINNÆUS en Latin *Capra cornibus nodoſis in dorſum reclinatis. Syſt. Nat.* édit. 6. p. 14. n. 32-6. On en voit beaucoup dans le Vallois, Contrée des Alpes, & dans l'Archevêché de Salzbourg. Il n'y a point d'Animal plus agile, qui coure ſi vite. Albert le Grand dit que le *Caper montanus* eſt ce que les Latins appellent *Ibex*. Pline met l'*Ibex* dans le Genre des *Che-*

* M. KLEIN *Diſpoſ. Quad.* pag. 16. dit Αιγυκερος. Je penſe que c'eſt une faute d'impreſſion, ce mot venant de Αιγος, *Capra* & de κερας, *cornu*.

*vres ſauvages.* Selon Scaliger, on connoît le nombre de ſes années par celui des nœuds de ſes cornes. Il eſt encore plus grand Sauteur que le *Chamois.* Si l'on en prend de jeunes, & qu'on veuille les élever avec les *Boucs domeſtiques*, ils ne perdent point leur ferocité. La femelle eſt plus petite que le mâle, moins brune, plus grande que la *Chevre domeſtique*, & peu différente du *Chamois;* ſes cornes ſont petites.

B. CHAMOIS, ou YSARD, *Tragus Dorcas*, *Rupicapra*, *Caprea;* en Allemand *Gemſe*, Αιγαγρος ſelon Oppien. On en trouve la deſcription dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *I. Part. p.* 201. M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* p. 14. n. 32-5. *Capra cornubus erectis, uncinatis.* C'eſt un Genre de *Chevre ſauvage*, qui n'eſt pas grand. Il ſe reçoit ſur ſes cornes. Les mâles ne different de leurs femelles, ni par les cornes, ni par la couleur, ni par le reſte du corps. Ils ne fréquentent pas comme les *Ibex* ou *Bouc-Etains* la cime des Rochers. Ils ne ſautent ni ſi haut, ni ſi loin. Ils deſcendent quelquefois au bas des Alpes, où ils lechent le ſable qui ſe trouve entre les pierres, & qui eſt ſalineux; c'eſt-là que les Chaſſeurs les vont ſurprendre. Geſner, Belon, & Oppien ſont des Auteurs à conſulter ſur ces Animaux.

On ne ſait point, c'eſt la remarque de M. KLEIN, ce que c'eſt que le *Dama* des Anciens. Rai doute avec raiſon, ſi c'eſt un Animal exiſtant. Pline le met entre les *Chevres ſauvages* d'Outremer. Geſner a reçû de Jean Cajus la figure d'un Animal, qu'il prend pour le *Daim* de Pline. Il a les cornes courbées en dedans, *in adverſum adunca cornua.* Il eſt de la grandeur de la *Chevre*, & de la couleur du *Dorcas.* Ovide lui donne une couleur fauve ſur le dos.

Martial l. 1. dit:

*Frontibus adverſis molles concurrere damas*
*Vidimus* ....

Et l. 4.

*Aſpicis imbelles tentent quam fortia dama*
*Prælia, tam timidis quanta ſit ira feris?*
*In mortem parvis concurrere frontibus audent.*

Ce *Daim* des Anciens eſt-il le *Chamois*, nommé *Rupicapra*, ou *Caprea* par les Naturaliſtes? On peut

consulter Velschius *de Ægagropilis*. C'est l'Auteur auquel M. KLEIN renvoye.

C. GAZELLE, ou ANTILOPE, *Tragus Strepsiceros, Gazella.* La *Gazelle* d'Afrique a les cornes noires, & de la figure de celles de l'*Oryx* des Anciens, torses, & ridées tout au tour. Les Arabes nomment cet Animal *Algazel*, c'est-à-dire, *Dorcas* de Lybie, ou *Chevre* de Lybie. *Dorcas Lybicus, Caprea Lybica.* M. LINNÆUS *Syst. Nat.* édit. 6. p. 14. n. 32-7. le nomme *Caper cornubus teretibus, dimidiato annulatis, arcuatis.* C'est la *Gazella Africana* de Rai *p.* 79. La *Capricerna* de Kœmpfer, 401. *f.* 1.

Autre *Gazelle d'Afrique*, que Rai, *p.* 79. nomme *Gazella Africana, Cornibus rectis, longissimis, nigris, prope caput tantum annulatis;* & M. LINNÆUS *Capra cornibus teretibus, perfecte annulatis, arcuatis.*

GAZELLE DES INDES, *Gazella indica*, que Rai p. 79. nomme *Cornibus rectis, longissimis, nigris;* & M. LINNÆUS *Capra cornibus teretibus, rectissimis, longissimis, basi annulatis.* Cajus a fait présent à Gesner d'un crane & des cornes d'une *Gazelle* d'Afrique. Aldrovande en a pris la description chez Gesner. Il ajoute seulement que les cornes sont creuses en dedans, & vont en pointes. Pline met cet Animal dans le rang des *Chevres sauvages* d'Outremer, c'est-à-dire, d'Afrique. Blasius *Anat. Anim. p.* 368. en donne la figure. On trouve dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *Tom.* I. *Part I. pag.* 33. la Description Anatomique de sept *Gazelles.* Les mâles ont les cornes plus grosses, plus courtes, & plus courbées vers le dos. Belon prend la *Gazelle* pour l'*Oryx* des Anciens. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

D. MOSCHUS, Animal portant le musc, *Tragus moschiferus, Moschus. Caprea moschifera*, suivant Jacques Breynius, *E. n. G. A.* VI. & VII. *Observ.* CXXIX. & Schrækius *A.* VIII. *p.* 83. Après la figure qu'en donne Segerus, celle de Neuhoff *c.* 16. *p.* 373. est la meilleure de toutes. Cet Animal, selon Rai *p.* 147. n'est ni du Genre des *Cerfs*, ni du Genre des *Chevres.* Il n'a point de cornes, & on ne sait s'il est ruminant. M. LINNÆUS *Syst. Nat.*

édit. 6. n. 30. p. 13. en fait un Genre particulier dans l'Ordre de ſes *Pecora*, & il le nomme *Moſchus cornua nulla, dentes canini ſuperiores exſerti.* M. KLEIN qui met, comme on le voit, cet Animal dans le Genre des *Chevres*, avance qu'il y a deux ſortes de *Moſchus*, l'une, qui a des cornes, & l'autre, qui n'en a point. Il les met au rang des *Gazelles*. Voyez Scaliger ſur le *Moſchus*, l'Atlas de la Chine qui fait mention d'un Animal qui n'a point de cornes, ſemblable à un petit Cerf. Cajus ſur le *Buſelaphus*, ou *Moſchefalus*, Hernandez *pag.* 554. pluſieurs autres; & enfin Geſner & Rawolff ſur la *Chevre* de Syrie, plus grande que la *Chevre*, dont les cornes ſont noires, petites, tortues, les oreilles pendantes, & qui a ſous la gorge deux lobes comme les *Porcs*. Velez p. 50. dit que cet Animal eſt de la grandeur du *Chevreuil*. Rai en parle p. 81. & l'appelle *Capra mambrina ſeu Syriaca*. M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* édit. 6. pag. 14. n. 32-11. *Capra auribus pendulis longiſſimis.*

E. CHEVRE SAUVAGE d'Afrique ſuivant Grimmius: *Tragus, capra Sylveſtris Africana*, nommée par M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* p. 14. édit. 6. n. 32-10. *Capra capite faſciculo tophoſo, cavitate infra oculis.* Cet Animal eſt d'un cendré obſcur. Il porte au milieu de la tête un paquet de poil droit. Il a de chaque côté du nez, entre les yeux, deux cavités, qui contiennent une liqueur graſſe, huileuſe & jaune, qui tient le milieu entre le *Caſtoreum* & le *Muſc*. Ephemer, *C. N. Decad.* II. Ann. IV. Obſerv. 57.

F. CHEVRE A BEZOARD, *Tragus Bezaarticus.* Animal ſemblable à l'*Ibex*, nommé *Paſan*, *Pazar* en Perſan, de la grandeur, & en quelque façon de la figure du *Cerf*, armé de deux cornes, larges, en forme de poignard par le bout, & recourbées vers le dos. Cet Animal eſt ſi feroce, qu'il tue quelquefois les Indiens. Monardes le nomme *Cervo-capro*. Ce n'eſt pas là le Τραγελαφος que Garzias Abhorto dit être une eſpéce de *Bouc de Goa*, Animal d'une médiocre hauteur. Acoſta donne la deſcription d'un Animal, plus grand que le *Belier*, qui, ſuivant qu'il en parle, approche plus du

*Tragelaphe.* Alvarez de Mendez a tiré du corps d'un de ces Animaux une Pierre à Bezoard. On peut sur cette Pierre à Bezoard consulter Hernandez *p.* 325; Monardes, qui fait connoître les vertus du *Bezoard Oriental*; les *Transactions Philosophiques*; Peyerus *meric.* 1. *c.* 5. Kœmpfer *p.* 391. qui nomme cet Animal *Capricerva.* Seba, & les autres.

G. TRAGELAPHE, BOUC-CERF, du Grec Ελαφος & Τραγος, *Cervus & Hircus.* Cet Animal, dit Cajus *Rar. Anim. Hist. p.* 59. se retire dans les Rochers de la Mauritanie. Belon *Observ.* 1. *c.* 53. en donne une figure qui n'est pas correcte. Le *Tragelaphe* n'est ni *Bouc*, ni *Cerf*, mais un Animal qui tient des deux.

PETITS CERFS de Guinée, dont il y en a qui n'ont point de cornes, & d'autres, qui en ont; ils appartiennent aux Genres du *Cerf*, & du *Bouc*, & on les met dans le rang des *Boucs*, parcequ'ils ont des cornes de *Boucs* courtes & simples, & non dans celui des *Cerfs*, qui ont les cornes composées. De même le *Tragelaphe* à cause de sa tête, qui est la principale partie de l'Animal, est dans le rang des *Boucs*, & non dans celui des *Cerfs.* La corne des pieds de ces Animaux tombe tous les ans, comme fait le bois du *Cerf.* Ainsi la Nature veut que ce qui arrive tous les ans à la tête des *Cerfs*, arrive de même aux pieds des *Tragelaphes*, dit Cajus *p.* 60. C'est cependant ce qu'on n'a point remarqué à Dresde, où M. KLEIN dit avoir vû de ces Animaux.

H. PETITS BOUCS de Guinée, *Traguli Guineenses.* Petits Animaux, dit M. KLEIN, ou qui n'ont point de cornes, ou qui en ont de simples, & qui sont sans barbes. Selon Aristote, Herodote & Pline, il n'y a point de *Cerfs* en Afrique. D'autres rapportent qu'il y en a, du nombre desquels est Kolbe *p.* 151. Il est vrai qu'il y a des *Gazelles.*

1. TEMAMACA, *Tragulus Temamaca.* Il y a, selon Seba, un grand nombre de ces petits Animaux dans la Nouvelle Espagne. Ils sont petits, & ressemblent à des *Faons* de *Biche.*

2. MAZAME, ou CERF CORNU de la Nouvelle Eſpagne. Seba, *ibid. Tragulus Mazame, ſeu Cervus cornatus.* Cet Animal a de petites cornes tournées, recourbées en arriere & en pointes.

3. PETIT CERF de Guinée ſans cornes. Seba *pag.* 70. *t.* 43. *Tragulus, Cervula parvula Africana ex Guineâ acornis.* Cet Animal, quoique petit, eſt cependant le plus grand de ſon eſpece. M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* édit. 6. p. 14. n. 32-4. le nomme *Capra pedibus digito humano anguſtioribus.* Sa chair eſt un met délicieux pour les Gens du Païs.

4. Autre PETIT CERF d'Afrique, dont les pieds, ſelon Seba, ſont de couleur d'or. *Tragulus, ſive Hinnulus*, ou *Cervus Juvencus pergracilis Africanus.*

5. AUTRE de Surinam, nommé par Seba *p.* 71. *t.* 44. *Subrubra cervula albis maculis notata*, & par M. KLEIN *Tragulus Surinamenſis.* Ce petit Animal eſt rougeâtre, & marqué de taches blanches.

6. AUTRE de Guinée, dont le poil eſt rouge & long. Seba, *pag.* 73. *t.* 45. *Tragulus Guineenſis pilo rubro longiore.*

I. GIRAFFE, ou CAME-LEOPARD, Animal mixte entre les *Biſulces. Tragus, Biſulcorum mixtus, Giraffa, Camelo-pardalis*, nommé *Jiratakacin* par les Habiſſins, à cauſe de ſa queue menue. Les Allemans le nomment *Eamel-Pardel.* Cet Animal, ſelon Pline, a ſervi de ſpectacle à Rome. Les Anciens & les Modernes lui ont donné différents noms. Les Latins l'ont nommé *Ovis fera*, & *Ovifera.* Il a le nom de *Nabin*, de celui d'un Païs d'Éthiopie, où on en trouve. Les Italiens le nomment *Giraffa, Girafa.* Nous le nommons *Cameléopard*, parceque, comme le *Léopard*, il eſt tout marqué de taches blanches. On trouve une très-bonne deſcription de ces Animaux dans Gellius, qui en a vû trois au Caire. Belon *Obſerv. p.* 179. & Rai *Quad. p.* 90. parlent de cet Animal ſous le nom de *Camelo-pardalis.* M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* édit. 6. p. 13. n. 31-1. le met dans le Genre des *Cerfs*, & le nomme *Cervus cornibus ſimpliciſſimis, pedibus anticis longiſſimis.*

## IV.

A. CERF, Ελαφος en Grec, *Cervus* en Latin, en Allemand *Derhiſch*, la femelle *Cerva*, en Allemand *Das Thier*, *Hinde*, ſelon M. KLEIN. Il porte un bois rameux ſur ſa tête, ce ſont ſes cornes, qui ſont rondes ou plates. Virgile les appelle *Arborea*. C'eſt un Animal connu de tout le monde, nommé *Cervus nobilis* par les Naturaliſtes, & par M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* édit. 6. p. 13. n. 31-3. *Cervus cornubus ramoſis, teretibus, incurvatis.* Les *Cerfs de Canada* ont le bois plus large que ceux d'Europe. On en peut voir la deſcription & la figure dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *Tom.* 1. *Part. II. p.* 65. *Tranſact. Philoſop. n.* 444. *p.* 388. Jonſton *lib.* 2. *c.* 2. *art.* 7. Ephem *des Curieux de la Nature*, *Decad.* 1. *A.* IX. *Obſerv.* 88. *Decad.* II. *A.* II. *Obſerv.* 98. Et le *Dictionnaere des Animaux.*

B. RENNE, *Cervus Rangifer*; en Allemand *Rennthier*, par M. LINNÆUS, *Syſt. Nat.* édit. 6. p. 13. n. 31-4. *Cervus cornubus ramoſis teretibus, ſummitatibus palmatis.* Cet Animal ſe trouve dans le Septentrion, vers le Pole Arctique. On en voit beaucoup dans la Laponie. Olaus Magnus *l.* 17. *c.* 8. l'appelle *Tricorne*, Animal à trois cornes. Il en a deux placées comme ſont celles du *Cerf*; mais elles ont plus de branches, & il y en a juſqu'au nombre de quinze. Il a une corne au milieu de la tête, dont les rameaux ou branches ſont plus courtes. Il eſt du Genre des *Cerfs*, mais plus haut, plus long, & plus léger, ou plus vîte. Les Écrivains de la Laponie parlent de cet Animal. M. KLEIN a eû un jeune *Renne* mâle vivant. Il donne la figure de ſa tête *Tabl.* 1. *Diſpoſ. Quad.* Ses ongles ſont ronds. Sa langue fumée, ou cuite à la fumée, *cocta fumo*, comme dit ce Naturaliſte, eſt d'un fort bon goût.

Le CERF DE GROENLAND, dont parlent Edouard 1. 51. & M. Anderſon, eſt de la même eſpece. On peut voir la figure qu'en donne Edouard.

C. CHEVREUIL, *Cervus minimus*, *Capreolus*, *Cervulus*, *Caprea*, en Allemand *Rehe*. M. LINNÆUS, *Syſt. Nat.*

edit. 6. p. 13. n. 31-6. le nomme *Cervus cornibus ramosis teretibus erectis.* Cet Animal perd son bois tous les ans. Les *Chevreuils* de l'Amérique ont deux cornes dont les bouts sont pointus, dit Seba 1. *p.* 73. *t.* 44. *n.* 6. M. KLEIN soupçonne que ce n'est que d'un jeune Chevreuil dont parle Seba.

Le CUGUACU-ETE, & CUGUACU-APARA de Marcgrave, especes de *Chevres* du Brésil, qui appartiennent au Genre de *Chevreuil.*

Jonston parle d'un *Chevreuil marin.* On peut voir dans les Ephemerides des Curieux de la Nature *Decad. II. A.* VI. *p.* 367. la description & la figure d'un *Chevreuil* nommé *Caprea Cornuta.*

D. ALCE, ou ÉLAN, *Cervus Palmatus*, *Alce*, Grand Animal, le même que l'*Hippelaphus*, qui paroît être le même que le *Tarandus.* Ses cornes sont palmées & larges. On attribue de grandes vertus aux ongles des pieds de cet Animal. Sa peau est si épaisse & si dure, qu'elle est impénétrable aux coups de feu. Cet Animal est très-connu dans les Païs septentrionaux. M. LINNÆUS, *Syst. Nat.* edit. 6. p. 13. n. 31-2. le nomme *Cervus Cornubus acaulibus palmatis.* Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

A ce Genre d'Animal appartient le *Cerf* palmé de Josselyn, qui est haut de douze pieds, que les Indiens appellent *Wampose.* Jean Clayton *Transf. Angl. n.* 210 *p.* 122. Paul Dudley, *ibid. n.* 368. Samuel Dale, *ibid. n.* 444. *p.* 384. ont écrit sur l'*Alce*; Dale sur un *Alce noir*, dont la corne ressemble à celle du *Daim.*

E. DAIM, *Cervus Palmatus*, *Dama*, *Dama Cervus*, en Allemand *Dam*, *Tan*, *Hirch.* Cet Animal est plus petit que le *Cerf*, & beaucoup plus grand que le *Chevreuil.* M. LINNÆUS, *Syst. Nat.* édit. 6. p. 13, n. 31-5. le nomme *Cervus cornibus ramosis compressis, summitatibus palmatis.* Tel est le *Daim* des Modernes. Pour celui des Anciens, voyez plus haut, *Chamois*, ou *Ysard*, n. III. B.

On voit à la Virginie des Daims, qui sont & plus grands & plus forts que ceux d'Europe; d'autres qui ne

sont

ſont que d'une ſeule couleur, rouge, & d'autres blancs & variés.

# FAMILLE II.

## ANIMAUX A PIEDS FOURCHUS SANS CORNES.

### *DICHELON ACORNE*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Jumenta*.

V.

A. PORC, *Porcus*, πορκος, ancien nom Grec, aujourd'hui χοιρον. *Sus* eſt un mot Latin, qui vient du Grec υς. Le *Sanglier*, ou *Cochon*, ou *Porc ſauvage*, *Aper*, *Porcus ſylveſtris*, en Grec Συαγος, de συς, *ſus*, & αγρος, *ager*. Le *Porc* qui n'eſt point coupé, & qu'on nomme *Verrat* dans nos Provinces, eſt nommé *Verres* en Latin. Ce Genre d'Animaux différent entr'eux pour la grandeur & pour la couleur. Des Auteurs parlent de *Porcs cornus*; ce ſont des Animaux fort ſuſpects. M. LINNÆUS a vû des *Cochons* ſolipedes, *Monungulos, ſeu ungulis ſolidis nec biſidis*. De tels Phénomenes ſont dignes de remarque. M. KLEIN marque avoir vû un jour un *Cerf* dont les pieds de derriere étoient ſolipedes.

M. LINNÆUS met le Porc dans l'Ordre des *Jumenta*. Ce Savant, ſous le nom de *Sus dorſo antice ſetoſo, caudâ piloſâ. Faun. Suec. n.* 36. & *Syſt. Nat. p.* 12. édit. 6. *n.* 1. comprend, 1°. le *Porc domeſtique*, *Sus*, *ſeu Porcus domeſticus*, dont parle Rai, *Quad. p.* 92.

2°. Un *Porc* à ongles ſimples, *Sus ungulis ſimplicibus*. C'eſt celui dont nous avons parlé plus haut.

3°. Le *Porc d'Afrique*, qui n'a point de poil, *Sus Africanus Subnudus*.

4°. Le *Porc de la Chine*, dont il eſt parlé dans le voyage de W-gothie *p.* 62. *Sus Chinenſis*.

5°. Le Sanglier, *Sus Agreſtis*, *ſeu Aper*, dont parle Rai, *Quad.* 96.

B. PORC ſentant le muſc, ou SANGLIER du Mexique. *Porcus Moſchiferus Aper Mexicanus*; *Tajacu*; au Mexique; *Musk-Hog.* P. Martyr, Oviedo, Acoſta, Purchas, Marcgrave, Faber, & d'autres parlent de cet Animal. Des Marchais *III. pag.* 313. le nomment *Pecaris.* Ce que cet Animal a de particulier eſt un trou ſur le dos, dans lequel on peut mettre le bout du petit doigt. M. LINNÆUS le nomme *Sus dorſo cyſtifero, caudâ nullâ.* Rai en parle *Quadrup. p.* 37. Édouard Tyſon en a donné la deſcription anatomique dans les *Tranſactions Philoſophiques d'Angleterre, n.* 133. *pag.* 379. On dit qu'il a une Glande odoriférante. Voyez Rai *pag.* 97 & 108. Falkemburg veut que ce ſoit une mamelle. Rien moins que tout cela, dit M. KLEIN. Il eſt parlé de cet Animal *Catal. Petrop. Quadrupedes*, à l'article du Genre des *Porcs pag.* 337. *n.* 22. Les Naturaliſtes lui ont donné le nom de *Porcus Moſchiferus*, à cauſe de cette Glande odoriférante.

C. PORC nommé BABYROUSSA, ou BABY-BOEZA, ce qui veut dire, dit M. KLEIN, *Sanglier-Cerf.* C'eſt un *Sanglier* de l'Iſle de *Bouro* aux Indes Orientales. Cet Animal eſt de la grandeur du *Cerf.* Il a la figure, le muſeau, & la queue d'un *Sanglier*, & les pieds d'un *Bouc.* Seba en donne la figure *I. pag.* 8. *t.* 50. Barthol *Hiſt. Ani. Cent.* 2. *Hiſt.* 96. en parle. Il a quatre dents très-longues & courbées, & qui ſont ſes défenſes. Deux ſont placées à la mâchoire inférieure, & deux à la mâchoire ſupérieure. Celles-ci percent la chair du muſeau, & paroiſſent en dehors. M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* p. 12. edit. 6. n. 28. le nomme *Sus dentibus duobus fronti innatis.* Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

D. PORC DE GUINÉE, *Porcus Guineenſis.* Cet Animal dont parle Rai p. 96. d'après Marcgrave, eſt nommé par M. LINNÆUS *ibid. n.* 28-2. *Sus dorſo pone ſetoſo, caudâ nudâ.* Il a les oreilles longues & pointues, le poil court, roux; il n'en a point ſur le dos, mais vers la tête & au col.

# FAMILLE III.

## RHINOCEROS, Animal dont le Pied eſt partagé en trois.

*TRICHELON. Mis par M.* LINNÆUS Syſt. Nat. édit. 6. n. 2. *dans l'Ordre des* Jumenta.

RHINOCEROS, du Grec ῥὶς & κέρας. Par Catelan *Naſicornis*. A Java, *Abada*, *Noemba*; en Perſan, *Elkerkedom*; au Cap de Bonne Eſpérance, *TuabbaNabba*; en Polonnois, *Nozorozec*, *Zebati*; en Italien, *Rhinocerote*; en François, *Porte corne*; aux grandes Indes, *Gomela*; en Allemand, *Naſo horn*. M. LINNÆUS, à l'endroit ci-deſſus cité, donne deux eſpeces de *Rhinoceros*; l'un, qui n'a qu'une corne, & l'autre qui en a deux. Il nomme le premier *Rhinoceros cornu unico conico*; & le ſecond, *Rhinoceros cornibus duabus cuneiformibus*. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

# FAMILLE IV.

## ANIMAL dont les Pieds ſont partagés en quatre.

*TETRACHELON. Mis par M.* LINNÆUS, Syſt. Nat. édit. 6. pag 11. n. 26. *dans l'Ordre des* Jumenta.

HIPPOPOTAME, ou CHEVAL MARIN, ou CHEVAL DE RIVIERE. *Hippopotamus*, *Bupotamus*, *Bomarin*, *Behemoth*. Selon Grew & Bochard, *Equus Niloticus*. En Égyptien, *Toras Elber*. M. KLEIN *Quad. diſp. Tab. III.* donne la figure de cet Animal, ſur lequel on peut conſulter les Mémoires de l'Académie des Sciences 1724. Belon, *Obſervat.* Columna, Thevet, Kolbe, Aldrovande *de Quad.* p 181. & les Voyageurs. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

# FAMILLE V.

L'ANIMAL qui a les Pieds partagés en cinq.

*PENTACHELON. Mis par M.* LINNÆUS, Syſt. Nat. édit. 6. pag. 11. Ord. V. n. 24. *dans l'Ordre des* Jumenta.

L'ELEPHANT, *Elephas ; Elefant* en Allemand, duquel Pline *l.* 11. *c.* 46. dit qu'il a des doigts aux pieds, mais informes. Ils ſont au nombre de cinq, ſans être diviſés, légerement ſéparés, & ſemblables à la corne du pied des Animaux ongulés, & non à des ongles, tels qu'en ont les Animaux digités. Ariſtote *l.* 2. *c.* 2. dit auſſi que l'*Eléphant* a cinq doigts aux pieds. Ils ne ſont pas bien exprimés, comme le remarque Mathiole ſur Dioſcoride, *l.* 11. *c.* 50. La corne ne paroît qu'à l'extremité du pied, ſelon Hartenfels *Lib.* 11. *c.* 46. & Gilbius *c.* 4. Dans le Catalogue des *Quadrupedes* du Cabinet de Peterſbourg *T.* 1. *P.* 1. l'*Eléphant* p. 338. eſt mis dans le rang des Vivipares ongui-culés, & le *Rhinoceros*, l'*Hippopotame*, & l'Animal muſqué, ſont mis dans le rang des Quadrupedes à pieds ongulés. M. LINNÆUS marque que l'*Eléphant* a deux mamelles à la poitrine, point de premieres dents, des canines fort longues, & une trompe très-longue & flexible. Voyez l'Hiſtoire de ce monſtrueux Animal dans les Naturaliſtes & les Voyageurs, & notre *Dictionnaire des Animaux.*

# ORDRE II.

## QUADRUPEDES DIGITÉS, COUVERTS DE POIL.

## *QUADRUPEDIA DIGITATA PILOSA.*

TOUS VIVIPARES, Ζωοτοκα, *VIVIPARA.*

## FAMILLE PREMIERE.

### ANIMAUX DIDACTYLES, *DIDACTYLON.*

I.

CHAMEAU, *Camelus*, mis par M. LINNÆUS, *Syst. Nat.* édit. 6. p. 13. n. 23. dans l'Ordre des *Jumenta.* Cet Animal a deux doigts onguiculés, couverts en dessous d'une peau. Il y plusieurs especes de Chameaux.

1. CHAMEAU nommé BESCHET, *Camelus Bractianus.* Il est de Bactriane, & très-fort, plus petit que celui d'Arabie; il porte deux bosses sur le dos, & autant sous le ventre. M. LINNÆUS le nomme *Camelus lophis dorsi duobus.*

2. CHAMEAU D'ARABIE, *Camelus Arabicus*, nommé IMEL. Il n'a qu'une bosse dessus & dessous. C'est le *Dromadaire*, dont il est parlé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences. Voyez aussi Rai *Synopsis Quadrup.*

3. PETIT CHAMEAU, *Camelus minimus*, nommé DROMADAIRE. C'est le *Raguahil*, ou *Ebamari* des Éthiopiens. Il n'a qu'une bosse sur le dos; c'est la monture des Gens du Pays. Cet Animal va fort vite, & fait en un jour plus de cent mille pas. Δρομος en Grec signifie la vitesse de la course. Cependant M. LINNÆUS le nomme *Camelus lopho dorsi unico.*

4. Espece de CHAMEAU DU PEROU, nommé GLAMA,

en Grec par Mathiole Ελαφοκαρελος *Epiſt.* 5. Rai en parle. M. LINNÆUS le nomme *Camelus dorſo lævi, pectore gibboſo.* Il eſt pris par Faber & par d'autres Auteurs pour une eſpece de *Brebis.* Il a ſix pieds de long, & il eſt haut de quatre. Il porte 150. & 250. peſant. Jean Faber, Mathiole, Margrave, & Piſon, ont écrit ſur cet Animal.

5. Autre Eſpece de CHAMEAU DU PEROU, couvert de laine, *Camelus laniger, Peruanus*, nommé *Pacos*, & vulgairement *Brebis du Perou.* Cet Animal n'eſt pas propre à porter; mais on le nourrit par l'avantage qu'on tire de ſa laine, & ſa chair eſt excellente. Il n'a point de boſſe. Marcgrave en donne la figure. M. LINNÆUS le nomme *Camelus Gibbis nullis.* Voyez ſur ces différentes Eſpeces de *Chameaux* le *Dictionnaire des Animaux.*

II.

SILENE, *Silenus, Simia perſonata*, qui eſt l'*Ai*, ou le *Pareſſeux* de Ceylan, dont parle Seba *I. p.* 54. *t.* 34. M. LINNÆUS le met dans le premier Ordre, qui ſont ſes *Anthropomorpha*, Animaux à figure humaine, & il le nomme édit. 6. p. 3. n. 3-2. *Bradypus manibus Didactylis, caudâ nullâ.* Seba eſt le premier qui ait décrit cet Animal. M. KLEIN dit que ce n'eſt pas un *Tardigradus*, ou *Ignavus.* Cependant il n'eſt pas auſſi agile que des *Singes*, ou autres Animaux; c'eſt ce qui fait ſans doute que Seba lui a donné le nom *Ai.* Il a le cri des *Ai*; des oreilles plates, comme celles de l'Homme, & la Tête couverte de crins.

# FAMILLE II.

## ANIMAUX A TROIS DOIGTS AUX PIEDS.

## *TRIDACTYLON.*

### I.

PARESSEUX, *Ignavus, Tardigradus*; *Ai, Unau* par Jean de Laes; nommé en Allemand *Der Faule*; en Hollandois, *Luiaart*; en Eſpagnol & en Portugais, *Pezillo* & *Perico ligero*, *Priguica*; *Bradype*, *Bradypus* par M. LINNÆUS, qui le met dans l'Ordre des *Anthropomorpha*, & le nomme *Bradypus manibus tridactylis, caudâ brevi.* Voyez ſur cet Animal Cluſius *Exod. l.* 5. *c.* 16. Thevenot *l.* 52. Marcgrave *l.* VI. Grew *Muſ. Reg. p.* 11. Rai *Synopſis*, qui le nomme *Tardipes*. Joſeph Acoſta *l.* 4. *c.* 38. Il eſt nommé *Pareſſeux* à cauſe de ſa lenteur à marcher; il lui faut un jour pour faire cinquante pas, deux jours pour monter au haut d'un Arbre, & autant à en deſcendre. Les marques caraſtériſtiques de ces Animaux ſont la lenteur de leur pas, la longueur de leurs jambes de devant plus longues que celles de derriere, & trois doigts onguiculés à chaque pied. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

PARESSEUX de l'Amérique, qui rit & pleure en même tems; il a le poil gris, comme varié, point d'oreilles, ſeulement des trous pour entendre, des jambes & des pieds couleur de plomb, & des ongles courbés. Seba en donne la figure *I. p.* 53. *Tab.* XXXIII. *f.* 2.

PARESSEUX de Marcgrave, de la grandeur du *Renard*, qui eſt d'un pied de long. Cluſius lui donne quatorze pouces. Il a les pieds ſi petits, qu'il ne marche qu'avec grande peine. M. LINNÆUS avoit dit dans les premieres éditions de ſon *Syſtema*, que ces Animaux n'avoient point de dents, ce qu'il a corrigé dans ſa ſixiéme Édition: *Dentes inciſorii intermedii nulli*, dit-il.

PARESSEUX de l'Amérique, qui eſt endormi. *Ignavus Americanus, Somniculoſus.* Sa couleur eſt cendrée. Il eſt

de grandeur d'un petit Renard. Ses dents sont comme celles d'un Agneau. M. KLEIN dit en avoir eû un, qu'il conservoit dans une Phiole.

PARESSEUX des Indes Orientales. Il est très-petit. On le nomme en Allemand *Oſt indiſcher Lonert.* M. KLEIN marque en avoir eu un, dont les poils étoient roux. Vincent *Cent.* 11. *n.* 71. en parle. Il a les ongles faits comme ceux des *Singes.*

Marcgrave *L.* IV. *c.* 1. se plaint de ce que Gesner a donné le nom *Ignavus* à l'*Arctopitheque*, qui n'a rien de commun avec les *Singes*, & que M. LINNÆUS met dans le rang des *Anthropomorpha.*

## II.

TAMANDUA, Mymicophages, ou Mangeurs de Fourmis, que M. LINNÆUS avoit mis dans l'Ordre des *Anthropomorpha.* Il les en a ôtés, & dans la sixiéme édition de son *Syſtema Naturæ* il a créé pour ces *Mymicophages* & le *Lézard écailleux* un nouveau genre sous le nom d'*Agriæ*, Sauvages.

Il y a le *Tamandua*, le *Tamandua-Guacu*, le *Tamandua-j*, *Urſus Formicarius* par *Candan*, *Ant-Bear* en Anglois par Rai, *Myrmecophage*, ou Chasseur de Fourmis, en Hollandois *Mieren Eeter*, en Allemand *Ameiſen-Freſſer*, *Ameiſen-Schlucter*, Mange Fourmis, *Renard* de l'Amérique par Desmarchais III. *p.* 307. en Hollandois par Kolbe *p.* 165. *Fourmiller.*

Il y en a de plusieurs Especes. Le *Tamandua Guacu*, qui est le plus grand de tous, est de la grandeur d'un Chien de Boucher, dit Marcgrave. Voyez Seba *p.* 66. *Tabl.* 40. *Figur.* 1. Les pieds de devant sont garnis de trois doigts, & ceux de derriere de cinq. Cet Animal est très-rare. M. LINNÆUS le nomme *Myrmecophaga manibus tridactylis, Plantis pentadactylis.*

Le *Tamandua-j* du même Marcgrave, nommé en Anglois par Rai, *The leſſer Ant. Bear*, a, dit-il, les pieds de la grandeur d'un *Cercopitheque.* On ne connoît point à la figure qu'en donne Seba *pag.* 60. *Tab.* 37. *n.* 2. si les pieds de devant sont partagés en quatre, ou en trois.

M. LINNÆUS le nomme *Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis*, il a cinq doigts aux pieds de derriere, & quatre aux pieds de devant. C'eſt ce que dit auſſi M. KLEIN, qui marque que ceux de cette Eſpece ont cinq doigts aux pieds de derriere, comme l'*Ours*. Le mâle a ſes teſticules cachés ſous la peau.

Le *Tamandua* ſimplement dit, n'a que deux doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere. M. LINNÆUS le nomme *Myrmecophaga manibus didactylis, plantis teradactylis*.

Il y a un *Tamandua* de couleur blanche, nommé *Coati* par Seba *p.* 60. *t.* 37. *n.* 3. Il a une figure différente de celle des autres. Il eſt *monodactylon*. Cet Animal eſt très-rare. Il eſt parlé dans le Tréſor de Bareythan d'un *Myrmecophage cendré*. Et Seba *II. p.* 48. *t.* 47. *n.* 2. donne la figure d'un petit Tamandua de l'Amérique avec un nid de *Fourmis*. Les *Tamandua* n'ont point de dents, & leur queue eſt très-longue & cylindrique.

# FAMILLE III.

## QUADRUPEDES A QUATRE DOIGTS AUX PIEDS.

### *DES TETRADACTYLON.*

### I.

*Animaux cuiraſſés & couverts de poils, mis dans l'Ordre des Feræ par M. LINNÆUS*, Syſt. Nat. édit. 6. p. 6. n. 12.

### *LORICATA ET PILOSA.*

CE ſont, 1°. le *Tatou*, nommé *Diable de Tajovan*, dont deux eſpeces. 2°. Le *Tatou à tête de Porc*, ou l'*Armandille*, dont pareillement deux Eſpeces; & le *Tatou à tête de Chien*. Tous ces Animaux ſont cataphractés, de façon cependant qu'entre les écailles, à la partie inférieure du corps, comme ſous le menton, au col, au ventre, & aux jambes, ſa peau paroît chagrinée, & couverte de quelques poils. Ils ſont tous *Tetradactyles*, excepté le *Tatou à tête de Chien*, qui eſt *Pentadactyle*.

TATOU, qui eſt le *Tamandua cataphracta.*, & le *Diable de Tajovan*, dont le muſeau eſt fait, comme celui de la Belette. *Tatu muſtelinus, viverra, Tamandua cataphracta, Diabolus Tajovanicus* de l'Iſle de Formoſa dans le Royaume de Siam; *Armandillus ſqammatus major.* Cet Animal n'a point de dents. Quelques Auteurs ſe ſont trompés daus le nombre des doigts de cet Animal, comme Oviedo, Marcgrave, & Rai, qui donnent cinq doigts à cet Animal. Seba en donne de fort belles figures. Celui-ci eſt repréſenté à la Table XXIX. & il ne différe point d'un autre repréſenté à la Table XXXVIII. marqué des chiffres XLII. mais c'eſt une faute. Ses écailles, qui ſont très-dures, le mettent à l'abri des inſultes des Bêtes féroces. Voyez Seba p. 87. t. 53. n. 5.

Autre TATOU à muſeau de Bellette, nommé grand Armandille à écailles, de l'Iſle de Ceylan, ou Diable de Tajovan. Seba *p.* 88. *t.* 54. *num.* 1. *Tatu Muſtelinus, Armandillus ſquammatus major Ceylanicus, ſeu Diabolus Tajovanicus.* M. KLEIN avertit que dans le texte de Seba *pag.* 89. il faut lire *quatuor*, au lieu de *quinque*, & *duo* au lieu de *tres* à la ligne trois.

TATOU, ou ARMANDILLE, à tête de *Porc*, *Tatu Porcinus*, *Tatu ſimpliciter*, *Porcellus cataphractus*, *Armandillo*, nommé *Cuniculus cucurbitalis*, parcequ'il ſe met en rond comme une boule. C'eſt le *Tatou*, ou l'*Armandille* de l'Amérique, dont parlent François Columna *A. & T. O. p. XV.* Labat *Ameriq. II. p.* 387. Rochef. *p.* 133. Des Marchais *III. p.* 302. qui le nomme *Aytochtly*; Hernandez *Hiſt. du Mexiq. p.* 314. Seba *p.* 45. *t.* 29. Ces Animaux creuſent la terre, & s'y cachent. Ils frequentent auſſi les lieux aquatiques, & ils ont des pieds courts. Seba en donne la figure d'un jeune. *Tab. LIII. n.* 6.

TATOU à tête de *Porc*, ou *Armandille* des Indes Orientales. Il eſt cuiraſſé par tout le corps, dit Seba *p.* 62. *t.* 38. *num.* 2. C'eſt le plus haut de tous. Cet Animal eſt rare & peu commun. Seba en donne la figure en boule *Tab. XXXVIII. n.* 3.

TATOU à tête de *Chien*, dont la tête & les pieds ſont irréguliers, *Tatu Caninus*, *Tatu Apara*, *Armandillo*

*nothus*, *Cynocephalus*. Il eſt monté ſur des pieds hauts. Il a à chaque pied cinq doigts, & ceux du milieu ſont trés-grands. Le *Tatou* ou *Armandille* de l'Afrique, a la queue chauve, & couverte d'un cuir épais; c'eſt le mâle. Seba en parle *p.* 47. *t.* 29. *n.* 3. La femelle, dont il parle auſſi *pag.* 48. *n.* 4. différe du mâle. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. edit.* 6. p. 6. n. 12-4. le nomme *Daſypus tegmine tripartito.*

Ce Naturaliſte donne la Notice de ſept différentes eſpeces de *Tatous*. Il nomme la premiere Eſpece *Daſypus cingulo ſimplici.* C'eſt, dit-il, le *Tatu muſtelinus* de Rai, *Quadrup.* 235. qui a cinq doigts, tant aux pieds de devant, qu'à ceux de derriere. Ce n'eſt donc pas celui de M. KLEIN, qui n'en a que quatre aux pieds de devant, & cinq aux pieds de derriere.

Il nomme la ſeconde eſpéce *Daſypus cingulis tribus*, DASYPE à trois cercles d'écailles, qui eſt le *Tatu* ou *Armandillo Orientalis* de Seba *theſ.* 1. *p.* 62. *t.* 38. *f.* 2. 3.

Il nomme la troiſiéme *Daſypus cingulis quatuor*, DASYPE à quatre cercles d'écailles, qui eſt le *Cheloniſcus* de Columna, *aqu.* 2. *p.* 15. *t.* 16.

La quatriéme eſt le *Tatou* ou *Armandille* d'Afrique de Seba *Theſ.* 1. *p.* 47. *t.* 30. *f.* 3. 4. nommé DASYPE à trois cercles d'écailles ſur le corps. *Daſypus tegmine tripartito.*

La cinquiéme eſpece eſt le *Tatou*, ou *premiere Armandille* de Rai *Quad. p.* 233. auquel M. LINNÆUS donne cinq doigts aux pieds de devant, comme aux pieds de derriere, & qu'il nomme *Daſypus cingulis ſex.*

La ſixiéme eſpece eſt le *Tatuete* du Breſil, dont parle Marcgrave, & que M. LINNÆUS nomme *Daſypus cingulis ſeptem*, DASYPE à ſept cercles d'écailles. Cet Animal a quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere.

La ſeptiéme & derniere eſpece, qui a trois doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere, eſt couverte de neuf cercles d'écailles; ce qui fait que M. LINNÆUS nomme cet Animal *Daſypus cingulis novem.*

## II.

ANIMAUX, dont le corps eſt hériſſé de poil, auſquels M. KLEIN donne le nom de *Cavia*, les Portugais les nomme *Ratos do matto*. Ils ont le poil & la voix du *Porc*. Les pieds de devant ſont munis de quatre doigts. Ils font des trous en terre, ou ils ſe retirent dans des trous d'Arbres; on les nomme *Porcelli*, & *Cuniculi Americani*, petits *Pourceaux*, ou *Lapins* de l'Amérique. Tous ces Animaux ont le poil uni, doux, excepté le *Cavia* de la Baye de Hudſon, dont le dos eſt couvert d'aiguillons, mis dans l'Ordre des *Glires* par M. LINNÆUS.

1. CAVIA COBAYA du Bréſil, nommé par quelques-uns RAT DE PHARAON, *Mus Pharaonis*. *Tatou* couvert de poils, *Cochon*, ou *Rat d'Inde*, & *Tatu Piloſus*, *Porcellus*, *Mus Indicus*. Il a la voix, & le poil du *Porc*. Rai *Synop*. le nomme *Lapin d'Amérique* & de Guinée, *Caniculus Americanus & Guineenſis*, en Anglois *The Guiny Pig*. Geſner & Aldrovande donnent ſix doigts aux pieds de devant de cet Animal, & cinq à ceux de derriere; ils ſe ſont trompés. Selon M. KLEIN cet Animal a les pieds de devant garnis de quatre doigts, & ceux de derriere de trois. Ce petit Animal eſt aujourdui fort connu en Europe; on en a apporté du nouveau Monde. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

2. CAVIA AGUTI, ou ACUTI du Bréſil, qui grogne, comme un *Porc*, dont il a la voix & le poil. On l'appelle vulgairement *Rat ſauvage* de l'Amérique. Il eſt de la grandeur d'un *Lapin*. Cet Animal jette la terre avec ſes pieds de derriere, & le poil de ſon dos ſe dreſſe quand il eſt en colere.

3. CAVIA PACA de Marcgrave, grand *Rat* du Bréſil, qui a le poil & la voix d'un petit *Cochon*. Il a le corps gras & gros. Il mord violemment.

4. CAVIA APEREA, *Lapin* du Bréſil, dont Rai *Synop. Quad. p.* 206. parle d'après Marcgrave. Il a les oreilles courtes & rondes.

5. CAVIA DE SURINAM, *Cavio Surinamensis*, ou *Cunilus Americanus.* Seba 1. *p.* 67. *t.* 4. *f.* 2. Cet Animal n'a point de force dans les reins, & sa chair est blanche, sèche, & d'un mauvais goût.

6. CAVIA, ou LAPIN DE BAHAM, *Cavia Bahamensis*, *Cuniculus Balamensis.* Catesbi 2. *p.* 79. en donne la figure. M. KLEIN dit que cet Auteur s'est trompé en croyant que cet Animal est le *Rat des Alpes*, ou la *Marmote*, dont parle Rai *Synop. Quad. pag.* 221. On peut voir l'Appendice de Catesbi *p.* 28. sur la *Marmote de l'Amérique.*

7. CAVIA de JAVA, *Cavia Javensis*, ou LIÉVRE de JAVA, *Lepus Javensis*, selon Catesbi *p.* 18. Cet Animal, dit l'Auteur, est originaire de Java & de Sumatra.

CAVIA de la Baye de Hudson, *Cavia Hudsonis.* Animal qu'Édouard a décrit.

---

# FAMILLE IV.

## ANIMAUX A CINQ DOIGTS AUX PIEDS.

La plus nombreuse de toutes les Familles parmi les *Quadrupedes.*

### *PENTADACTYLON.*

### I.

LIÉVRES & LAPINS, mis par M. LINNÆUS *Syst. Nat. édit. 6. p. 9. n.* 19. dans l'Ordre des *Glires.*

CES Animaux ont les pieds de devant garnis de cinq doigts, & ceux de derriere de quatre. Leurs oreilles, à proportion de la tête, sont très-longues. Ils ont la levre supérieure fendue au milieu, la queue courte, la plante des pieds garnie de poils. Leurs dents supérieures sont doubles, les inférieures sont très-petites: ils n'ont point de dents canines. Des Naturalistes n'approuvent pas que M. KLEIN ait mis le *Liévre* & le *Lapin* parmi les *Pentadactylon.* Ne lui

trouvant que quatre doigts, ils ne veulent point du *Spurius digitus*, que M. KLEIN leur donne.

1. LIÉVRE, *Lepus*, *Levipes*, léger à la courſe, en Grec λαχως, λαχωος, Δαξυιπους; en Anglois *The Hare*. Le Liévre vulgaire, de couleur cendré, & que l'on prend plaiſir à chaſſer, eſt nommé par M. LINNÆUS *Lepus cauda abrupta, pupillis atris*. En Allemand *Haſe*; en Anglois *The Hare*.

2. LIÉVRE très-blanc, *Lepus albiſſimus*. Cet Animal, dont tout le corps eſt d'un blanc luiſant, ſe trouve dans les Alpes & dans les Païs Septentrionaux. Il y en a en Pruſſe & en Suede qui ſont cendrés pendant l'Été, & qui deviennent blancs pendant l'Hiver. M. KLEIN marque en avoir tué quelques-uns en Pruſſe, ſur le bord de la Mer, & au milieu de l'Été, qui étoient tous blancs. En Allemand *Stein*, *Sand-Haſen*.

3. LIÉVRE noir, dont parle Wormius, *Muſ. p.* 321. Animal qui n'a que l'extrêmité des pieds d'une couleur tirant ſur le bleu. Parmi ſes poils noirs il y en a quelques-uns de bruns. On voit dans le Cabinet du Roi à Dreſde, la peau d'un Liévre fort noir.

4. LIÉVRES cornus. Ce ſont des Animaux monſtrueux, que M. KLEIN a vû. Il en donne la figure *Tab. III.* Wormius parle de pluſieurs *Liévres cornus*; & Balbin, *Miſ. hiſt. Bohem.* dit qu'on voit des *Liévres cornus* en Norvege. Voyez *Quadrup. Hiſt. Prodom. not.* (oo) & les figures des *Liévres cornus*, *ibidem*; les Éphémerides des Curieux de la Nature, *Decad. II. A. VI. Obſerv.* 183. *pag.* 368. la *Relat. Barolin. n. CLV. d.* 2. *Decad.* Ce ſont des Phénoménes de la Nature.

5. LAPIN, *Lepuſculus*, *Cuniculus*. Animal, qui fouit la terre, & y fait des trous pour s'y cacher, nommé par M. LINNÆUS, *Lepus caudâ breviſſimâ pupillis rubris*. Extérieurement & intérieurement il reſſemble au *Liévre*. Il y en a de cendrés, de blancs, de noirs, de roux variés de blanc.

Les *Liévres* ſe tiennent pendant tout le jour tranquilles dans les Forêts, ou au milieu des Campagnes, & ils ne vont paître que la nuit; & les *Lapins*,

pour la plûpart, se tiennent couchés dans leurs trous.

6. Le *Lapin du Brésil*, nommé *Tapeti*, dont parle Rai *Quad.* 205. est mis dans l'Ordre des *Glires* par M. LINNÆUS, qui le nomme, *Lepus caudâ nullâ.*

7. Et le LAPIN de Siberie, *Cuniculus Sibirianus*, qui, à cause de sa longue queue, est nommé par le même *Lepus caudâ elongatâ.*

## II.

M. KLEIN donne le nom générique de *Sorex*, & *Rosor*, à un Genre d'Animaux qui rongent avec leurs dents tout ce qui se présente, ce qui ne se fait pas sans bruit; ou bien ce nom leur est donné, selon Isidore, parcequ'ils ont les dents en forme de scie. D'autres font dériver le mot *Sorex*, du Grec Σορον, pourri, *putridum*, parce que ces Animaux corrompent tout ce qu'ils rongent. Quoiqu'il en soit, sous le nom de *Sorex* M. KLEIN comprend les différentes Especes d'*Ecureuils*, les *Loirs*, & les *Rats.* Tous ces Animaux ont cinq doigts aux pieds, & M. KLEIN ne sait pas pourquoi M. LINNÆUS prive l'*Ecureuil vulgaire* d'un pouce à ses mains, qui sont ses pieds de devant.

1. ANIMAUX à queue velue, *caudâ Pilosâ. Sciuri*, *Ecureuils*, mis dans l'Ordre des *Glires* par M. LINNÆUS *Syst. Nat. n.* 18.

1. ÉCUREUIL, *Sciurus*, *caudâ pilosâ*, du Grec Σκιουρος, de σκια & ουρα, parceque sa queue lui donne une espece d'ombre. Oppien lui a donné ce nom; les Latins l'ont retenu. D'autres le nomme *Pirolus*, *Spirioſus*, & *Scurulus.* Les *Ecureuils* différent pour la couleur. On en voit beaucoup en Pologne, & dans les Forêts du Nord. Ils habitent dans les Arbres. M. LINNÆUS parle d'*Ecureuils* qui l'Été sont rougeâtres, & l'Hiver deviennent blancs. Ceux qu'on voit du côté de Dantzic. dit M. KLEIN, ont le poil rougeâtre pendant toute l'année. Les *Ecureuils vulgaires* en Pologne sont cendrés, & ne changent point de couleur. *Les Ecureuils*

*vulgaires noirs* ne ſont pas rares. Il y en a d'un *brun ſombre*, de *variés de blanc & de roux*, & marqués d'autres couleurs. M. KLEIN penſe que celui qui eſt nommé *Graumert* en Allemand, eſt un *Ecureuil* d'eſpece & de mœurs différentes de l'*Ecureuil vulgaire*. Quand ces Animaux ſont aſſis ſur leur derriere, ils ſe ſervent de leurs pattes de devant pour porter leur manger à la bouche. M. LINNÆUS nomme *l'Ecureuil vulgaire*, *Sciurus palmis ſolis ſaliens*. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

ÉCUREUIL noir de Cateſby *II. p. 73. Sciurus niger*, en Anglois *The black Squirrel*. Cet Animal eſt, ou tout noir, ou il a un collier, ou le nez, ou l'extrémité de ſa queue blancs.

3. GRAND ÉCUREUIL gris de la Virginie. *Sciurus virginianus cinereus major*. Rai *Synop. Quad. p.* 215. En Anglois *The gray Fox Squirrel*. Cateſby *p.* 74. Il a les oreilles courtes, la queue très ample, cinq doigts très longs aux pieds de devant, & quatre aux pieds de derriere.

4. ÉCUREUIL de terre de Cateſby p. 75. *Sciurus ſtriatus*, en Anglois *The gruand Squirrel*. Animal de la Caroline & de la Virginie, de la moitié plus petit que l'*Ecureuil vulgaire* d'Angleterre. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt l'*Ecureuil* de Liſter, dont parle Rai.

5. ECUREUIL très-rare de la nouvelle Eſpagne, à bandes blanches. Le mâle, ſelon Seba *I. p. 76. t. 47. n. 2.* eſt d'un gris obſcur. La femelle, dont parle Seba *ibid. n. 3.* eſt heriſſée de longs poils & ſon dos eſt marqué de cinq bandes.

6. ECUREUIL de l'Amérique, ſelon Seba, *pag. 78. t. 48. n. 5.* Cet Animal à la tête faite differemment des autres. C'eſt le même que M. LINNÆUS nomme *Sciurus caudâ teretiuſculâ, auribus ſubrotundis nudis*.

7. ECUREUIL *cendré* de Pruſſe. *Sciurus epilepticus*, *cinereus Pruſſicus*, en Allemand *Graumert*. Cet animal, dit M. KLEIN, dort continuellement: quand on le réveille il tombe en épilepſie. C'eſt le *Lerot*, en Latin *Mus avellanus*, le *Sorex* de Pline, en Anglois *The Dormouſe*, ou *Sleeper*, ſelon Rai. En Allemand *Haſelmaus*.

8.

8. ECUREUIL de Barbarie, *Sciurus Getulus* de Caius, dont il eſt parlé dans Geſner. En Anglois *The Barbary Squirrel*, ſelon Rai, qui peut être l'*Ecureuil de terre* de Cateſby, *Sciurus ſtriatus.*

9. ECUREUIL volant: *Sciurus petauriſta volans.* Seba parle du mâle *p.* 67. *t.* 41. Cateſby *p.* 76. *&* 77. parle d'un autre *Ecureuil volant*, qu'il nomme en Anglois *The Flying ſquirrel*, qu'on a depuis peu découvert en Pologne. M. KLEIN en a envoyé une deſcription exacte avec la figure à la Societé Royale de Londres. On la trouve dans les *Mémoires Philoſophiques. N.* 427. *p.* 32. M. LINNÆUS nomme l'*Ecureuil* volant, *Sciurus hypochondriis prolixis volitans. Syſtem. Nat.* edit. 6. n. 18. 2. & *Faun. Suec. n.* 2.

10. ECUREUIL volant de la Virginie. *Sciurus Virginianus petauriſta.* Seba *p.* 72. *t.* 11. *n.* 3. Cet Animal eſt roux par deſſus, & d'un cendré clair par deſſous. M. KLEIN trouve quelque différence entre cet *Ecureuil volant* & le précédent. On peut conſulter Lev. Vincent. *Deſcript. Anim.* 1726. *p.* 8. *Cent. pr. num.* 92. Grew. *Muſ. Reg. p.* 20. qui prend pour *Ecureuil volant*, le *Coat volant* de Scaliger, *Exercit.* 217. §. 9. Lawſon *Hiſt. Prov. Carol.* & d'autres. Il eſt parlé de pluſieurs *Ecureuils* dans le Catalogue des Quadrupes de *Peterſbourg. pag.* 315. *& ſuiv.*

11. ECUREUIL. d'un roux cendré. *Sciurus ex cinere rubicundus.* C'eſt un Animal etranger, qu'Édouard 198. nomme en Anglois *The Barbarian ſquirrel.*

2. *LOIRS, GLIRES*, autres Animaux à queue velue; *caudâ piloſâ*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Glires, Syſt. Nat. n.* 21.

12. LOIR en Latin *Glis*, en Allemand *Siebenſchlaefer.* Ariſtote dit que le naturel de ces Animaux eſt de paſſer l'hiver dans des creux d'arbres, où ils s'engraiſſent beaucoup, en dormant toujours. Nonius & Iſidore veulent que le mot *Glis* vienne du mot *pinguedo* graiſſe, c'eſt-à-dire, du verbe *Gliſcere*, ſynonime des verbes *Creſcere* & *pingueſcere.* Telle eſt auſſi l'Etymologie

d'Oppien, & d'Auſone, & de pluſieurs autres Naturaliſtes. Les principaux Auteurs donnent deux eſpeces de ces Animaux, l'un qui ſe retire dans les creux d'arbres, l'autre qui n'habite que les rochers & les montagnes, où il paſſe la plus grande partie de l'année à dormir, & ils l'appellent *Glis Mus.*

Le LOIR *vulgaire*, dont Aldrovande *p.* 409. donne la figure, s'accouple l'Eté & fait ſes petits dans l'Automne. Les Romains en faiſoient beaucoup de cas, puiſqu'ils avoient des lieux deſtinés pour les élever. Depuis le mois d'Octobre juſqu'en Janvier il ſont très-gras. Dans les Indes ils percent les murs, & détruiſent les maiſons. C'eſt l'opinion commune qu'ils ont quelque choſe de venimeux ſur tout à la queue. M. KLEIN penſe que l'*Ecureuil de la Virginie*, qui paſſe tout l'hiver à dormir, & qui ne ſe réveille que quand on l'approche du feu, eſt un *Loir.* Ce Naturaliſte en fait mention dans les *Tranſactions Philoſophiques.* n. 427. *p.* 31. & c'eſt le même que le *Mus Avellanarum major* de Rai, le *Sorex* de Pline & de Geſner, le *The greater dormouſe* ou *Sleeper* des Anglois. Le *Mus Noricus* ou *Citillus* de Geſner en eſt auſſi une eſpece. M. LINNÆUS *n.* 21. --3. le nomme *Mus caudâ brevi, capite mauri.*

13. LEMMING, ou RAT DE NORWEGE, *Glis Norwagicus*, ou *Mus ex Norwegiâ*, ſelon Seba *II. p.* 61. *t.* 63. *n.* 5. Cet Animal eſt d'un cendré brun; les Suedois le nomment *Fiaellmus*, *Sabelmus*, & les Lappons *Lummick*, On en voit toute l'année dans les montagnes de la Laponie, & dans de certains tems ils deſcendent en troupe dans les Provinces circonvoiſines. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. edit.* 6. *pag.* 10. *n.* 21. --2. le nomme *Mus caudâ abruptâ, corpore fulvo, nigroque vario.* Il en eſt parlé dans les Actes de Stockholm 1710. *p.* 326. dans Scheffeld *Hiſt. Lapp. p.* 316. qui le nomme *Rat de montagne*, *Mus montanus*; dans Olaus magnus Sept. l. 18. *c.* 20, qui le nomme *Lemmus*; dans le Worm. Mus, 322. où il eſt nommé *Lemming*; & enfin Rai, *Quad.* 227. & Charleton, *Onom.* 22. en font mention ſous le nom de *Rat de Norwege*, ordinairement *Lemming.* Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

14. CRICETUS de *Geſner*, *Glis Cricetus*, en Allemand, ſelon M. KLEIN, *Amſter*. Animal vorace & très-gras, qui ſe retire dans des trous, comme les *Lapins*, où il fait un grand amas de grain, plus grand que la *Betette* vulgaire. C'eſt un Animal colere, mordant, qui, s'il eſt pourſuivi par un Cheval, ſaute à ſes babines & le mord furieuſement. Il a comme les *Rats* deux dents au devant de chaque machoire. Ce qui fait que Ray & M. LINNÆUS le mettent dans le genre de *Rats*, & M. KLEIN dans le rang de ceux qu'il nomme *Glis caudâ pilosâ*. George Fabricius parle dans Geſner du genie & des mœurs de cet Animal. Rai dit que quand il eſt aſſis ſur ſes pieds de derriere, il a la figure d'un *Ours*, ce qui fait que Gelenius l'a pris pour l'*Arctomys*, Animal qu'on voit en Paleſtine. On trouve de ces Animaux dans la Miſnie. M. LINNÆUS le nomme *Mus caudâ elongata, corpore cinereo rutilo, nigroque longitudinaliter vario.*

15. MARMOTE. *Glis marmota*, *Mus Alpinus*, ſelon Pline; en Allemand *Murmelthier*. Animal, qui tient le milieu pour la grandeur entre le *Liévre* & le *Lapin*: il nait dans les Alpes. M. KLEIN donne une Hiſtoire abregée de la vie & des mœurs de cet Animal dans ſon *Prodromus Hiſt. Art.* M. LINNÆUS le met dans l'Ordre des *Glires*, & du genre des *Rats*. Il le nomme *Mus caudâ elongatâ nudâ, corpore rufo.*

16. MARMOTE de l'Amérique, *Glis Marmota Americanus*, en Anglois *The Monax*, ou *Marmotte of America*. Edouard. *Nat. Hiſt. Of Birds* n. 101. Cateſby, *append.* p. 28. reſſemblant au *Rat* des Alpes, dont la queue eſt plus longue. On le nomme *Marglandia* dans l'Amérique Septentrionale.

17. RAT MUSQUÉ, de Cluſius. *Glis moſchiferus*, *Mus aquaticus exoticus*, ſelon Cluſius & Vormius, en Anglois ſelon Rai *The Muſcovy*, ou *Musk Rat*. Cet Animal vient de Ruſſie; où il y en a grande quantité, autour des étangs, M. LINNÆUS le met dans l'Ordre des *Glires*, & du genre des *Caſtors*, *Faun. ſuec.* n. 21. où il le nomme *Caſtor cauda longâ, lanceolatâ planâ*. On le nomme en Suedois *Daſman*. On peut ſur ce *Rat muſ-*

*qué* conſulter Cluſius *exot.* p. 375. Worm. *Muſ.* Rai, *Quad.* 217. & le *Dictionnaire des Animaux.*

1. ANIMAUX à queue ronde, *caudâ tereti*, mis dans l'Ordre des *Glires* par M. LINNÆUS *Syſt. Nat. n.* 21.

1. RAT & SOURIS ſous le nom de *Mus*, en Latin, Μυς en Grec, *Maus* en Allemand. La *Souris*, *Muſculus*, ſelon Pline, *Mus domeſticus minor*. Le *Rat*, *Mus major*, *Rattus*, Ποντος en Grec moderne, *Ratze* en Allemand; Γραξ en Grec, parcequ'il a le muſeau fait comme celui du Porc. Le Rat des champs ou Mulot, *Mus ſubterraneus*, *Campagnoli* des Italiens, Κερκος en Grec, *Agrarius*: il fouit la terre avec ſes pieds, comme les *Lapins*. Le *Rat aquatique*, *Mus aquaticus*, en Allemand *Waſſer-Ratze*; & d'autres.

18. RAT, *Rattus*, *Mus ciſtrinarius*. M. KLEIN dit qu'il n'y a preſque point de différence entre le *Rat* domeſtique & le *Rat* Aquatique; l'un & l'autre fréquentent les maiſons & les greniers, & ont la queue ronde & longue. Le *Rat aquatique*, ſelon ce Naturaliſte, eſt cependant un peu plus grand. M. LINNÆUS nomme le *Rat* domeſtique, *Mus caudâ longâ ſubnudâ, corpore fuſco cineraſcente. Faun. Suec. n.* 28. & *Syſt. Nat. edit.* 6. p. 10. n. 21.--6. On peut ſur cet Animal conſulter Geſner *Quad.* 109. Jonſton & Rai. Les Suedois le nomment *Rotta*.

19. Quant au *Rat aquatique*, M. LINNÆUS, qui le met dans le genre des *Caſtors*, le nomme *Caſtor caudâ linerari tereti. Faun. Suec. n.* 25. & *Syſt. Nat. edit.* 6. *pag.* 10. *n.* 20.--3. Cet Animal, dont parle Rai, *Quad.* 217. ſe trouve dans les foſſés pleins d'eau, dans les marais, mais plus rarement proche les eaux bourbeuſes.

20. SOURIS, *Mus minor*, *Muſculus vulgaris*, en Allemand *Maus*, & *Mus* en Suedois. Ce petit Animal a la queue longue & ronde. Celles qui ſont ſauvages *Vulgares agrarii*, ont ordinairement la queue plus courte, dit M. KLEIN. Il y en a de différentes

couleurs. Il y en a des blanches. Le *Mus agreſtis* de la Virginie, qui eſt tout blanc, dont parle Seba, *p.* 36. *t.* 47. *n.* 4. en eſt une eſpèce. La couleur ordinaire de la *Souris*, eſt cendrée, ou obſcure, ou brune. M. LINNÆUS. *Faun. Suec. n.* 31. & *Syſt. Nat. édit.* 6. *p.* 10. *n.* 21.--8. la nomme *Mus caudâ longâ nudiuſculâ, corpore cinereo fuſco, abdomine ſubalbeſcente.* Voyez ſur cet Animal Rai, *Quad. p.* 218. Jonſton, & les autres.

21. Il nomme le *Mus agreſtis*, qui ſe trouve dans les Champs ſous les herbes ou les javelles de bled, *Mus caudâ brevi, corpore nigro fuſco, abdomine cineraſcente. Faun. Suec. n.* 27. & *Syſt. Nat. n.* 21.--4. Ce peut être le *Mus agreſtis major macrourus*, de Geſner.

22. SEBA. *p.* 50. *t.* 31. *n.* 7. parle d'un Animal, qu'il nomme *Glis*, ſeu *Mus Americanus agreſtis, albus, avellanarum.* Il eſt tout blanc. M. KLEIN en parle dans une Note à l'Article de la *Souris*: ſans doute que c'en eſt une eſpèce.

23. Rai parle de la *Souris* des champs, que les Italiens appellent *Campagnoli*; il la nomme *Mus agreſtis capite grandi brachyuros*, & la diſtingue ainſi du *Mulot*, nommé en Latin *Mus domeſticus medius.* M. LINNÆUS le nomme *Mus caudâ longâ corpore nigro flaveſcente, abdomine albo. Faun. Suec. n.* 30. & *Syſt. Nat. c.* 21.--7.

23. Le *Mus avellanarum minor*, qui ſe trouve dans les Forêts, & fait un grand dégât dans les jardins. M. KLEIN le met dans le genre des *Loirs*, & nous le nommons en françois *Lerot.* Rai en parle *Quad.* 220. & M. LINNÆUS le nomme *Mus caudâ longâ pilosâ, corpore rufo, gulâ albicante. Faun. Suec. n.* 32. & *Syſtem. Nat. n.* 21.--9.

21. Il y a un petit Animal très-commun du côté d'Upſal, qui ſe retire ſous terre & dans l'eau, & qui eſt fort nuiſible aux jardins. M. LINNÆUS le nomme *Mus caudâ longâ pilosâ, auribus ſubrotundis vellere brevioribus. Faun. Suec. n.* 30. *Syſt. Nat. n.* 21.--5. Selon ce Naturaliſte, cet Animal eſt de la grandeur du *Rat.* Je penſe qu'on peut appeller cet Animal, *Rat* de terre & d'eau, ou Amphibie.

25. RAT SAUVAGE de l'Amerique, nommé Scalopes; *Mus Scalopes*, *Mus ſylveſtris Americanus*. Seba, *pag.* 48. *t.* 31. *n.* 2. dit que le mâle a des gros teſticules, qui ſont cachés ſous la peau de l'abdomen. Il parle de la femelle *ibid. n.* 2. Cet Animal n'a point de poil aux pieds & à la queue. Il a le muſeau preſque fait comme celui du *Cochon*.

26. Le RAT D'AFRIQUE, nommé Hayopolin, dont parle Seba, *ibid. n.* 3. eſt ſemblable à celui-ci, dit M. KLEIN. M. LINNÆUS le met dans le rang des *Didelphes* Voyez *n.* 33.

27. RAT DE L'AMERIQUE, qui ſelon Seba *II. p.* 30. *t.* 29. *n.* 2. eſt roux & fauve ſur le dos: il a les oreilles blanches, placées plus en arriere que les autres, le bas du ventre, les pieds de devant & la queue blancs.

28. RAT DE BOIS de l'Amerique, dont la femelle porte ſes petits ſur ſon dos. Seba, *p.* 49. *t.* 31. *n.* 5. C'eſt le même Animal, dont M^e. Merian donne la figure à la fin de ſes Inſectes de Surinam. Seba *ibid. n.* 6. parle d'un autre ſemblable à celui-ci, dont le dos eſt rouge, qui a la queue courte & groſſe, & dont les cinq doigts ſont garnis d'ongles petits & pointus.

29. Grand RAT SAUVAGE de l'Amérique. *Mus Americanus major agreſtis, capite grandi.* Seba, *pag.* 50. *t.* 31. *n.* 8. Il a la tete large, groſſe, de belles oreilles droites & ſans poil, & une longue barbe.

30. MUSARAIGNE. (*a*) *Mus araneus*, En Allemand *Spits maus*, en Suedois *Nachbmus*, en Anglois *The Shrew*, ou *Shrew Mouſe*, ſelon Rai, *Synop.* 233. M. LINNÆUS dans les premieres editions de ſon *Syſtema Naturæ* & dans celle de ſa *Faun. Suec.* avoit mis ce genre d'Animal, qu'il nomme *Sorex*, à la tête de l'Ordre de ſes *Jumenta*. Dans la ſixiéme edition du *Syſtema Naturæ* p. 10. n. 22. on le trouve dans l'Ordre des *Glires*.

31. MUSARAIGNE des Indes Orientales. *Mus araneus Indiæ Orientalis*. Seba, *II. p.* 9. *t.* 8. *n.* 3.

32. LEMING, autre Animal de Norvege, différent de celui dont nous avons parlé plus haut, *n.* 13. & que

(*a*) Genre d'Animal nommé *Sorex* par M. LINNÆUS.

M. KLEIN met dans le rang des *Glires*, Animaux qui ont la queue velue, *Caudâ pilosâ*. Il met celui-ci dans le rang des *Mures*, Animaux qui ont la queue ronde *caudâ tereti*. Olaus magnus, le nomme *Mus lemingus*, *Norvagicus*. Vormius en parle *p.* 322. M. KLEIN dit dans une note, que ce petit Animal considéré par derriere paroît un peu enflé, & comme de figure conique.

33. PHILANDER, (*a*) Opassum, Larigueia; & Didelphus, selon M. LINNÆUS. En Latin *Mus Marsupialis*, *sylvestris*, *Brasiliensis*; en Allemand *Beutel-Ratze*. Quelques-uns disent que ces Animaux tiennent du *Renard* & du *Loir*. Ils ont la face, la forme & la queue, d'un *Rat*. On les prend pour des *Renards* à Surinam. Feuillée, *Observ. Ph. III. p.* 206. les nomme *Manicou*. Seba *p.* 56. *t.* 36. *n.* 1. parle du mâle, & de la femelle, *n.* 2. Il la représente p. 57. avec ses petits, qui entrent dans le sac du ventre, & un plus jeune le sac ouvert.

34. TLAQUATZIN, ou TAI-IBI du Bresil; que les Portugais nomment *Caborro Domato*, c'est-à-dire, *Glis sylvest. tris*, Loir de bois. Rai, *Synop. Quad.* en parle *p.* 185. Les Allemands le nomment *Bosch-Ratte* : c'est une espèce de *Philander*, qui ressemble au précédent, quant au poil & à la couleur, qui cependant est d'un roux plus foncé. La femelle a comme les brebis, les mammelles placées entre les pieds de derriere, elles ont quatre mammellons. Cette espèce n'a point de bourse, comme la précédente, pour y retirer ses petits, qui sont au nombre de quatre. Seba, *p.* 57. *t.* 36. *n.* 4.

35. Grand PHILANDER des Indes Orientales. *Mus marsupialis*, *Philander Orientalis major*. Seba, *p.* 61. *t.* 38. n. 1. La femelle porte ses petits sous son ventre, enfermés dans un sac. Elle ressemble au *Philander* de l'Amerique, excepté qu'elle est couverte de poils sur le dos, qui sont d'un poil d'un brun plus foncé; elle est aussi plus grande.

36. Très-grand PHILANDER des Indes Orientales. *Mus marsupialis maximus*. La femelle dit Seba, *p.* 64. *t.* 39. quand elle met bas ses petits, les enferme sur le champ

(*a*) Genre d'Animal nommé *Didelphus* par M. LINNÆUS.

ſa bourſe, tout nuds & aveugles, qu'ils ſont. Elle en fait ſept à la fois, & elle a autant de mammellons qu'elle a de petits, c'eſt-à-dire ſept. La bourſe où elle les met, eſt unie & ſans poil. Seba refute, Franc. Valentin *tom. III. Animal. Amboin. p.* 233. qui s'eſt trompé ſur la maniere d'engendrer de ces animaux, & ſur les parties naturelles de la Femelle.

M. LINNÆUS ne parle que de deux eſpèces de *Philander*. Il met ce genre d'Animaux dans l'Ordre des *Glires. n.* 13. Il nomme la premiere eſpèce, qui eſt le *Philander* de Seba, *I. t.* 36. *f.* 1. 2. & *t.* 39. *Didelphus mammis intra abdomen*, c'eſt le *Paſſum* ou *Opaſſum* de Seba. Il nomme la ſeconde *Didelphus mammis extra abdomen*. C'eſt le *Hayopolin* de Seba, *Theſ. I. t.* 12. *f.* 3. 4. 5. 6. 7. 8. *Mus Africanus Hayopolin dictus.*

2. *TAUPES*, autres Animaux à queue ronde, *cauda tereti*, mis dans l'Ordre des *Feræ* par M. LINNÆUS *Syſt. nat. edit. 6. n.* 13.

37. TAUPE vulgaire. *Talpa.* Elle a les pieds de devant faits, comme les mains de l'homme. Schelhammerus en a donné l'Anatomie dans les Ephémerides Germaniques. *Ann. II. Obſerv.* 130. M. Gautier *dans ſes Obſerv.* ſur l'Hiſtoire Naturelle. Rai, parle d'une *Taupe blanche*. Petivert d'une autre. M. KLEIN dit que les *Taupes blanches* ne ſont pas rares dans ſon Païs. Seba en parle *p.* 51. *t.* 32. *n.* 1. & de la *Taupe noire* de Virginie *n.* 3. Toutes ces *Taupes* ont cinq doigts aux pieds. M. LINNÆUS nomme la *Taupe noire*, *Talpa caudata*, En Grec σπαλαξ, *Talpa* en Latin, *Maulwurf* en Allemand, *Mullvad* en Suedois, *Surck* en Smolandois. On peut ſur cet Animal, qui ſe trouve ſous terre dans les champs, les prés & les jardins, conſulter Geſner *Quad.* 931. Aldrovande *Quad.* 451. Charleton *Exercit.* 25 Rai *Quad.* 236. ſur la *Taupe* de la Virginie. Seba *Theſ. I. p.* 51. *t.* 32. *f.* 2. ſur la *Taupe blanche*, *ibid. p.* 68. *t.* 41. *f.* 1. & *notre Dictionnaire des Animaux.*

38. TAUPE Rouge de l'Amerique *Talpa rubra Americana.* Seba *ibid. n.* 2. Sa couleur eſt un cendré clair,

tirant ſur le rouge. Ses pieds ſont irréguliers. Si la figure qu'en donne Seba eſt bien exacte, les pieds de devant n'ont que trois doigts, & ceux de derriere quatre.

39 TAUPE de Siberie de différente couleur, nommée *Aſpalax* par Seba, *ibid. n.* 4. 5. *Talpa Sibiricus verſicolor.* Cet Animal a les pieds ſemblables à la *Taupe rouge.* C'eſt un Animal très-rare. Son poil deſſus & deſſous eſt doré & d'un verd luiſant. Il en eſt parlé dans le *Cat. Quad. Petrop. p.* 349.

40. TAUPE tachetée d'Ooſt-Friſe. *Talpa maculata Ooſt-Friſia.* Seba *p.* 68. *t.* 41. *n.* 4. Elle ſurpaſſe en quelque choſe pour la longueur la *Taupe vulgaire.* C'eſt celle que M. LINNÆUS nomme *Taupe* ſans queue, *Talpa ecaudatâ.*

3. *CHAUVE-SOURIS*, autres Animaux à queue ronde; *caudâ tereti*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ, Syſt. nat.* 14.

Les Anciens, & même les Modernes, comme Belon, ont mis la *Chauve-Souris* dans le rang des *Oiſeaux.* Pline a dit: C'eſt le ſeul entre les *Oiſeaux*, qui alaite ſes petits. Mais tous les Animaux volants ne ſont pas des *Oiſeaux.* Il y a des *Poiſſons*, des *Lézards*, & des *Inſectes* volants. Platon a fort bien dit que la *Chauve-Souris* eſt un *Oiſeau*, qui n'eſt pas un *Oiſeau*, c'eſt-à-dire que c'eſt un *Quadupede volant.* Victorius dit *Avis Sorex*, c'eſt-à-dire, *Sorex volans.* Macrobe *l.* 7. *Saturn. c.* 16. dit: La *Chauve-Souris* marche ſur quatre pieds, & il faut la mettre dans le rang des *Quadrupedes.*

41. Les *Chauves-Souris* ont plutôt du poil, que des plumes ſur le dos. M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 18. nomme les grandes aîles de la *Chauve-Souris*, *Manus Pentadactylæ palmato-alatæ maximæ*: & les petites *Palmæ Pentadactylæ fiſſæ parvæ.*

Les Grecs nomment la *Chauve-Souris* Νυκτερις, les Latins *Veſpertilio*, les Allemands *Fleder-Maus*, *Fleder-Ratze*, *Spetz-Maus*, ſelon M. KLEIN. Les Suedois, ſelon M. LINNÆUS, *Laederlapp*, *Flaedermus*, les Smolandois

*Nattblacka*, les Anglois, ſelon Rai, *The Bat or Flitter-Mouſe*. On trouve ce *Quadrupede volant* chez Albin, *Tom. III. n.* 79. 101. dans le rang des *Oiſeaux*, & il le nomme *The Double Earet Bat.*

Jonſton eſt encore un de ceux qui met ce *Quadrupede* dans le rang des *Oiſeaux*, *de Avib. Tab.* 20. Rai l'appelle *Mus alas motitans*, *Rat*, qui remue ſes aîles, & que des Auteurs, ajoute-t'il, *p.* 243. ont fort mal à propos mis au rang des *Oiſeaux*, à cauſe de ſes aîles & de ſon vol. Les Auteurs, dit M. KLEIN, ne conviennent pas du nombre de ſes dents. Elles ne font jamais plus de deux petits à la fois ; la mere les emporte avec elle attachés à ſes mammelles. La *Chauve ſouris vulgaire* a de doubles oreilles. M. LINNÆUS la nomme *Veſpertilio caudatus*, *naſo oreque ſimplici. Faun. Suec.* 18. *Syſt. Nat.* 14. 2.

42. CHAUVE-SOURIS de l'Amérique, qui a la tête ronde & le muſeau d'un *Liévre*, dont parle Seba *p.* 90. *t.* 45. *n.* 1. qui la nomme *Veſpertilio lato ſimilis Americanus*, & M. LINNÆUS *Veſpertilio caudatus labio ſuperiore biſido* Syſt. nat. 14.

43. CHAUVE-SOURIS vulgaire de l'Amérique, *Veſpertilio Americanus vulgaris*. Seba *ibid. n.* 2. nommée par M. LINNÆUS *Syſt.* 14. 4. *Veſpertilio caudatus*, *naſo foliato acuminato*. M. KLEIN dit que cette eſpece a de plus longues oreilles que les autres. Ce peut être le même Animal que l'*Andira Guacu* de Piſon. Sloane en parle dans ſon voyage de la Jamaïque. *II. pag.* 330.

44. Seba *p.* 90. *t.* 45. *n.* 3. parle d'une petite *Chauve-Souris* de Surinam.

45. CHAUVE-SOURIS de Ternate, *Veſpertilio Rattus Ternatanus*. Seba *p.* 90. *t.* 46. *n.* 1. Elle a de doubles oreilles très-grandes. Il parle de la femelle *pag.* 91. *n.* 2. Le mâle ſe perche ſur les Arbres. Cette eſpece de *Chauve-Souris* a le bout du muſeau frangé. C'eſt le *Loir volant* de Ternate, nommé par Seba *Glis volans Ternatanus*, & par M. LINNÆUS, *Veſpertilio caudatus*, *naſo foliato acuminato*. Syſt. nat. 14-5.

46. CHAUVE-SOURIS à tête de Chien de Ternate. *Veſpertilio Cynocephalus Ternatanus*, nommé par Seba

*Canis volans Ternatanus Orientalis*, & par M. LINNÆUS *Veſpertilio caudâ nullâ* Syſt. nat. 14 1. Seba en parle *p.* 91. *t.* 57 *n.* 1.

47. CHAUVE-SOURIS à tête de Chien de la Nouvelle Eſpagne, qui a des oreilles, & qui eſt très-grande. *Veſpertilio Cynocephalus*, *maximus*, *auritus*. C'eſt un Animal très-rare. Seba *p.* 92. *t.* 58. *n.* 1.

48. CHAUVE-SOURIS à tête de Chien de l'Iſle de Madagaſcar. Cet Animal, ſelon Édouard 180. a de largeur (les aîles étendues) un pied neuf pouces d'Angleterre, & d'horribles dents. Cette *Chauve-Souris*, *Veſpertilio facie caninâ*, eſt nommé en Anglois par Édouard *The great bat, from Madagaſcar*.

## III.

*BELETTES*, Animaux mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ*, *Syſt. Nat. Edit. 6. p. 5. n. 6. Faun. Suec. pag.* 2.

Les Grecs ſous le nom γαλεη, ou γαλη entendent le CHAT & la BELETTE, *Felis & Muſtela*. Les Allemands donnent le nom générique de *Wieſel* aux Animaux du Genre des *Belettes*. Sur l'étymologie de *Muſtela* les ſentimens ſont partagés. Ce Genre d'Animaux a le corps menu, long, les pieds courts, & a la facilité de ſe fourrer dans des trous, où il ſe tient caché. La tête à proportion du corps eſt petite & longue, le muſeau allongé, plus ou moins long & court, ſuivant les eſpeces. Les pieds ſont fournis de cinq doigts. Pline donne deux eſpéces de *Muſtela*; l'une qui erre dans les maiſons, & qui ſe retire ſous les toits; l'autre, dans les Campagnes & dans les Bois. Des Auteurs appellent l'une *Belette vulgaire*, ou *de Ville*, & l'autre *Belette de Campagne & de Bois*. L'une fait la chaſſe aux *Poules*, aux *Rats* & aux *Souris*; l'autre, qui eſt auſſi Carnivore, monte dans les Arbres, & ſe retire ſur des hauteurs. Wotton parle ſous le même titre de la *Belette* & du *Chat*.

1. BELETTE vulgaire *Muſtela vulgaris*, en Allemand *Hauſ-Speicher-Wieſel* ſelon M. KLEIN ; nommée par M. LINNÆUS, *Muſtela caudæ apice atro.* Faun. Suec n. 9. & *Syſt. Nat. édit.* 6. n. 6.-5. Rai la nomme en Anglois *The Weaſell*, ou *Weeſel.*

2. BELETTE vulgaire blanche, *Alia vulgaris tota alba.* Cet Animal ſe trouve en Pruſſe, & Agricola la met dans le rang des *Belettes vulgaires.* Les Smolandois, ſelon M. LINNÆUS, la nomment *Weſla.* Ce n'eſt qu'une varieté de la précédente. Quelques-uns prétendent que le ſoufle de la *Belette* eſt venimeux pour l'Homme & pour les Bêtes, & que le nid & les petits ſortis de leur nid ont une odeur puante. C'eſt une fable, dit M. KLEIN. Pline ſe trompe auſſi quand il dit que la *Belette* change tous les jours de nid. Aldrovande *p.* 311. donne la figure du crane & des dents de la *Belette.* On peut le conſulter ſur la maniere de vivre de ces Animaux, *pag.* 313.

M. LINNÆUS comprend ſous le nom de *Muſtela caudata, apice atro,* la *Belette vulgaire,* la *Belette ſauvage,* la *Belette blanche*, qui eſt l'*Hermine* des Modernes, dont nous allons parler plus bas. Voyez ſur la premiere Geſner, *Quad.* 149. Aldrovande, *Quad.* 307. Jonſton, *Quad.* 74. Rai, *Quad.* 195. Sur la ſeconde, Charleton, *Onom.* 19. Sur l'*Hermine*, Rai, *Quad.* 198. Charleton, 19. Wagner 180. & le *Dictionnaire des Animaux.*

3. HERMINE, *Muſtela Armellina, Muſtela alba.* Elle a le bout de la queue noire. *Muſtela candida in extremâ caudâ nigricans*, dit Aldrovande, *pag.* 311. En Allemand *Hermelin*, en Anglois *The Ermine* ou *Stoat* ſelon Rai. On en voit dans les Païs Septentrionaux, & ſurtout en Pruſſe. Il y en a beaucoup, dit Olaus Magnus, dans une Forêt de Scandinavie, qui a quatre-vingt mille de long. A cauſe de ſa peau, qui eſt fort eſtimée, & beaucoup plus recherchée que celle de la *Belette blanche*, on la nomme *Muſtela regalis.* Voyez ſa deſcription dans le *Dictionnaire des Animaux.*

4. FURET, *Muſtela viverra*, en Grec Ικτις, en Allemand *Fret*, Animal qui ſe trouve partout, nommé auſſi en Latin *Furrunculus.* On ſe ſert de ces Animaux

pour la chaſſe aux *Lapins*. Willugby & Rai diſent que c'eſt un Animal qui nous a été apporté d'Afrique. On l'apprivoiſe, & il eſt très-fécond en Angleterre, en Hollande, & en France, où il y a beaucoup de Garennes. Ce peut être la *Viverra Indica*, qui eſt d'un gris roux, & que les Portugais nomment *Mongo*; peutetre auſſi le *Muhgathia* de l'Iſle de Ceylan; la *Viverra Indica*, nommée par Garcias ab Horto & par Rai *Quil* & *Quirpele*. M. LINNÆUS d'après Rai, diſtingue le *Furet*, nommé en Latin par ces Naturaliſtes *Muſtela Sylveſtris*, *Viverra Dicta*, de *Quil* & *Quirpele* des Indes, & du *Mungo* des Portugais, qui eſt le *Mungathia* des Zelandois. Ce ſont trois différentes eſpeces de *Furets*.

5. PUTOIS, *Muſtela-Fœtida*, en Allemand *Iltis Teufels Rind*, en Anglois *The Polecat* ou *Fitches*. M. LINNÆUS le nomme *Muſtela flaveſcente-nigricans, ore albo, collari flaveſcente*. On le nomme en Scanie *Iller*. Voyez ſur le *Putois*, Geſner, *Quad. p.* 767. Aldrovande, *Quad.* 330. Jonſton, *Quad.* 155. Rai, *Quad.* 199.

6. MARTE, *Muſtela Martes*, en Allemand *Marter*, en Anglois *A Martin*, ou *Martlet*. La peau de cet Animal eſt plus belle que celle du *Putois*. On diſtingue deux ſortes de *Marte*, celle qui fréquente les Forêts de Sapins; & celle qui ſe trouve dans les Rochers, & qu'on appelle Domeſtique. c'eſt la *Fouine*. Celle-ci eſt de couleur brune, a le goſier blanc, & ſe promene dans les Campagnes. L'autre, qui eſt proprement la *Marte*, ne ſe trouve que dans les Forêts de Sapin. M. LINNÆUS nomme la *Marte* & la *Fouine*, *Muſtela Fulvo-nigricans, gula pallita*, en Suedois *Maorb*. Voyez Geſner, *Quad.* 151. Jonſton, *Quad.* 64. Charleton, *Onom.* 19. Schott, *Phyſ.* 1668. Rai, *Quad.* 200. & le *Dictionnaire des Animaux*.

7. ZIBELINE, *Muſtela Zibelina*, en Anglois *The Sable*, *Zobel* ou *Sobel* en Allemand. On en voit en Ruſſie & en Siberie. On l'appelle *Marte* de Schithie, *Marter Scythica*, *Rat* de Sarmatie, *Mus Sarmaticus*, & *Rat de Scythie*, dit M. KLEIN, *Mus Scythicus*, mais mal. Cet Animal eſt plus petit que la *Marte*.

8. PUTOIS de l'Amérique, *Muſtela Americana fœtida*:

*Putorius Americanus Striatus.* Cateſby II. *p.* 62. On peut conſulter Feuillée, *Obſerv. Tom.* I. *p.* 272. touchant un Animal nommé *Clinche*, d'une odeur inſupportable, qui a deux bandes blanches, prenant leur origine ſur la tête, & paſſant au deſſus des oreilles, & qui eſt le même.

9. FURET de Java, *Muſtela Javanica*, nommé *Koger Angan*; c'eſt une eſpece de *Furet*, dont on ſe ſert pour aller chaſſer les *Lapins* dans leurs trous. Seba *p.* 78. *t.* 48. *n.* 4.

10. ICHNEUMON, ou Rat de Pharaon, Animal mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ*, & du Genre des *Meles, Faun. Suec. Syſt. Nat. édit. 6. n.* 10.-3. & nommé *Meles Unguibus uniformibus Leucophæa.* Cet Animal, ſous les noms de *Muſtela Egyptiaca; Ichneumon*, qui veut dire *Inveſtigator*, Chercheur, *Mus Pharaonis, Mus Ægypti*, eſt particulier à l'Égypte. Il détruit les *Serpents.* C'eſt pour cela qu'on en éleve en Egypte comme on fait ici des *Chats*, & on en porte vendre à Aléxandrie.

11. ICHNEUMON de l'Iſle de Ceylan, *Muſtela Ceylonica, Ichneumon, ſeu vulpecula Ceylonica.* Seba *p.* 66. *t.* 41. *n.* 1. Les Hollandois le nomment *Ceilonſch Kwaſſe*, anciennement *Alkaſis*; d'autres *Saillum*, parce qu'il fouille la terre avec ſon muſeau, comme les *Porcs*, & qu'il cherche & furete partout.

Il eſt parlé dans le *Catal. Quad. Petropol. p.* 343. de *Belettes*, qui n'ont point de queue, & *pag.* 344. d'une *Belétte noire*, dont la queue eſt blanche.

## IV.

*HÉRISSONS & PORCS-ÉPICS.* Les premiers ſont mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ n.* 11. & les autres dans l'Ordre des *Glires n.* 17.

Galien, *l.* 1. *de comp. med. ſec. loc. cap.* 10. donne le nom *Acanthion* à *l'Hériſſon.* Ακανθος chez Théophraſte eſt non ſeulement pris pour un Arbre épineux, mais encore pour le *Hériſſon.* Par Ακανθοχοιρος Suidas entend le *Hériſſon terreſtre*, ou *Porc hériſſé d'épines.* Quelques-uns

veulent que ce nom ne convienne qu'au *Hériſſon*. Le *HÉRISSON*, *Herinaceus*, *Echinus*, le *PORC-ÉPIC*, *Hyſtrix*, ont le dos chargé d'aiguillons. M. KLEIN dit que ces noms ne ſont que ſynonimes. Les Italiens nomment le *Hériſſon*, *Riccio*, les Eſpagnols *Erizo*, & les Allemands *Ygel*. Oppien *l. 2. de venat.* a chanté dans ſes Vers deux ſortes de *Hériſſons*, le grand & le petit. Élien & Pline mettent le *Porc-Epic*, *Hyſtrix*, dans le rang des *Hériſſons*. M. KLEIN ne voit pas la raiſon pourquoi les Auteurs ont diſtingué deux eſpeces de *Hériſſons terreſtres*; l'une, qu'ils appellent *Hériſſon à tête de Porc*; & l'autre, *Hériſſon à tête de Chien*; peutêtre parceque les uns ne fréquentent que les Bois, & les autres errent autour des maiſons. La diſtinction priſe des aiguillons, qui ſont plus longs dans les uns, & plus courts dans les autres, ne lui paroît pas auſſi aſſez ſuffiſante; mais il fait avec les Modernes une différence du *Hériſſon* d'avec le *Porc-Epic*. La figure du *Hériſſon* eſt connue de tout le monde, & celle du *Porc-Epic* de beaucoup de perſonnes. Hermolaus en parlant du *Hériſſon*, dit qu'il eſt de la grandeur du *Lapin*, tout couvert d'aiguillons, excepté au muſeau, aux pieds, & ſous le ventre, ou il a un peu de duvet. Le *Porc-Epic* a des poils, & la nature lui a donné des piquants, ou des aiguillons beaucoup plus longs.

1. HÉRISSON vulgaire, *Acanthion vulgaris*, *Herinaceus*, *Echinus*; en Anglois *The Urchin*, ou *Hedgehog*; en Allemand *Ogel*, *Schwein Ogel*; en Suedois *Igelkott*. Seba 1. *p.* 78. en donne une très-bonne deſcription *t.* 49. *n.* 1. 2. Il eſt repréſenté deſſus & deſſous. On en trouve auſſi la figure dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. M. LINNÆUS le nomme *Erinaceus Auriculatus terreſtris. Syſt. Nat. édit. 6. n.* 11-1. *Faun. Suec. n.* 16. On en voit beaucoup en Gothlande & Gothie, peu en Suede, & preſque point en Norlande. Voyez ſur cet Animal Geſner, *Quad.* 368. Aldrovande *Quad.* 459. Jonſton, *Quad.* 119. Charleton, *Onom.* 19. Rai, *Quad.* 231. &c. & le *Dictionnaire des Animaux*.

2. HÉRISSON de l'Amérique, blanc, *Acanthion Echinatus*, *Erinaceus Americanus albus*. On en voit à Su-

rinam. Il reſſemble beaucoup au nôtre. M. LINNÆUS le nomme *Erinaceus ſubauriculatus.* Voyez Seba 1. *p.* 78. *t.* 49. *n.* 3. Ce peut être le *Chat épineux*, dont parle Des Marchais III. *p.* 303. Sur le *Hériſſon* & le *Porc-Epic*, on peut conſulter ce qu'en dit M. Perrault dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, & le *Prodromus Hiſt. Quad. pag.* 18. Note (nn) de M. KLEIN.

3. HÉRISSON de Siberie, *Acanthion Echinatus*, *Echinus Sibiricus.* Il a de petites oreilles. Sa couleur eſt d'un roux obſcur. Les bouts de ſes piquants ſont comme dorés. Seba *p.* 79. *t.* 49. *n.* 4. 5. parle du mâle & de la femelle.

4. PORC-ÉPIC de Java, de Sumatra, & ſurtout de Malaca, dont les piquants ſont très-longs. *Acanthion aculeis longiſſimis*, *Hiſtrix Genuina*, *Porcus aculeatus Malaccenſis.* Seba *pag.* 81. *t.* 51. parle de cet Animal & de ſes petits. M. KLEIN le nomme en Allemand *Stachelschwein.* M. LINNÆUS, qui, comme nous l'avons dit d'abord, met les *Porcs-Epics* à la tête des *Glires*, nomme celui-ci *Hyſtrix pedibus pentadactylis*, *caudâ truncata. Syſt. Nat. n.* 17. 4. Cet Animal a les oreilles pendantes. De ſon fiel ſort une excellente pierre, qui a de grandes propriétés en Médecine. Seba *ibid.* donne la figure de cette pierre.

5. PORC-ÉPIC hupé, *Acanthion criſtatus*; *Hyſtrix Orientalis criſtata*, ſelon Seba, *pag.* 79. *Tab.* 50. On voit dans les Indes quelques varietés de ces *Porcs-Epics.* Il eſt commun dans l'Iſle de Java. Rai, *Quad.* 206. dit que c'eſt le même que les Italiens nomment *Spinoſa*, & qu'il en a vû un au marché de Rome peſant vingt-trois livres, qui avoit été pris ſur une Montagne voiſine. C'eſt le même dont on trouve la figure & la deſcription anatomique dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Rai & Seba le décrivent tout différemment. M. LINNÆUS le nomme *Hyſtrix manibus tetradactylis*, *plantis pentadactylis.* Il le nomme en Suedois *Stachelschwein.* Voyez Seba, Rai, & M. KLEIN. *Diſp. Quad. p.* 66.

6. PORC-ÉPIC ſingulier, ou *Porc* ſauvage à piquants des Indes Orientales. *Hyſtrix Orientalis ſingularis*, *Porcus*

*Porcus aculeatus Sylveſtris*, dont la queue eſt longue. *Acanthion caudâ prælongâ*, Seba I. *p.* 84. *t.* 52. Il eſt nommé par M. LINNÆUS *Hyſtrix pedibus pentadactylis, caudâ exſertâ.* Cet Animal eſt rare, dit M. KLEIN, & n'eſt pas encore beaucoup connu. La Pierre qui ſe forme dans ſon fiel, n'eſt pas moins eſtimée que celle du *Porc-Epic* de Malaca. Voyez Seba ſur ce *Porc-Epic*, & Bontius.

Le CUANDU de Marcgrave, qui eſt nommé par les Portugais *Ourico Cachiero*, & par les Hollandois *Eea Eyſere Vercken*, eſt un Animal ſauvage, tout couvert d'aiguillons, & qui pourroit bien être le *Tlaquatzin* d'Hernandez. Voyez Marcgrave *p.* 233. & Rai *Syn. pag.* 208. *& ſuiv.* M. LINNÆUS le nomme *Hyſtrix pedibus tetradactylis, caudâ exſertâ prehenſili ſeminudâ. Syſt. Nat. n.* 17-2.

## V.

*CHIENS*, Animaux mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ. Syſt. Nat. édit. 6. p.* 5. *n.* 8.

Les Naturaliſtes entendent par *Genus caninum*, non-ſeulement les différentes eſpeces de *Chiens domeſtiques*, mais encore les *Chiens ſauvages:* tels ſont le *Loup*, le *Renard*, & autres Animaux qui en approchent.

Le CHIEN proprement dit, Κυων en Grec, Σκιλος ſelon les Grecs modernes, *Hund* en Allemand, & *Dog* en Anglois, a la tête ou longue, ou ramaſſée, ſuivant les eſpeces. Il y a en Europe bien des eſpeces de *Chiens*, & bien des varietés. Les *Chiens domeſtiques* ſont de différentes figures, & de différentes grandeurs. M. LINNÆUS nomme le *Chien, Caudâ (ſiniſtrorſum) recurvâ. Faun. Suec. n.* 12. *Syſt. Nat.* 8.

1. Le *Chien mâtin* eſt nommé en Latin *Moloſſus*. L'eſpece en eſt venue d'Épire. Le *Chien* de Chaſſe, *Sagax*, parcequ'il a le nez fin; celui qui chaſſe aux Oiſeaux *Aviarius*; le Barbet, *Aquaticus*; le *Chien* de Chaſſe pour les Bêtes, *Vertagus*; le *Chien* de Boucher, *San-*

*guinarius* ; le petit *Chien* de chambre, *Melitæus*. Voici la notice de quelques *Chiens* étrangers.

2. CHIEN du Mexique. Il eſt monſtrueux par ſa figure.

Joſeph d'Acoſta *l.* IV. *c.* 33. parle des *Chiens* de l'Amérique, & ſurtout d'une race de petits *Chiens*, nommés *Alco* dans le Pays. Les Indiens les aiment ſi fort, qu'ils ne voyagent point ſans en avoir un, qu'ils tiennent dans leurs bras.

3. CHIEN d'Afrique, *Canis Africanus*. Les *Chiens* de Guinée different beaucoup des nôtres. Il n'aboyent ni ne mordent point. Le Peuple en nourrit beaucoup, & les vend dans les marchés, comme on fait ici les *Moutons*. Les Negres croyent que les *Chiens* d'Europe, qui aboyent, peuvent parler.

Outre les *Chiens* d'Europe, qu'on voit au Cap de Bonne-Eſpérance, les Hottentots & les Européens en ont d'autres, dont ils ſe ſervent pour la garde de leurs Troupeaux. Ces *Chiens* ne le cedent à aucun autre pour la fidélité.

Les CHIENS nommés *Mebbiæ*, ſont des *Chiens ſauvages*, qui ne font jamais de mal. Antoine Zuchell dans ſon Voyage d'Éthiopie marque *p.* 293. que leur inſtinct les porte ſeulement à faire la chaſſe à de certaines Bêtes. Ils ſont différents des *Loups*. On peut voyager en ſûreté dans les Bois qu'ils fréquentent. On en voit des bandes de 30 & 40. qui mettent en fuite les *Lions* & les *Tigres*.

Pererius *c.* 170. rapporte qu'on voit chez les Lappons un Animal terreſtre, peu différent du *Chien* pour la grandeur & pour la figure. Dans un certain tems il cherche la Mer, où ſe plongeant, les membres l'un après l'autre, devient peu à peu Poiſſon. Voilà une Fable des mieux inventées.

On voit dans la Province de Tebeth, ou Tibeth, dans la grande Tartarie, des *Chiens* d'une grandeur extraordinaire.

4. CHIEN ſauvage de l'Amérique à queue très-longue. *Canis Americanus Sylveſtris, caudâ longiſſimâ*. Seba *p.*

47. *t.* 30. *n.* 1. On en voit ſur le Cap de Tiburon.

5. CHIEN à tête ramaſſée, ſemblable au *Chien* du Nord, & qui a la queue faite, comme le *Chien* ordinaire, nommé *Tamandua Mexicana*, *Yzquepatl*, ou *Vulpecula*, eſpece de *Renard* par Seba *p.* 66. *t.* 40. *n.* 2. Ce n'eſt, dit M. KLEIN, ni un *Tamandua*, ni une eſpece de *Vulpecula*, ni l'*Yzquiepatl*, ſuivant la deſcription qu'en donne Hernandez.

## V I.

*LOUPS*, Animaux du Genre des *Chiens*, & dans l'Ordre des *Feræ* par M. LINNÆUS.

1. LOUP. En Grec Λυκος, Λυκαινα la femelle, *Lupus*; en Allemand *Wolf*, la Louve *Lupa*, en Allemand *Der Wolf*. Le *Loup*, qui eſt du Genre des *Chiens*, eſt très-grand & très-feroce. Les Grecs nomment les *Loups*, des *Chiens nocturnes*. Il hurle, & le *Chien* aboye. On dit qu'on n'en voit point en Angleterre. Les Païs Septentrionaux en ſont remplis. Ceux qui habitent les Montagnes qui ſéparent la Suede d'avec la Norvege, ſont blancs. Paul Jove parle de *Loups noirs*, qui ſe trouvent dans cette Partie de la Moſcovie, qui conduit en Pruſſe. M. LINNÆUS nomme le *Loup*, *Canis caudâ incurvâ*, & en Suedois *Warg* & *Ulf*. On peut conſulter ſur cet Animal Geſner, Aldrovande *Quad.* 144. Jonſton *Quad.* 89. Charleton *Onom.* 14. Rai *Quad.* 173. & le *Dictionnaire des Animaux*.

2. LOUP doré, Animal d'Aſie. *Lupus aureus Aſiaticus*, Χρυσεος. Il eſt petit, furieux, & d'une belle couleur. Selon Buſbecq, ces *Loups* ſont plus grands que le *Renard*, & plus petits que le *Loup* vulgaire. Il en a vû proche de Nicée entrer la nuit dans les tentes & les maiſons des Turcs dévorer tout ce qu'ils trouvoient. Ils rongent les ſouliers, les ceinturons, les foureaux. Ils marchent en troupe, & on en rencontre quelquefois enſemble des bandes de deux cents. Voyez

Belon *Sing. Observ.* 2. *c.* 108. & Kœmpfer ſur cet Animal, 407 *f.* 4.

3. LOUP marin. Belon, Geſner, Aldrovande, & autres, parlent de cet Animal amphibie. M. Anderſon parle d'un *Loup marin*, qui eſt le *Veau marin*, ou le *Phoca*. Ce n'eſt pas le même. Nous en donnerons la Notice *Famille V.*

4. LOUP de l'Amérique, *Lupus Americanus*. Selon Cateſby *App. p.* 26 les *Loups de l'Amérique* ont la forme & la couleur de ceux d'Europe; mais ils ſont plus petits. Anciennement les *Loups* étoient les Animaux domeſtiques des Indiens, qui n'avoient point d'autres *Chiens* avant qu'on leur en amenât d'Europe. Depuis ce tems-là les races des *Chiens* & des *Loups* d'Europe ſe ſont mêlés, & ſont devenues prolifiques.

Les *Loups* de la Caroline, ſelon le même Auteur, ſont en très-grand nombre, & plus malfaiſans qu'aucun autre Animal. Ils s'attroupent dans la nuit, & vont chaſſer le *Daim* comme des *Chiens*, en pouſſant les hurlemens les plus affreux.

Jean Faber *pag.* 479. parle d'un *Loup* du Mexique.

Selon M. KLEIN, l'expérience apprend que les *Loups* s'accouplent avec les *Chiennes*; mais que jamais les *Chiens* ne s'accouplent avec les *Louves*. Les *Loups* ont un temps dans l'année pour leurs amours; alors ils s'aſſemblent en troupe, & vont chercher leurs femelles. Mais il n'eſt point vraiſemblable que les *Chiens* en aucun tems de l'année recherchent la Compagnie des *Loups*.

## VII.

*RENARDS*, Animaux du même Ordre & du même Genre chez M. LINNÆUS que les *Chiens* & les *Loups*.

1. Le RENARD, en Grec Αλωπηξ, en Latin *Vulpes*, en Allemand *Fuchs*, en Suedois *Raf*, en Anglois *A Fox*, nommé par M. LINNÆUS *Canis caudâ rectâ longitudine corporis*, aboye comme le *Chien*. Il en differe par le poil; mais les parties intérieures ſont les mêmes que

celles du *Chien*. Le *Renard* vulgaire ſe fabrique une demeure, qui a pluſieurs ſorties. On dit qu'il ſurpaſſe tous les autres Animaux en fineſſe. On en voit de différentes grandeurs, & de différentes couleurs, ſuivant les lieux. On a vû des *Renards noirs*, dont les peaux ont été vendues en Ruſſie plus de quinze écus d'or.

On voit en Suede, ſelon M. LINNÆUS, pluſieurs varietés de *Renards*. Voyez ſur le *Renard* Geſner, Aldrovande, Jonſton, & le *Dictionnaire des Animaux*.

2. RENARD cendré de l'Amérique, *Vulpes cinereus Americanus*. Cateſby 11. *p.* 78. en Anglois *The gray Fox*, en François *Renard gris*. Ces *Renards*, dit l'Auteur, ſont entierement d'un gris-argenté. Ils différent très-peu de ceux d'Europe. Ils n'habitent pas dans des trous ſous terre, mais dans les trous des Arbres.

## VIII.

Animaux approchans des *Renards*, dont les uns ſont mis par M. LINNÆUS dans le Genre des *Canes*, les autres dans l'Ordre des *Meles*, & d'autres dans le Genre des *Muſtelæ*, & tous dans l'Ordre des *Feræ*, auſquels M. KLEIN, qui en fait un Genre particulier, donne le nom de *Coati*. Ces Animaux, nommés en Allemand *Halb-Fuchs*, approchent beaucoup, ſelon ce Naturaliſte, du *Renard* par le Muſeau, la figure de la tête, le nombre & la figure des dents, & par leur odeur forte. Leur queue communément eſt couverte de poils par anneaux. Ce ſont tous Animaux étrangers, excepté le *Blaireau* ou *Taiſſon*.

1. COATI du Bréſil, ſelon Marcgrave, eſpece de *Renard* de la grandeur d'un *Chat*. Dans le *Muſ. Worm. p.* 319. on en voit une fort belle figure. Laet, Rai, & pluſieurs autres parlent de cet Animal. Les Anglois le nomment *Rattoon* & *Rackoon*. Il y a quelque différence entre la deſcription qu'en donne Wormius & celle de Marcgrave, pour la couleur & la longueur de la queue. Cateſby *App. p.* XXIX. parle d'un Animal de l'Amérique ſemblable au *Renard*. Cet Auteur marque

qu'il y en a un grand nombre à la Virginie, à la Caroline, & dans toutes les parties ſeptentrionales de l'Amérique. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

2. COATI MONDI de Marcgrave. Cet Animal ſe trouve décrit dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences *Tom. III.* M. KLEIN marque avoir eû longtems un *Coati-Mondi* vivant, dont il fit préſent en 1723. à deux Dames de ſa connoiſſance

3. COATI d'Hernandez, ſemblable au *Renard*, nommé *Yzquiepatl*, qui a preſque deux palmes de long. Il ſort du corps de cet Animal une odeur inſupportable.

Il y a, dit Hernandez, deux autres eſpeces de *Renards*, dont l'un pareillement eſt nommé *Yzquiepatl.* Il a ſur le corps beaucoup de bandes blanches: l'autre eſt nommé *Conepalt* ou jeune *Renard.* Il ne differe pas beaucoup du *Coati* nommé *Rattoon* par la grandeur & la figure du corps, mais c'eſt un Animal fort puant. Voyez Rai *Synop. Quad.*

4. COATI GENETTE, *Coati Ginetta*, dont parlent Aldrovande, Belon & Scaliger. M. LINNÆUS, *Syſt. N.* 6-8. met cet Animal dans le Genre des *Belettes*, & le nomme *Muſtela caudâ annulis nigris albidiſque cinctâ.* Il ſent le muſc. On le nomme *Geneto-Catus*; en Allemand *Genith-Katz*; mais il n'a rien de commun avec le *Chat*, dit M. KLEIN

5. CIVETTE, CHAT CIVETTE, *Civetta vulgo*, *Catus Zibethicus*, *Felis Zibethica*, en Anglois *The Civet-Kat.* Cet Animal, comme le remarque M. KLEIN, n'appartient point au Genre des *Chats*, mais au Genre des *Chiens.* M. LINNÆUS le met dans le Genre des *Meles*, & le nomme *Meles unguibus uniformibus.* La *Civette* convient aſſez avec le *Chien* & le *Loup* par la tête, la figure du muſeau, la forme & le nombre des dents. On en trouve la figure & la deſcription dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Faber décrit la maniere dont on recueille la liqueur odoriférante que produit cet Animal. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

6. TAISSON, ou BLAIREAU: *Coati* à queue courte.

*Coati caudâ brevi*; *Taxus*, *Meles*; *Tar* en Allemand; *The Padger*, *Brock*, ou *Gray* en Anglois; en Suedois *Graef-Svin*. *Coati Griseus*. Cet Animal, mis par M. LINNÆUS dans le Genre des *Meles*, est nommé par ce Naturaliste *Meles unguibus anticis longissimis*. *Syst. Nat.* 10-1. & *Faun. Suec. n.* 15. Gesner *Quad.* 686. Aldrovande *Quad.* 264. Jonston, 64. Rai & les autres, en parlent. Ces Naturalistes nous donnent des *Taissons* à museau de *Porc*, & à museau de *Chien*. M. KLEIN marque qu'on n'en a point encore vû. La figure qu'Aldrovande (*pag.* 267.) donne d'un *Taisson* à museau de *Cochon*, est celle du *Coati Mondi*, qui, suivant le Naturaliste d'après qui j'écris, a le museau fait comme celui du *Porc*. On connoît des *Taissons* à tête de *Chien*.

7. COATI de l'Amérique, approchant de l'OURS. *Coati Ursulo affinis, Americanus*; en Anglois *The Quick-Hatch*, ou *Wolverene*. Édouard *de avibus* 11. *p.* 103. Catesby *Append. p.* xxx. en parle sous le nom de *Ursulo affinis Americana*. On en voit à la Baye de Hudson. Il est nommé *Coati maximus*, parce qu'il est presque du double plus grand que le *Renard vulgaire*. Dans le premier voyage que le Chevalier Sloane a fait à la Baye de Hudson, il en a apporté un vivant.

## IX.

ANIMAUX du Genre des *Chats*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ*. *Systêm. Nat. n.* 5. *Faun. Suec. n.* 3.

Ces Animaux, nommés *Genus Felinum*, ont tous la figure comme quarrée, cinq doigts aux pieds de devant, garnis d'ongles faits en demi croissant, pointus, qu'ils cachent dans des especes de fourreaux, comme le dit Pline VIII. 15. dont ils se servent pour prendre leur proie, & se défendre quand on les insulte. Le *Lion*, la *Panthere*, le *Chat domestique*, ont les pieds faits les uns comme les autres. Ce sont tous des Animaux méchants, qui marchent d'une grande vitesse.

Pour le nombre de leurs dents, qui eſt différent, les Auteurs n'en conviennent pas.

## *CHATS.*

1. CHAT domeſtique, *Catus domeſticus*, *Felis domeſtica*, en Allemand *Katze*, en Suedois *Katea*. Animal très-connu, nommé par M. LINNÆUS *Felis caudâ elongatâ, auribus æqualibus. Syſt. Nat. n. 5-6. Faun. Suec. n. 3.*

2. CHAT ſauvage, *Catus ſylveſtris, ferus, vel feralis.* Il monte ſur les arbres, & il y reſte. Il eſt plus grand que le *Chat domeſtique.*

3. CHAT TIGRE, ou CHAT ſauvage de l'Amérique. Seba *pag.* 47. *t.* 30. *n.* 2. Cet Animal a le regard féroce & horrible. Il attaque les Bêtes au viſage, leur arrache les yeux avec les ongles, déchire la peau, & ſe ſoule de leur ſang.

4. Il y a un autre CHAT TIGRE de la nouvelle Eſpagne, nommé *Tepe Maxtlaton.* Seba *p.* 77. *t.* 48. *n.* 2. Il eſt plus féroce que le *Tigre.* Ses yeux ſont grands. M. KLEIN dit avoir vû dans le Cabinet du Roi à Dreſde, la peau d'un Animal ſous le titre de *Chat Tigre* de Surinam.

5. CHAT volant de Ternate, *Catus petauriſta, volans.* Seba *p.* 93. *t.* 58. *n.* 2. 3. parle du mâle & de la femelle. La membrane qu'il a aux pieds, lui ſert d'ailes. Il a la tête du *Chat ſauvage.*

6. CHAT de la nouvelle Eſpagne, à muſeau pointu, nommé OXYCEPHALON, *Catus roſtro acuminato ex novâ Hiſpaniâ.* Seba *p.* 76. *t.* 48. n. 1. Il demeure dans les deſerts, & ſe place ſur les arbres élevés, où il fait la chaſſe aux petits Oiſeaux. Quand il eſt apprivoiſé, il joue & badine comme nos jeunes *Chats domeſtiques.* Sa ſueur ſent le muſc.

7. CHAT de Montagne, *Catus montanus*, nommé *Quanhpecotli* par Hernandez. Seba *p.* 68. *t.* 42. *n.* 2. dit que c'eſt une maligne Bête, dont la queue eſt groſſe & longue. Cateſby *Append. p.* XXV. parle du *Chat ſauvage* de l'Amérique.

## *LYNX*, ou *LOUP CERVIER.*

1. LYNX, ou LOUP CERVIER, en Grec Αυγξ, de Αυκη, *lumen*, lumiere, parceque cet Animal a la vûe très-perçante. *Lynx*; *Lupus Cervarius*, parcequ'il eſt l'ennemi des *Cerfs*; en Allemand *Luchs*, en Suedois *Warglo*. Les uns en donnent deux eſpeces différentes, les autres trois. M. KLEIN appelle ſimplement *Lynx* le *Loup cervier*. Pline diſtingue celui-ci du *Lynx*. Il eſt très-grand, & il eſt marqué de grandes taches ſans ordre, qui ſont plus rouſſes. On en peut voir la figure & la deſcription dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *Tom. III. pag.* 125.

Il y a une autre petit *Lynx*, qu'on nomme *Lynx-Chat*, dont la peau eſt mieux variée. Il eſt mieux nommé *Lynx-Tigre*, que *Chat-pard*, dit M. KLEIN; en Allemand *Katzen-Luchs*. Si on veut une troiſiéme variété de *Lynx*, le même Naturaliſte ajoute qu'il nommeroit *Lynx* de Perſe, le *Siyah-Ghuſh*, Animal qui a les oreilles noires, les yeux d'un *Lynx*, dont la peau eſt ſans tache. Charleton en donne la figure, *Exercit. pag.* 23. Il a la queue plus longue qu'un veau. Rai *Synop. Quad. p.* 168.

Les meilleurs *Lynx* ſont ceux d'Aſie & d'Afrique. On donne le premier rang aux *Lynx* de Perſe. M. KLEIN a vû à Dreſde un *Lynx* d'Afrique très-tigré, & dont les pieds étoient hauts. Ceux qu'on voit en Europe, en Pruſſe & dans le Nord, ne ſont pas beaux. Ils n'ont rien de blanc; ils ſont roux, avec des taches qui ſe ſuivent. Les Peauciers Allemands nomment les *Lynx* de Perſe *Katz-Luchſen*, & les autres d'Aſie & d'Afrique *Kalb-Luchſen*. Les *Lynx* de l'Amérique, ſelon M. KLEIN, doivent être plutôt mis dans le rang des *Léopards*, ou après les *Léopards*, que dans le rang des *Lynx*: on y peut auſſi ajouter le *Chat-pard*, qui a les oreilles d'un *Chat*, & la queue tronquée. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

2. LYNX d'Afrique d'Aldrovande *pag.* 92. *Lynx Africana.* Charleton & Rai en parlent. C'eſt le *Loup Cervier* de Geſner 155. M. LINNÆUS le nomme *Felis caudâ*

*truncatâ, corpore rufescente maculato. Faun. Suec. n. 4. Syst. Nat. n.* 5-7. Les Suedois le nomme *Warglo*; les Prussiens simplement *Luchs*. C'est le *Loup-Cervier* des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.

3. LYNX blanc, nommé dans les Actes d'Upsal, *Lynx colore albo, maculis nigris, caudâ truncatâ* 1736. *p. 2. n. 3.* par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n. 5. Felis caudâ truncatâ, corpore albo maculato*, & *Syst. Nat. n.* 5-8. en Suedois *Kattlo*; en Prussien *Katz-Luchs*. Il monte sur les arbres, & on en trouve, mais rarement dans les vastes Forêts.

4. LYNX à queue de *Veau*, garnie de poils plus longs au bout. *Lynx caudâ vitulinâ*. Il n'est point tacheté. Il a la face, les pieds & les oreilles du *Lynx*. C'est le *Siyah-Ghush* de Charleton.

## *LÉOPARD.*

LÉOPARD, en Latin *Pardus* pour le mâle; en Allemand *Parder*, la Femelle *Panthere*, *Panthera*, *Pardalis*. Les Anciens ne s'accordent pas bien ensemble sur le nom de cet Animal. LÉOPARD, *Leopardus*, passe aujourdui pour être ce qu'ils nommoient *Pardus* & *Pardalis*.

Il prétendoient que le *Léopard* étoit engendré du *Pard* & de la *Lione*, & le *Cameléopard* de l'accouplement du *Chameau* avec la femelle du *Pardus*. En admettant ces contes il faudroit convenir que les races *Hybrides*, c'est-à-dire sorties de mere & de pere d'especes différentes, multiplieroient des Genres d'Animaux *Mixtes*, qui tiendroient d'eux, & conséquemment il ne faudroit pas refuser la fécondité aux *Mulets*, sortis soit d'un *Ane* & d'une *Cavale*, soit d'un *Cheval* & d'une *Aneſſe*.

1. Le LÉOPARD, *Pardus*; *Pardalion* par Aristote; Παρδος; *Lupus canarius* & *Luparius* par Gaza; *Varius simpliciter*, *Africanus*, selon Pline; ne sont tous qu'un même Animal, comme le remarque Faber sur le témoignage de Pline, c'est-à-dire le *Léopard* & la *Panthere*,

que M. LINNÆUS nomme *Felis caudâ elongatâ, maculis ſuperioribus orbiculatis, inferius virgatis. Syſt. Nat. n.* 5-3.

2. CHAT-PARD, *Pardus caudâ brevi*, nommé par M. LINNÆUS *Felis caudâ elongatâ maculis ſuperioribus virgatis, inferioribus punctatis Syſt. Nat. ibid.* 4. Cet Animal eſt diſtingué du précédent parce qu'il a la queue & le col plus courts. On en trouve la deſcription & la figure dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. M. LINNÆUS donne la deſcription d'un *Chat-pard*, qui ſe trouve dans la Ménagerie de Cliffort en Suede. *Syſt. Nat. édit. 6. p.* 4. Voyez le *Dictionnaire des Animaux.*

## *TIGRES.*

1. TIGRE d'Aſie. *Tigris Aſiatica.* Seba *p.* 52. *Tab.* 32. *n.* 7. 8. donne la figure de deux jeunes *Tigres* de l'Iſle de Ceylan, tous les deux ornés de fort belles taches par tout le corps. Le *Tigre* a la queue longue. M. LINNÆUS le nomme *Felis caudâ elongatâ, maculis virgatis. Syſt. Nat.* 5.-2. Voyez ſur cet Animal Raï *Quad.* 165. Bontius 53. & les autres, & le *Dictionnaire des Animaux.*

2. TIGRE de l'Amérique. *Tigris Americana*; JAQUARA au Breſil, ONCA par les Portugais. Il eſt de la grandeur du *Loup*, & même un peu plus grand.

3. TIGRE nommé *Jaquerete* par Marcgrave, autre eſpece de la grandeur d'un *Taureau* d'un an. Il eſt plus cruel que le précédent.

4. TIGRE, nommé *Cuguacuarana* par Marcgrave. Il eſt de la grandeur & de la figure du *Juguara*, mais d'une couleur différente.

## *LION.*

LION, en Grec Λεων; en Latin *Leo*; en Allemand *Lowe*; en Anglois *a Lion*; la femelle Λεαινα en Grec; *Leæna* en Latin: nommé par M. LINNÆUS *Felis caudâ*

*elongatâ, floccosâ, thorace jubato.* C'est le Prince des Bêtes féroces; on n'en voit qu'en Asie & en Afrique, & non en Amérique. On peut consulter Aldrovande, Votton, les Mémoires de l'Académie des Sciences, Rai, Kolbe & les autres, & le *Dictionnaire des Animaux.* Tous les Lions ne sont pas de la même grandeur.

## X.

1. OURS, en Grec Αρκτος, *Ursus*; en Allemand & en Anglois *Bear.* Animal mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ.* Cet Animal est facile à distinguer des autres par la figure de son corps, large & tout hérissé de poil. Il est assez connu dans les Païs septentrionaux. On compare ses ruses à celles du *Renard.* Il monte sur les arbres, frappe avec les pieds de devant, & en frappant il tue un *Bœuf.*

L'*Ours* en Pologne varie. Le plus grand nommé l'*Ours des Fourmis*, en Allemand *Ameisen Bear*, est noir: le petit nommé *Ours vulgaire*, en Polonnois *Niedzwiedz*, est de couleur fauve: le plus petit, nommé *Ours blanc*, en Allemand *Silber-Bear*, se trouve sur les confins de la Russie blanche & noire. Les grands sont cruels. On en a vû en Pologne d'une grandeur extraordinaire, qui égorgerent quelques dixaines de *Chevaux*, & autre Bétail. M. KLEIN parle de la peau d'un *Ours*, qui avoit dix aulnes de long, & d'une autre, qui en avoit six. Les peaux *d'Ours* qu'on envoye de Lithuanie à Dantzic, ordinairement ont huit pieds. En 1721. on vit dans la Polesie Polonnoise une troupe de quatre-vingts *Ours.* Les jeunes *Ours* enlevés à leur mere, sont capables d'instructions, & divertissent. Voyez sur les *Ours* Rzaczinski *Part. I. & II.* Gesner, Aldrovande, Scott & les autres. M. LINNÆUS le nomme *Faun. Suec. n.* 2. & *Syst. Nat. n.* 4. *Ursus caudâ abruptâ.* Voyez *le Dictionnaire des Animaux.*

2. OURS blanc de Martens, en Anglois *Witte Bear.* Il a la tête longue comme celle du *Chien.* Il est plus alerte que *l'Ours vulgaire.* En Groenlande ils sont blancs & noirs. Ils ne quittent jamais la terre ferme. Les au-

tres vont sur la Mer glaciale, où ils se nourrissent de Poissons & d'Animaux, comme les *Phoca* ou *Veaux marins*; & quelquefois des tables de glace amenent de ces *Ours* en Norvege.

Il est parlé dans les actes de Stockolm 1747. & dans le *Musæum Worm.* 319. d'un *Ours* à queue longue, *Ursus caudâ elongatâ.*

## XI.

GOULU, *Gulo*, *Boophagus*, *Magnus Vorator*, *Rosomacha*; *Multivorus* selon Olaus Magnus. C'est le *Coriphée* des *Quadrupedes voraces.* Gesner & Aldrovande pensent que c'est l'*Hyene* des Anciens: d'autres ne sont pas de ce sentiment. Scaliger l'appelle *Vautour quadrupede.* Il y a une *Hyene*, qui est le *Taxus Porcinus*, *Taisson* à tête de *Porc* de Kœmpfer 407. *f.* 4. que M. LINNÆUS met dans le Genre des *Chiens*, & qu'il nomme *Canis pilis cervicis erectis longioribus. Syst. Nat.* 8-4. & il appelle le *Goulu*, qu'il met dans le Genre des *Belettes*, *Mustela rufo-fusco*, *medio dorsi nigro. Faun. Suec. n.* 6. *Syst. Nat. n.* 6.-1. Selon Mathieu Michovius, le *Goulu* est de la grandeur d'un *Chien.* Il y en a qui préferent sa peau aux *Zibelines*; c'est peutêtre la raison pour laquelle M. LINNÆUS le met dans le rang des *Belettes.* L'Histoire de cet Animal est fort incertaine. Voyez néanmoins Olaus Magnus, Charleton & Scheffer, ou ce que nous en disons d'après M. KLEIN dans le *Dictionnaire des Animaux.*

## XII.

SATYRE, *Satyrus*; en Allemand *Satyr*; en Grec Ανθρωπομορφα; Animaux à figures humaines, qui ressemblent par quelques parties extérieures à l'*Homme.* Sous ce nom M. KLEIN entend les *Singes*, que M. LINNÆUS met dans le premier Ordre de ses *Quadrupedes*, qui sont les *Anthropomorpha.* il y a deux Genres de *Singes*, ceux qui n'ont point de queue ou qui l'ont très-petite, & ceux que l'on nomme *Cercopitheques*, ou *Singes à queue.*

Les *Singes* ſont nommés par les Grecs *Hommes ſauvages*, Ανδρες Αγριος, *Viri ſylveſtres*; *petits Hommes*, Μικροι; *Pygmées*, Πυγμαιοι; *Hommes à face de Chien*, Ανθρωποι κυνοπροσωποι, *Bêtes ſauvages à quatre mains* Ερια. Les Anciens & les Poetes ont encore mis entre les *Hommes* & les *Singes* d'autres Créatures, ſavoir, les *Faunes*, les *Panes*, les *Ægipanes*, les *Sylvains*, les *Silenes*, les *Nymphes*, & les *Sphinx*, dont pluſieurs, diſoient-ils, tiroient leur origine des *Singes*. Les Latins, ſelon Des Marchais III. *p.* 311. diſtinguent deux ſortes de *Singes*. Ils appellent *Cercopitheques*, ceux qui ont une longue queue; & ſimplement *Singes*, *Simia*, ceux qui n'en ont point. Ces deux eſpeces, qu'on pourroit regarder comme deux genres différens, ſe diviſent en une quantité prodigieuſe d'eſpeces, qui different entr'elles en grandeur & en couleur, & de tant d'autres manieres, qu'on en feroit des volumes entiers. Voyez *Prodrom. Nat. Hiſt. Quadrup. p.* 10. *& ſuiv.* la diviſion de M. KLEIN, qui eſt la même que celle des Latins. Nous allons dabord donner la notice de quelques *Singes*, qui n'ont point de queue, & enſuite celle de ceux qui en ont.

## *SINGES, qui n'ont point de queue.*

1. SINGE, *Simia*; en Allemand *Affe*; en Grec Πιθηκος. Animal qui n'a point de queue, ou qui en a une très-petite; dont la tête eſt plus élevée que longue; qui a des ongles comme l'*Homme*, mais courbés, & en quelque façon ronds, ſelon Pline. La femelle a ſa partie naturelle comme celle de la *Femme*.

2. SINGE nommé *Ourang-Outang*, c'eſt-à-dire, *Homme ſauvage*, ou *Homme des Bois*. *Baris*, ou *Barris*, *Pigmée* de Guinée, nommé par les Anglois *Chimparée*. Les Indiens diſent que ces *Singes* naiſſent du commerce que les Femmes Indiennes ont avec les *Singes* & les *Cercopitheques*. Voyez la deſcription d'Afrique de Dapper *pag.* 393. & 583. Il en donne la figure. *Tranſact. Philoſop. n.* 256. *p.* 338. Tulpius *Obſerv. Med. L. III. c.* 56. Schott *Phyſic. cur. P.* 11.

3. SINGE de l'Isle de Ceylan, qui a la levre supérieure comme le *Liévre*, nommé par Seba I. *p.* 75. *t.* 47. *n.* 1. *Cercopitheque* de Ceylan, ou grand *Paresseux* mâle. Cet Auteur dit qu'il n'a point de queue. Il n'est donc pas *Cercopitheque*, mais *Singe*; c'est la remarque de M. KLEIN. Il n'est pas aussi Paresseux, *Tardigradus*, ou *Ignavus*. C'est le même Animal, dit Rai *Synop. p.* 161. que Robinson a vû dans le Cabinet d'Histoire Naturelle de Charleton, tenant le milieu entre le *Singe* sans queue & le *Cynocephale*, qui n'a point de queue, ou qui l'a fort courte.

4. SINGE à museau de *Chien*, *Simia rostro canino*. Il a la tête élevée. Charleton le nomme *Animalcule*, mais mal: nommé aussi *Paresseux* de l'Isle de Ceylan, c'est une espece de *Singe*. Seba *p.* 55. *t.* 35. *n.* 1. & 2. parle du mâle & de la femelle. Mais il est aussi mal nommé *Tardigradus*. Il a la figure & les gestes des *Singes*, avec lesquels il convient en plusieurs choses.

5. SINGE, nommé MAMONET. Thomas Barthol. *in Acad. Med.* 1671. 1672. *vol.* 1. dit qu'il est d'une forme singuliere. Est-ce un *Singe* sans queue, ou un *Singe* avec une queue, c'est-à-dire un *Cercopitheque?* Chez Jonston *t.* 59. c'est un *Cercopitheque* à queue longue, & celui dont parle Bartholin, n'en a point. Gesner *p.* 862. en donne un qui n'est pas beaucoup différent, mais il a la tête du *Chien*, plutôt que celle du *Porc*. Albert le Grand nomme *Mamonet* une espece de *Singe* à queue. Gesner dit aussi *p.* 856. que le *Mamonet* est un petit *Singe*. Celui dont parle Bertholin, n'a point de queue, & ce n'est pas une grande espece de *Singe*, comme il est permis de le soupçonner, car aucun ne la dépeint pour un *Cercopitheque*. A la face horrible qu'il a, ou c'est un *Monstre*, ou un Animal qui jusqu'ici n'avoit encore été vû ni dépeint par personne. Voyez la description qu'en donne l'Auteur cité *pag.* 67. la figure *p.* 313. Blasius *tab.* XXIX.

## *SINGES à queue, ou CERCOPITHEQUES.*

En Latin *Cebus*, du Grec Κηβος; *MeerKatze* en Alle-

mand; CERCOPITHEQUE, *Cercopithecus*, du mot κερκος, *cauda*, queue, & Πιθηκος, *Simia*; en Anglois *A Monkey*. Ils ont la queue d'un *Chat*, la tête les uns comme des *Lions*, les autres comme des *Chiens*, *Leonicipites*, Κυνοκεφαλοι, Κυνοπροσωποι, *Galeopitheculi*.

1. CEBUS, nommé SAGOUIN. C'eſt une des plus petites eſpeces de *Cercopitheques*. Cluſius *Exot.* 372. Nertemberg IX. 177. *figur. tab. III.* M. KLEI en parle *Prodrom. Quad p.* 11.

Il y a un plus grand *Sagouin*, nommé CAY par Cluſius, de couleur noire, mais qui n'eſt pas plus grand qu'un *Ecureuil*.

Il y a encore un autre *Sagouin*, qui a de la peine à ſupporter le mouvement d'un Vaiſſeau agité par la Mer. Il eſt ſi peu endurant, que pour la moindre choſe il aime mieux s'abſtenir de manger, & mourir de faim, que de ſouffrir la moindre peine ou mortification.

Le *Callitriches* des Anciens eſt une eſpece de *Sagouin* blanc & très-beau, mais ſi délicat, qu'il faut pour le réchauffer le tenir dans une peau fourrée, ou le porter dans ſon ſein. Il a une queue de *Chat*, ou de *Coati*, variée. Voyez Ludolphe *Hiſt. d'Ethiopie l.* 1. *c.* 10. *n.* 58. qui donne les figures du *Cercopitheculus*, & du *Galeopitheculus*.

2. CEBUS à tête de mort, *Cebus caput mortuum*. C'eſt le plus petit des *Cercopitheques*. Il a la figure d'une tête de mort, par ſes yeux enfoncés, & ſon nez camus & tronqué. Les Femelles ont aux mamelles deux mamelons. Seba I. *p.* 52. *t.* 33. *n.* 1.

3. CEBUS. Petit *Singe* de l'Iſle de Ceylan. Seba *pag.* 77. *t.* 48. *n.* 3. Il n'en donne point la deſcription. Il eſt du nombre des plus petits *Cebus*, ou *Cercopitheques*.

4. CEBUS GARIBA de Marcgrave, *Cercopitheque* de la grandeur du *Renard*. Il y a de ces Animaux qui ſont noirs, & qui violent les Negreſſes, quand ils en rencontrent. Rai *Quad. p.* 154.

5. CEBUS du Breſil, nommé CAITAIA, qui ſent le muſc.

6. Grand CEBUS d'Angola, nommé *Macaquo*, de la couleur du *Loup*, qui a la tête ſemblable à celle d'un *Ours*.

Autre CEBUS d'Angola, qui a parmi ſon poil tout noir quelque poils blancs mêlés enſemble.

7. CEBUS BARBU de Guinée. nommé *Exquima*, qui a une belle barbe blanche. C'eſt un grand Sauteur.

Autre *Exquima* de Guinée, dont la couleur, pour la plus grande partie, eſt noire.

Troiſiéme *Exquima* de Guinée, plus petit que le premier, qui eſt ſans barbe.

8. Second CEBUS barbu de Cluſius, qui eſt beau.

9. Premier CEBUS ſans barbe de Cluſius, dont le poil eſt brun & jaune.

10. Second CEBUS ſans barbe de Cluſius. Il eſt grand.

11. CEBUS, nommé *Bugée*. Il reſſemble au *Caſtor* par la figure de la tête, le poil & la grandeur. Il eſt rare dans l'Inde: Rai *Synop. Quad. p.* 158. Le *Simia ſciurus lanuginoſus fuſcus* de l'Iſle de Joanna, dont parle Petivert *Gazoph. Nat. Tab.* 17. *f.* 5. & nommé en Anglois *A Bugée from Joanna* par Sloane *Voyage de la Jamaique II. p.* 329. eſt un *Singe* de la même eſpece.

12. CEBUS ELAURANDUS de l'Iſle de Ceylan. *Singe* blanc, dont la barbe eſt noire.

Autre *Cercopitheque* à poils noirs, dont la barbe eſt blanche; *Wanduru* de l'Iſle de Ceylan, *Cercopitheque* tout blanc, dont il eſt parlé dans le Catalogue des *Quadrupedes* du Cabinet de Peterſbourg.

13. CEBUS, nommé PAPIO, *ou* BABOON. C'eſt l'*Hyene* de Geſner, un *Cynocephale*, ou *Singe* à tête de *Chien*, Κυνοπροσώπος. M. KLEIN dit avoir vû la peau d'un jeune *Papio*, dont la queue étoit courte. Peutêtre que le Marchand l'avoit coupée. Franzius & Cyprien ſon Continuateur mettent le *Papio* dans le rang des *Singes* qui n'ont point de queue, parcequ'il a la queue courte. Geſner, Cluſius, Kolbe, & d'autres Écrivains, aſſurent que les *Papios*, que les Italiens nomment *Babouini*, ont la queue longue. M. LINNÆUS met le *Papio* parmi les *Singes* qui n'en ont point ou preſque point.

14. CEBUS à tête de LION. *Cebus Leocephalus*, *Leoni-*

*ceps*; en Allemand *Lœwen-MeerKatze*; en Anglois *The Little Lion-Monkey*. Édouard 194. dit que c'eſt un *Singe* de la *Vera-Crux*.

15. CEBUS qui rit des dents. Édouard *ibid.* 196. C'eſt un *Singe* de l'Amérique.

16. CEBUS à tête de *Renard*. *Cebus capite vulpino.*

On trouve dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences la deſcription anatomique de quatre *Cebus* ou *Cercopitheques Tom. III.* M. LINNÆUS, ainſi que tous les autres Naturaliſtes, diviſent les *Singes* en *Singes* qui n'ont point de queue, *Simia ecaudata*, & en *Singes* qui en ont, *Simia caudata*. On peut ſur ces Animaux conſulter Seba, Rai, Petivert, Marcgrave, Cluſius, & tant d'autres, & le *Dictionnaire des Animaux*.

---

# FAMILLE V.

## ANIMAUX A CINQ DOIGTS.

*PENTADACTYLON, mais dont les pieds ſont irréguliers; & que* M. KLEIN *nomme* Anomalopedia.

CES Animaux ſont le *Loutre*, le *Caſtor*, le *Roſmarus*, Bête à la grande dent, & le *Phocas*, tous *Amphibies*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Feræ*, excepté le *Caſtor*, que ce Naturaliſte met dans l'Ordre des *Glires*.

### I.

1. LOUTRE, Ενυδρις en Grec; en Allemand *Otter*; en Suedois *Utter*. Cet Animal ne peut durer longtems ſous l'eau. Il fait un grand dégât dans les Étangs. M. LINNÆUS le nomme *Lutra digitis æqualibus, Faun. Suec.* 10. & *Syſt. Nat.* 7-1. On en voit la figure dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

2. LOUTRE du Breſil, *Lutra Braſilienſis*, nommé par M. LINNÆUS *Lutra pollice digitis breviore*. C'eſt

l'*Yiya* & *Cariguibeju* de Marcgrave ; Rai *Synop. Quad. p.* 187.

II.

CASTOR, en Latin *Caſtor*, *Fiber* ; en Allemand *Biber* ; en Anglois *The Beaver*. Cet Animal eſt ſingulier, & même irrégulier par ſes pieds de derriere & ſa queue. Voyez dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences *Tom. III. & ann.* 1737. *p.* 10. Wepfer, Wotton, Geſner, les *Tranſact. Philoſoph. n.* 430. Cateſby *Append.* xxix. Élien, Belon, & les autres. On dit que ceux d'Europe, que nous nommons *Bievres*, vivent plus longtems que ceux de l'Amérique. Il y en a en Norvege de noirs & de blancs, en Canada de bruns. M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 23. & *Syſt Nat. n.* 50. le nomme *Caſtor caudâ ovatâ planâ*. Rai dit que la race des *Caſtors* eſt entierement éteinte en Angleterre & dans la Province de Galle. Les *Caſtors* habitent toute la partie Septentrionale du Continent de l'Amérique depuis le trentiéme juſqu'au ſoixantiéme dégré de latitude, & n'ont rien de différent pour la forme, de celle du *Caſtor* d'Europe, dit Cateſby. On voit à Dreſde la peau d'un *Caſtor* étranger tout blanc.

III.

ROSMARUS, que les Allemands nomment *Walroſſ*, les Ruſſiens *Morſſ*, les Anglois *The Seakow*, en Angle-Saxon *Hors-Hwal*, en Latin *Odobenus*, par M. LINNÆUS *Syſt. Nat. n.* 9-2. *Phoca dentibus caninis exſertis*, en Hollandois *Walros* & *Walrus*, en François *Vache-Marine*, Bête à la grande dent, ſelon Denis *deſcript.* des Côtes de l'Amérique, *Sept. vol.* II. *p.* 256. *Amphibie* de la figure du *Phocas*. M. Anderſon a eu une dent d'un de ces Animaux, qui avoit deux pieds un pouce de long, & huit pouces de circonférence à ſa racine. On peut conſulter Martens ſur cet Animal, *Itin. P.* IV. *c.* 4. *n.* 5. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

IV.

PHOCAS, *Robbe* en Allemand ; *Veau marin*, *Veau de*

*Mer*, *Loup de Mer* en François, *Paſa* en Groenlandois; *Kaabe* en Norvege; *Seal* en Anglois; en Danois *Sealhund*; par M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* 9-1. *Phoca dentibus caninis tectis.* C'eſt le *Veau marin*, *Vitulus marinus* des Latins. On en trouve la figure & la deſcription dans les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, dans les *Tranſactions Philoſophiques n.* 469. *p.* 383. Cet *Amphibie* eſt commun dans la Mer Baltique. M. LINNÆUS dit qu'il y a deux eſpeces de *Phocas*. Le premier met bas ſon petit en Février, l'autre en Janvier. L'un vit ſolitaire, l'autre en compagnie; l'un eſt noir, & l'autre blanc. M. KLEIN dit n'en avoir jamais vû de noir. Peut-être, ajoute-t'il, que le *Phocas* qui eſt blanc, n'eſt- que plus ou moins varié de taches noires. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

V.

MANATI, *Manatus*, *Bœuf marin*, *Lamentin*, *Veau marin* d'Aldrovande *p.* 104. mais différent du *Phocas*; *Vache marine* de Cluſius; *Poiſſon cetacée*, qui n'a ni mains, ni aîles, ni nageoires, comme l'ont prétendu les Eſpagnols. Voyez Cluſius, Dapper & les autres, & notre *Dictionnaire des Animaux*.

VI.

LION marin, *Leo marinus*; autre *Amphibie*, dont on voit la figure & la deſcription dans les *Voyages* de la Baye de Hudſon. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

VII.

*Na.* Je ne ſai ſi le *Lézard-écailleux* a échapé à la vigilance de M. KLEIN. Je ne le trouve pas dans aucune famille de ſes Quadrupedes digités. Il eſt chez M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Agriæ*, dont il fait un Genre, ſous le nom de *Manis corpus ſquammatum auriculæ nullæ*. Ce Savant, *Syſt. Nat. édit.* 6, *p.* 8. *n.* 16-1. le nomme *Manis manibus pentadactylis*, *palmis pentadactylis*. C'eſt le *Lacertus ſquammoſus* de Bontius, *ind.* 60. de Cluſius *Exot.* 347. d'Oleatius *Muſ.* 8. *t.* 7. *f.* 1. de Rai *Quadrup. p.* 247. M. Bernard de Juſſieu conſerve dans ſon Cabinet un de ces Animaux couvert de toutes ſes écailles.

Tab. II.
pag. 63. Tom. I.





Maisonneuve Sculp.

# SYSTEME NATUREL
## DU
# *REGNE ANIMAL,*

## PARTIE SECONDE.

## *CLASSE DES OISEAUX.*

### Suivant la Méthode de M. KLEIN.

*Et une Notice de celle de M. LINNÆUS.*

LEs *Oiſeaux* (*a*) ſont des *Bipedes*, qui ont des ailes & ſont couverts de plumes : *Aves Bipedia, aligera, plumoſa.* Cette définition propre aux *Oiſeaux*, les diſtingue des autres volatiles, tels que les *Inſectes volans*, les *Chauve-Souris*, d'autres *Quadrupedes volans*, & des

(*a*) Le nom Hebreu eſt *Aph*, en Latin *volans*. Si on en veut croire J. J. Scheuchzer, un Oiſeau qui s'éleve en l'air ſurmonte 3000 fois plus que ſon poids, & 12000 fois plus, quand il eſt prêt à prendre ſon eſſort. *Avis in altum ſe extollens majorem pondere ſuo vim* 3000. *volatura* 12000. *majorem ſuperare tenetur*, dit cet Auteur. *Job. Phyſ. Sac. pag.* 46.

*Poiſſons volans*, qui ont des nageoires placés aux côtés en forme d'ailes.

M. KLEIN, dont je fais connoître la Méthode, tire les *Familles* des *Oiſeaux*, de la conſtruction de leurs pieds; les *Genres*, de la figure de leur bec; & les *Tribus* ou *Eſpeces*, de la qualité de la tête, ou d'autres marques du corps. Ainſi, ſelon ce Naturaliſte, les extremités des parties du corps, comme les pieds & le bec, apprennent l'ordre naturel des *Oiſeaux*.

La premiere Famille comprend les *Didactyles*, ceux qui ont deux doigts aux pieds, ſans en avoir derriere.

La ſeconde les *Tridactyles*, ceux qui ont des doigts ſimples, ſans en avoir derriere.

La troiſiéme les *Tetradactyles*, ceux qui ont deux doigts devant & deux derriere, ſimples tous les quatre. Il y a de ces *Oiſeaux* à quatre doigts, qui ſe ſervent de leur bec crochu pour monter & deſcendre, tels ſont les *Perroquets*. D'autres montent appuyés ſur leur queue, & ſe ſervent de leur bec fait en forme de triangle, *Roſtrum cunei-forme*, pour faire des trous dans les arbres; tels ſont les *Piçs-verts*; d'autres ſautent ſur les branches, & font la chaſſe aux *Inſectes*, ou ſe nourriſſent de fruits.

La Famille quatriéme comprend les Oiſeaux *Tetradactyles* qui ont quatre doigts ſimples, trois devant, & un derriere. C'eſt la Famille la plus nombreuſe.

Parmi les *Tetradactyles*, les uns ont les trois doigts de devant qui ſe tiennent par une membrane, & ils ſont nommés *Palmipedes*. C'eſt la cinquiéme Famille.

La ſixiéme eſt compoſée d'autres Oiſeaux *Palmipedes* dont les quatre doigts ſe tiennent tous par une membrane.

La ſeptiéme comprend d'autres Oiſeaux *Palmipedes* qui n'ont que trois doigts aux pieds, & point derriere.

Enfin entre les Oiſeaux *Tetradactyles*, on en voit qui ont des lobes aux doigts, ou qui ſont frangés des deux côtés, & celui de derriere le plus ſouvent eſt ſimple. C'eſt la huitiéme Famille.

En ne rangeant les Oiſeaux que ſuivant la figure de leurs pieds, M. Klein en a fait huit Familles.

Le moins qu'un Oiſeau puiſſe avoir de doigts,

c'eſt deux ; & il n'y en a point qui en ayent plus de quatre. M. KLEIN, dans une Table générale des Animaux, à la ſuite de ſes *Echinodermata*, dit qu'il y a des Oiſeaux *Pentadactyles* & *Hexadactyles*. Je n'en connois pas.

## FAMILLE PREMIERE.

### OISEAUX QUI ONT DEUX DOIGTS AUX PIEDS.

*Didactyli nullo poſtico*, ſelon M. KLEIN.

Mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Gallinæ*.

L'AUTRUCHE, *Struthio-camelus*. Des Auteurs, comme Willughby, Aldrovande, Geſner, Rai, Albin, *Tom. III. n.* 31. en donnent la deſcription & la figure. Les Anglois nomment cet Oiſeau *Oſtriche* ; les Portugais *Ema*. Horace le nomme *Afra*, c'eſt-à-dire Oiſeau d'Afrique. Seba en parle I. *p.* 83. & en donne la figure *Tabl.* 51. Cet Oiſeau eſt nommé *Struthio-camelus* en Latin, à cauſe de ſa grandeur, & parce qu'il a les pieds comme ceux du *Chameau*, c'eſt-à-dire les doigts garnis d'ongles. Ses plumes ſont très-belles. Il a la tête faite à peu près comme celle de l'*Oie*. Ses ailes ſont petites à proportion de ſon corps. Il eſt commun en Afrique.

## FAMILLE II.

### OISEAUX QUI ONT TROIS DOIGTS AUX PIEDS.

*Tridactyli*, *nullo poſtico*, dit M. KLEIN.

### GENRE PREMIER.

Mis dans l'Ordre des *Aves Gallinæ* par M. LINNÆUS *Syſt. Nat. édit. 6. n.* 62.

L'AUTRUCHE de l'Amérique, qui n'a point de queue, ou preſque point, *Struthio Nothus Americanus caudâ ferè nullâ*. C'eſt le *Nhandaguacu* de Marcgrave & de Piſon, très-commun *à Rio Grande*. Cet Oiſeau a le

corps ovale, & n'a point de plumes flottantes à la queue; il eſt moins grand que l'*Autruche* d'Afrique.

Kolbe donne la figure d'une *Autruche* du Cap de de Bonne Eſperance avec trois doigts aux pieds.

## GENRE II.

Mis dans l'Ordre des *Aves Gallinæ* par M. LINNÆUS *n. 63. édit. 6.*

CASOAR, ou EMEU. *Caſoar*, *Caſoarius*, *Caſoaris*, *Emeu*, *Eme*, ſelon Bontius, Vormius, Cluſius, Aldrovande, Rai, Willughby; en Anglois *The Caſſavary*; en Allemand *Caſſuar*. Albin *Tom. 2. n. 60.* en donne la deſcription & la figure.

## GENRE III.

Oiſeaux mis dans l'Ordre des *Aves Gallinæ* par M. LINNÆUS *n. 64. édit. 6.*

Ils different du Genre des *Poules*, dit M. KLEIN, par le bec, les pieds & les doigts. D'autres Auteurs, les mettent auſſi dans l'Ordre des *Aves Gallinæ*.

OUTARDE. *Tarda Simpliciter*, *Trappus*, *Anſer Trappa*, Selon Schwenkfeld, *Otis* ſelon Aldrovande, *Erytrontaon* ſelon Olaus Magnus, *Tetraon* par Longolius, en Anglois *The Buſtatd* par Albin, qui en donne la figure & la deſcription, *Tom. 3. n. 38. 39.* Edouard II. *p. 73. & 74.* en donne auſſi la deſcription, & la nomme en Anglois, *The Cock And Hen.* C'eſt un très-bel Oiſeau. Voyez les Memoires de l'Academie Royale des Sciences, *Tom. III. part. II. pag.* 101. en Allemand *Acter*, *Trappe*, *Trappe-Gans*.

II. CANE PETIERE de Belon. *Tarda Nana.* C'eſt l'*Otis* ou *Tarda Aquatiqua* de Geſner; la *Stella Avis* d'Aldrovande *l. 13. c. 13.* l'*Anater Campeſtris* ou *Tetrax* de Belon, qui en donne la figure. En Allemand *Triel*, *Griel Kleine Trappe*.

III. OUTARDE d'Arabie, *Tarda Mechaenſis Arabica*; en Anglois par Edouard *The Arabian Buſtard. I. p.* 12. en Allemand *Der Araber*. Cet Oiſeau eſt de la grandeur du *Coq d'Inde*, & il a les jambes & le col plus longs que notre *Outarde*.

IV. OUTARDE du Bréſil, nommée MUCUCAGUA. *Tarda Mucuguaca*, *Trappa*, *Gallina Silveſtris*. Willughby, Rai. Cet Oiſeau a trois doigts de devant gros; & les ongles courts & obtus, un eperon rond, comme dans les *Autruches*.

## GENRE IV.

Oiſeaux auſquels M. KLEIN donne le nom de *Gavia*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Scolopaces*.

Ces Oiſeaux ont une grande reſſemblance entr'eux. La différence provient de ce que les uns ont trois doigts en devant, & les autres un faux doigt ou éperon par derriere; comme le *Mucucagua* du Bréſil. Tel eſt le *Pardalis viridis*, Pluvier verd, qui n'a aucune marque de doigt de derriere, & le Pluvier brun, *Pardalis fuſcus*, qui a comme une eſpece d'ongle, a peine long d'une ligne; le *Vanneau vulgaire*, qui en a un environ long de deux lignes. Ces excroiſſances ou appendices ne ſont pas de faux doigts, placés loin de la plante du pied, qui ne peuvent nullement ſervir à marcher à ces Oiſeaux, à moins que ce ne ſoit dans les marais, & ce prétendu doigt de derriere, différe de ceux des Oiſeaux *Tetradactyles*, qui leur ſervent non-ſeulement pour ſe percher ſur les branches d'arbres, mais encore pour prendre leur proie. Les différens ſentimens des Auteurs, tant ſur la deſcription de ces Oiſeaux, que ſur leur figure, n'empêchent point M. M. KLEIN d'en faire un genre particulier, & de les mettre dans la Famille des Oiſeaux à trois doigts. Ce ſont des Oiſeaux ſtupides, faciles à aprivoiſer, & tous Macroptéres, excepté le huitiéme.

1. VANNEAU vulgaire, *Gavia vulgaris*, *Vanellus*, *Capella* par Gaza, Ταωσθαδριος, *Pavo Sylveſtris*, *Kyvitta* à cauſe de ſa voix; Aldrovande & Willughby en parlent ſous le nom de *Capella*, ou *Vanellus*. Celui, dont Al-

bin, *Tom. I. n.* 74. donne la figure, ſous le nom de de *Vanneau*, en Anglois *The Laywing Plower*, eſt une varieté du *Vanneau* ordinaire.

2. PLUVIER verd; *Gavia viridis*, *Pardalis ſeu Pluvialis viridis*, en Anglois *The Green Plower* par Willughby, Albin en donne la deſcription & la figure, *Tom. I. n.* 75. Marſilly. pag. 54. C'eſt le *Pardalus tertius* de Schwenkfeld, le *Vivago* de Bodin: Le Παρδαλος d'Ariſtote. Le Comte de Marſilly, *tom. V. p.* 54. *tab.* 25. donne un éperon ou un doigt de derriere à cet Oiſeau: cependant tous les Naturaliſtes conviennent qu'il n'en a pas.

3. PLUVIER cendré, *Gavia ſeu Pluvialis cinerea*; *Pardalus II.* de Schwenkfeld; *Squatarola* des Venitiens; *The Gray Plower* en Anglois, ſelon Albin, qui en donne la deſcription & la figure, *Tom. I. n.* 76. & le Comte Marſilly *Tab.* 26. Willughby & Rai.

4. COURLIEU de Rocher, qu'Albin *Tom. I. n.* 69. nomme *Outarde*, *Oſtarde* & *Bitarde*; en Latin *Gavia roſtro vireſcente*, *conico*, *acuto*. C'eſt le *Pardalis*, ou *Œdinecmus* de Belon; le *Caradrius* de Geſner & d'Aldovrande, qu'Albin & Rai nomment en Anglois *The ſtone Curlew*.

5. DOTTEREL des Anglois. C'eſt le *Gavia morinellus ſimpliciter* de Geſner & de Willughby *p.* 230. le *Monellus* de Cajus *rarior. p.* 96. Albin, *Tom. 2. n.* 61. & 62. en donne la figure. *Dotterel* ſignifie Oiſeau ſtupide, ce qui eſt la même choſe que le Grec Μορυτος, d'où vient le mot Latin *Morinellus*, & le *Morellen* des Allemands.

6. ALOUETTE de mer, *Gavia littoralis*, *Morinellus littoris*, *Hiaticula*: en Anglois *The Sea-lark*, ſelon Willughby & Rai. Albin *tom. I. n.* 80. en donne la deſcription & la figure. Belon donne le nom de *Hiaticula* au *Caradrios*, Oiſeau de roche, ou *Courlieu* de rocher.

7. Autre DOTTEREL des Anglois, *Gavia morinella altera*, *Morinellus cinereus*. Albin en donne la deſcription & la figure *Tom. 2. n.* 63.

8. PLUVIER criard; *Gavia brachyptera*, *vocifera*. *Va-*

*nellus vociferus* : en Anglois *The Chattering Plovver*, Cateſby, p. 21. Cet Oiſeau à la figure du *Vanneau.*

9. ALOUETTE de mer de Cateſby *p.* 72, qui peut bien être la même que celle du *n.* 6. en Latin *Gavia, quæ Pluvialis Arenaria* de Rai : *Morinellus marinus*, & peutêtre le *Cinclus* de Turnerus. Quoique Cateſby donne à cet Oiſeau, d'après Willughby, un doigt de derriete, M. KLEIN doute qu'il en ait un, & croit que c'eſt une faute du Graveur, ou du moins ce n'eſt qu'un faux doigt, comme dans pluſieurs Oiſeaux : *Digitus ſpurius poſticus.*

10. VANNEAU des Indes, ou PLUVIER des Indes, ſelon Edouard *I. p.* 47. *Gavia ſeu vanellus Indicus* ; en Anglois *The black Breaſted Indian Plovver.* Cet Oiſeau différe de notre *Vanneau* par ſes jambes & ſes pieds, qui ſont plus longs. Son bec depuis le milieu va toujours en diminuant, & il n'a aucune marque de doigt de derriere.

## GENRE V.

### Oiſeaux mis dans l'Ordre des *Aves Scolopaces* par M. LINNÆUS.

PIE de *mer*, c'eſt l'*Himantopus* de Pline, de Sibbald, & de Marſilly, la *Pica marina* de Belon, nommée *Mathoen* par les Hollandois. Sibbald *Tabl. XI.* & *XIII.* en donne des figures, & le Comte de Marſilly.

## GENRE VI.

### Dans l'Ordre des *Aves Scolopaces* par M. LINNÆUS.

Preneur d'Huitres de Cateſby *p.* 85. qui eſt la *Pie de* mer de Belon. *Oſtralega*, *Hæmantopus* par Willughby, *Pica marina*, par Belon ; Cajus *Rarior. p.* 92. en Anglois *The Sea Pie* par Willughby *p.* 220. Cet Oiſeau à les pieds rouges, ſans doigts de derriere. La *Pie* ou *Becaſſe de mer* de Belon *l. IV. de la Nat. des Oiſ. p.* 203. eſt une varieté de la *Pie de mer* de Cateſby. M. LINNÆUS *Faun. Suec. p.* 161. marque que l'*Hæmantopus*, n'eſt pas l'*Himantopus* de Geſner ; & quoiqu'ils ayent

un nom à peu près ſemblable, il ajoute qu'il y a beaucoup de différence. M. KLEIN. dit n'avoir point vû d'*Himantopus*.

---

# FAMILLE III.

Oiſeaux TETRADACTYLES, deux doigts devant & autant derriere.

*Tetradactylis, digitis duobus anticis, totidem poſticis.*

## GENRE PREMIER.

Ces Oiſeaux ſont mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Accipitres. edit 6. n. 37.*

PERROQUET, *Pſittacus*; en Grec Ψιττακος, Παπαγας, Ανθρωπογλωσσος; *Papegen* en Allemand. Ces Oiſeaux ſont tres-comms aux Indes. Ils ont le bec gros, crochu; la machoire inférieure beaucoup plus courte que la ſuperieure; les pieds & les doigts charnus. Ils ſe ſervent de leur bec & de leurs pieds pour monter ſur les arbres. Le genre de *Perroquet* comprend bien des eſpeces, différentes par la grandeur. Voici la notice de ceux, dont parle M. KLEIN.

1. MACAOW, ou Macao, *Perroquet* de la premiere grandeur, de couleur rouge, & les aîles & la queue bleus, *Figur.* Willughby, & Albin *Tom. I. n.* 2. qui le nomme grand *Perroquet de Macao.*

2. MACAOW bleu jaune, *Cæruleo luteus. Figur.* Albin *Tom. III. n.* 10. Femelle du *Perroquet de Macao.*

3. PERROQUET à tête bleue, *Pſittacus diverſicolor*, l'*Aracaranga* de Marcgrave, & l'*Erythrocyaneus* de Geſner & Willughby.

4. PERROQUET à tête verte, & queue bleue celeſte, *vertice viridi caudâ cyaneâ.* C'eſt l'*Ararauna* de Marcgrave.

5. KAKATOEHA, ou KAKATOON, à plumes couleur de ſafran ſur la tête, *Alba plumis croceis in capite.* Le même, ſelon M. KLEIN, que l'Oiſeau nommé Ka-

*Katacha* aux Iſles Moluques, qui à une hupe blanche & couleur de ſoufre, *Avis* KAKATACHA, *Orientalis, ex inſulis Moluccis, criſtata, candidiſſima, & ſulphurea*, dont parlent Seba I. 94. *t.* 59. Friſch *t.* 50. Albin *Tom.* 3. *n.* 12. Cependant celui d'Albin, qu'il nomme CAKATOW, ou *Perroquet* à crête blanche; *The Cockatoo*, à l'endroit cité, nous paroît être le même que le ſuivant.

6. RATOÉHA, Perroquet tout blanc & hupé. *Pſittacus albus criſtatus.* Aldrovande. M. KLEIN en a vû un à Dantzic.

7. PERROQUET roux à tête noire, aux ailes vertes, & les cuiſſes bleues. *Rufus, vertice nigro, alis vividibus, femoribus cæruleis.* Il eſt de moyenne grandeur. Friſch.

8. PERROQUET roux aux ailes & cuiſſes vertes. *Rufus, Femoribus aliſque viridibus.* Friſch.

9. PERROQUET verd, au front blanc & col rouge. *Viridis, fronte albo, collo rubro.* Friſch.

10. PERROQUET verd, à tête de ſafran, & front bleu céleſte, ou azur. *Viridis, capite croceo, fronte cyaneâ.* Friſch.

11. PERROQUET verd, dont la tête, les épaules & les cuiſſes ſont jaunes. *Viridis, capite, humeris, & femoribus luteis.* Friſch.

12. Grand PERROQUET verd, à taches rouges & jaunes, & le front bleu. *Viridis major, maculis rubris, luteiſque, fronte cæruleâ.* Friſch.

13. PERROQUET cendré à queue rouge. *Cinereus, caudâ rubrâ.* Friſch. Celui dont Albin *Tom.* 1. *p.* 12. donne la figure, a les joues blanches, *Genis utroque latere capitis albis*, & il le nomme *Perroquet couleur de Frêne.*

14. PERROQUET à tête jaune, à front rouge, à queue longue. *Capite luteo, fronte rubrâ, caudâ longâ.* Friſch.

15. PERROQUET couleur de ſafran, les yeux dans un cercle rouge. les dernieres plumes des ailes, & la derniere de ſa queue bleues. *Croceus, caudâ longâ, oculis in circulo rubro, extremis remigibus & penna infima caudæ cæruleis.* Friſch.

Le petit PERROQUET d'Angola, dont Albin *Tom. III. n.* 13. donne la figure, eſt, dit M. KLEIN, le mâle, ou la femelle du *n.* XIV.

16. PERROQUET à tête noire, & collier verd. *Capite nigro, collari viridi.* Seba I. *63. t.* 38. *n.* 4.

17. PERROQUET à tête bleu-céleſte, ou azur, & collier jaune. *Capite cyaneo, collari luteo. figur.* Albin *Tom. I. n.* 13. C'eſt un *Perroquet* du Breſil, que les Anglois nomment *Laurey.*

18. PERROQUET de Paradis de Cuba, jaune, & le col & le ventre rouge. *Pſittacus paradiſi ex Cubâ, luteus, collo, ventreque rubris.* Cateſby *p.* 10.

19. PERROQUET de la Caroline, verd, tête & col couleur de ſafran. *Carolinenſis, viridis, capite, colloque croceis.* C'eſt un *Perroquet* de moyenne grandeur. Cateſby p. 11.

20. PERROQUET verd à queue longue, à taches jaunes en forme d'orange. *Viridis, caudâ longâ, malis croceis.* Friſch.

21. Petit PERROQUET verd, à front & bas du goſier rouge. *Viridis minimus, fronte & gulâ rubris.* Friſch.

Le *Perroquet* verd des Indes Orientales d'Albin, *Tom. 3. n.* 15.

Celui d'Édouard I. *n.* 6. qui a la tête, le bec, le croupion rouges, les pieds de couleur colombine, & le reſte verd, ſont de très-petits *Perroquets.* Il y en a encore pluſieurs autres.

22. PERROQUET à collier rouge, & à plumes couleur de pourpre ſur la tête, nommé Oiſeau de Cocho. C'eſt une eſpece de *Perroquet* du Mexique, de différentes couleurs. *Collo rubro, plumis in capite purpureis; Avis de Cocho dictus; Pſittaci ſpecies Mexicana, vario colore.* Seba I. *34. t.* 59. *n.* 2.

23. PERROQUET de Madagaſcar, noir & bleu, à bec très-court; *ex nigro cœruleus; Pſittacus roſtro breviſſimo*, Édouard I. *n.* 5. en Anglois *Blak parrot from Madagaſcar.*

24. PERROQUET des Barbades, verd & jaune, à tête cendrée; *viridis & lutens, capite cinereo, Barba-*

*denſis* ; en Anglois *The Green and yellow Parrot from Barbados. Figur.* Albin *Tom.* III. *n.* 11.

25. PERROQUET de Bengale (petit), noir ſous le menton, la tête rouge, le derriere de la tête couleur de pourpre, la machoire inférieure noire, la ſupérieure couleur de ſafran, & les pieds bleus ; *ſub mento niger, capite rubro, cervice purpureâ, inferiore mandibulâ nigrâ, ſuperiore croceâ, pedibus cœrulæis* ; en Anglois *Perroquet from Bengal. Figur.* Albin *n.* 14. *Tom.* III.

26. MACCAW, *Perroquet* de la Jammaique ; en Anglois *The Maccaow from Jamaïca. Figur.* Albin *Tom.* II. *n.* 17.

27. PERROQUET des Indes Orientales ; en Anglois *The Bracelet Perroqueet from eaſt Indiæ. Figur.* Albin *Tom.* II. *n.* 18.

On peut ſur les *Perroquets*, dont les eſpeces & les varietés ſont infinies, conſulter Willughby, Aldrovande, Jonſton, Geſner, Belon, les Voyageurs, &c.

## GENRE II.

### Oiſeaux mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Picæ. n.* 41. *édit.* 6.

1. PIC NOIR, *Picus niger, maximus*, nommé *Pyrrhocorax* par Geſner & Aldrovande ; *Picus cornicinus cornix ſilvatica* par Agricola, & *Schwenkfeld.* Le mâle, dit M. LINNÆUS, ſuivant ſon âge, a le derriere de la tête plus ou moins rouge. La femelle eſt toute noire. Albin qui en donne la figure *Tom.* II. *n.* 27. le nomme *Merle-Pie.*

2. PIC de la premiere grandeur à bec blanc de Cateſby *p.* 16. *Picus niger roſtro albo, priori major, Picus maximus roſtro albo* ; en Anglois *The largeſt White beak Woodpecker.*

3. Grand PIVERD à tête rouge. *Picus niger, toto capite rubro, roſtro plumbeo*, dont le plumage eſt noir, & le bec couleur de plomb. Cateſby p. 17.

4. Petit PIC NOIR *Picus niger minimus* ; en Anglois

*The leſſer black Woodpecker*, qu'Albin nomme *petit Grimpereau noir. figur. Tom.* III. *n.* 23.

5. Pic verd, *Picus viridis.* Friſch en donne une fort bonne figure. C'eſt ſelon Aldrovande le *Picus martius* des Latins, qu'ils conſacroient au Dieu Mars. Turnerus le nomme *Picus medius graminis.* Geſner Κολιος en Grec. Selon M. LINNÆUS, le mâle a le haut de la tête couleur de ſafran. Albin *Tom.* I. *n.* 18. en donne la deſcription & la figure. Schwenkfeld & Willughby parlent de cet Oiſeau.

6. Grand PIVERD bigarré, ou *Grand Grimpereau.* Selon Albin *figur. Tom.* I. *n.* 19. *Picus varius major* d'Aldrovande; *Picus riparius marinus* de Schwenkfeld; *Picus albo, nigroque variegatus, vertice nigro, rectricibus tribus lateralibus utrinque albeſcentibus, maris occiput coccineum*, ſelon M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 81.

7. Pic grivelé de Cateſby, nommé par Albin *Tom.* I. *n.* 20. petit *Grimpereau*, ou *Piverd* bigarré. *Picus diſcolor minor*; *Picus varius minor*; *Picus guttatus, vel albis & nigris punctis notatus.* M. KLEIN dit que la figure qu'en donne Albin n'eſt pas bien exacte, ou ce n'eſt qu'une varieté du précédent. Il a le bec bleu. Le mâle a le haut de la tête rouge, & la femelle l'a blanche.

8. Petit PIVERD tacheté de Cateſby *p.* 21. *Picus varius minimus*, ſemblable au ſuivant pour la figure, non pour la grandeur; en Anglois *The ſmalleſt ſpoted Woodpecker.*

9. PIVERD velu de Cateſby *p.* 19. *Picus villoſus, medius*; en Anglois *The Haire Woodpecker.*

10. PIVERD au ventre jaune de Cateſby *p.* 21. *Picus varius minor, ventre luteo*; en Anglois *The yellow belly'd Woodpecker.*

11. PIVERD à ventre rouge de Cateſby *p.* 19. *Picus ventre rubro*; en Anglois *The red belly'd Woodpecker.*

12. PIVERD à tête rouge de Cateſby *p.* 20. *Picus capite, colloque rubris*; en Anglois *Readheaded Woodpecker*, Oiſeau très-connu à la Virginie & à la Caroline.

13. PIVERD de Bengale, *Picus varius Bengalenſis*; en Anglois *The Bengal Woodpecker.* Albin *Tom.* III. *n.* 22.

en

en donne la description & la figure. Il le nomme *Grimpereau* de Bengale.

14. PIC à collier, ou TORCOL, selon Albin, qui en donne la description & la figure *Tom. I. n.* 21. En Latin *Picus Torquilla*, *Iynx*. En Anglois *The Wryneck*, selon Willughby. M. LINNÆUS, qui le nomme *Cuculus subgriseâ maculâ*, *rectricibus nigris*, *fasciis undulatis*, en donne la figure *Faun. Suec. Tab.* 1. *n.* 78. Hermolaüs le nomme *Turbo*. M. KLEIN dit que quand on le prend, ou qu'on le tient dans la main, il tourne le col comme pour se défendre, & qu'il présente les plumes de sa queue.

15. PIC du Brésil, *Picus Brasilienſis*, qui est le *Jacamaciri* de Marcgrave, de couleur verte, mêlée d'une couleur feu & dorée. Willughby.

16. CURUCUI de Marcgrave, Oiseau du Genre des *Pics*, presque de la grandeur de la *Pie*, & qui a des yeux bleus placés dans un cercle doré, la poitrine & le bas du ventre de couleur de vermillon, & le dos & le dessus de la queue verts, bleus, & couleur de feu. Willughby.

17. PIC verd, *Picus viridis*, jaune au-dessus du croupion, marqué d'une ligne courbe noire depuis la racine du bec jusqu'à la mâchoire inférieure, aux côtés de la tête. Les grandes plumes des ailes sont noires & brunes, marquées de points blancs en travers, & les plumes qui couvrent sont noires. Édouard II. 65. C'est un Oiseau qu'on voit en Norvege, dit M. KLEIN.

## GENRE III.

Oiseaux mis dans l'Ordre des *Aves Picæ* par M. LINNÆUS *Syst. Nat. n.* 43. *édit.* 6.

*Différentes especes de* COUCOU, Cuculi, *ainsi nommés du son de leur voix, du Grec* Κοκκυξ, *du Verbe* Κοκκυζειν, *cucurire.*

Frisch met les *Coucous* dans le rang des *Pics*, parce que, comme eux, ils se nourrissent de vers, & qu'ils

les cherchent entre l'écorce des arbres, & qu'ils ont deux doigts devant & deux derriere, ce qui eſt auſſi commun aux *Perroquets*. Mais les *Coucous* different par le bec des *Pics* & des *Perroquets*. C'eſt ce qui fait que M. KLEIN en fait un Genre particulier.

1. Le COUCOU vulgaire ; *Cuculus vulgaris*, de Schwenkfeld, d'Olina, & de tous les Auteurs. Friſch en donne trois figures. Albin une *Tom.* 1. n. 8.

2. Coucou de la Caroline, *Cuculus Carolinienſis*. Cateſby *p.* 9. En Anglois *The Cuckow of Carolina*. Il a le ventre blanc, le reſte du corps cendré, la queue étroite & longue.

3. Grand PIVERD aux ailes d'or, de Cateſby *p.* 18. *Cuculus alis deauratis* ; en Anglois *The Goldwenged Woodpecker*.

4. Coucou du Breſil, *Cuculus Braſilienſis* ; qui eſt l'*Aracari* de Marcgrave, le *Xochitenacatl* de Nieremberg. Willughby *p.* 96.

5. Le Coucou d'Andalouſie ; *Cuculus Andalouſiæ*, à longue queue & noire ; en Anglois *The Great Spotted Cuckow*. Édouard II. 57.

6. Coucou de Bengale, *Cuculus Bengalenſis* ; nommé *Cuckeel*, bleu & noir, le bec fauve, les pieds courts ; d'un jaune ſale ; en Anglois *The black Indian Cuckow*. Édouard II. *p.* 58.

7. Autre Coucou de Bengale, brun, roux ; cendré depuis la tête juſqu'à la queue ; en Anglois *The brown and ſpotted Indian Cuckow*. Édouard II. 59.

8. Grand Coucou de la Jamaïque, *Cuculus Jamaïcenſis major* ; en Anglois *The Rainbird*, ſelon Sloane, qui en donne la figure *Tab.* 258. *f.* 1. *ibid. f.* 2.

## GENRE IV.

Oiſeaux mis dans l'Ordre des *Aves Picæ* par M. LINNÆUS *n.* 46. *édit.* 6.

### *DIFFÉRENTES ESPECES D'ALCYONS.*

L'Hiſtoire des Oiſeaux connus ſous les noms *Ipſida*

& *Alcyones*, eſt remplie de beaucoup de difficultés. Les Anciens ont héſité à quel Oiſeau ils donneroient le nom d'*Alcyon*. Ils ont dit que les *Alcyons* faiſoient leurs nids ſur la Mer quand elle étoit tranquille. Tout ce qu'en rapporte Ariſtote *l.* IX. *c.* 14. eſt ſans probabilité. C'eſt une choſe très-rare que de voir un *Alcyon*, & Willughby s'en plaint. L'*Ipſida* eſt-il l'*Alcyon* des Anciens ? L'*Ipſida* ne va jamais ſur la Mer, & rarement proche des Etangs ; mais il fréquente les bords des rivages élevés, & va faire ſon nid dans des trous creuſés horizontalement ſur le bord des Fleuves. Ainſi l'*Ipſida* n'eſt pas l'Αλκυων des Anciens, dont on peut voir l'Hiſtoire remplie de Fables dans Belon *p.* 218. On nomme l'*Ipſida*, Oiſeau de glace ; *Avis glacialis* ; en Allemand *Eiſbogel*. Au milieu de l'Hiver on le voit ſur le bord des Rivieres ſortir de ſon trou pour aller faire la chaſſe aux Poiſſons, dont il ſe nourrit. S'il y a quelque différence entre *Alcedo* & *Alcio*, l'*Ipſida*, dit M. KLEIN, n'eſt ni l'*Alcedo*, ni l'*Alcio*. Les *Alcedines*, dit-on, ſe nourriſſent d'*Abeilles*, & l'*Ipſida* de Poiſſon ; & ſon nid eſt conſtruit d'arrêtes de Poiſſons, dit Belon, *Singul. des Obſerv. p.* 142. Mais ſi l'on dit qu'*Alcedo* & *Alcio* ſont ſynonymes, notre Naturaliſte ne peut pas comprendre comment les Alcyons, *Alcyones*, peuvent faire leur nid ſur la Mer, où il n'y a ni *Abeilles*, ni *Ruches*. Quelquefois les Anciens ont confondu Αλκυων & Ανθων. Il n'eſt pas poſſible de concilier nos *Ipſida* avec les *Ipſida* étrangers. Les nôtres ont deux doigts devant & deux derriere ; & on donne aux étrangers, nommés *Aves glaciales*, & connus indifféremment ſous les noms *Alcedines*, *Alcyones*, & *Ipſida*, trois doigts devant & un derriere. Cateſby & Seba donnent trois doigts aux Oiſeaux qui ſont les vrais *Ipſida*. Charleton diſtingue l'*Ipſida* & l'*Alcyon*. Il appelle celui ci *Pêcheur royal*, & *Alcyon de Riviere*. Sur l'*Alcyon* des Anciens on peut conſulter Jonſton, qui en a ſavamment écrit. Il dit qu'il y a deux eſpeces d'*Alcyons* ; l'une qui vient des Indes, & qui eſt l'*Alcyon muet* ; l'autre qui eſt vocal, & qui eſt

l'*Alcyon* de Belon, qui n'eſt autre que le *Paſſer arundinarius* de Schwenkfeld, le *Junco* d'Aldrovande, & le *Cinclus* de Turnerus, nommé en François *Martinet Pêcheur*. Albin en donne une fort belle figure; mais il l'a privé d'un de ſes doigts de derriere. Édouard a fait la meme choſe pour les *Alcyons* de Bengale, qui ſont ſemblables aux nôtres, dit M. KLEIN. Le *Martinet Pêcheur* eſt un Oiſeau très-commun, ajoute-t'il, & il n'y a preſque que Schwenkfeld qui l'ait bien décrit, en lui donnant deux doigts devant, & deux derriere, ceux de devant à une égale diſtance, & ceux de derriere un peu éloignés l'un de l'autre. Voici la notice des *Ipſida*.

1. ALCYON muet, *Ipſida, Alcedo fluviatilis, Halcyon riparia, Piſcator regalis*. Selon Charleleton, *Alcedo muta, Ipſida plombina, Martinus Piſcator, Regius Piſcator, Alcedo major, Martinet Pêcheur* de Belon. Olina *fol.* 39. nommé *Konigsfiſcher* en Allemand, *Kingfisher* en Anglois. *Figur.* Albin *Tom. I.*

2. ALCYON de Bengale à queue courte, *Ipſida Bengalenſis, caudâ admodum brevi;* en Anglois *The littles Indian Kingfishers*. Édouard I. II. En Allemand *Der kleinſte Konigs-fiſcher.*

3. ALCYON hupé des Indes Orientales, *Ipſida criſtata; Alcedo criſtata Orientalis*; très-bien dépeint, dont la queue eſt très-courte. Seba 1. *p.* 104. *Tab.* 97. *n.* 4. C'eſt, dit Seba, l'*Alcyon* des Anciens.

4. ALCYON de l'Amérique, nommé *Apiaſtra. Ipſida roſtro albo. Alcedo Americana, ſeu Apiaſtra.* Seba I. *p.* 87. *t.* 53. *n.* 3.

5. ALCYON hupé d'Amboïne, nommé *Toborkey. Ipſida roſtro luteo. Alcedo Amboïnenſis criſtata.*

6. ALCYON de Cateſby à queue courte, dont la tête eſt groſſe, chargée de plumes; *Ipſida capite amplo plumoſo, caudâ curtâ*; en Anglois *The King-fisher.* Cateſby *p.* 69.

7. ALCYON de la Riviere de Gambia à queue longue. *Ipſida caudâ longâ*, ſelon Édouard *I. p.* 8. qui le nomme en Anglois, *The great King-fisher from the Rivier Gambia.*

8. ALCYON blanc & noir d'Édouard I. *p.* 9. *Ipsida ex albo & nigro varia*; en Anglois *The blak and white King-fisher*. Cet Oiseau se trouve en Perse.

9. ALCYON de Surinam, à queue très-longue & fourchue. *Ipsida Surinamensis caudâ longissimâ, duabus pennis excurrentibus furcatâ*; en Anglois *The Swallow tail'd King-fisher*. Édouard *p.* 10.

## GENRE V.

ROI DE GUINÉE, *Tauraco*, *Regia avis*. Édouard I. *p.* 7. *Rex Guineensis*. Albin *Tom.* 2. *n.* 19, le nomme Oiseau couronné du Mexique. Albin ne l'a ni bien dépeint, ni bien décrit, ni bien marqué le païs d'où il est. Ce n'est point, dit M. KLEIN, un Oiseau du Mexique, mais de Guinée, de l'Afrique Méridionale, vers le Royaume de Congo, sur les confins du Cap de Bonne Espérance.

## GENRE VI.

Oiseaux mis dans l'Ordre des *Aves Pica* par M. LINNÆUS *n.* 38. *édit.* 6.

1. PIE du Bresil, *Nasutus simpliciter*. *Xochitenacalt* de Nieremberg. *Tucana* ou *Toucan* peut être l'*Aracari* de Marcgrave. L'Oiseau mangeur de poivre, *Avis piperivora* d'Aldrovande & de Willughby. *Pie* du Bresil, *Pica Brasilienſis*; en Anglois *The Brasilian*. *Pie* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 25. Édouard II. *p.* 64. Cet Oiseau est nommé *Rhamphastos*, *Hipporynchos*, & *Burynchos*, par d'autres Auteurs. M. KLEIN dit avoir eu dans son Cabinet six ou huit becs de la *Pie du Bresil*, qui différoient tous par quelques variétés.

2. TOPAU de Vormius & d'Aldrovande. *Nasutus*, *Rhinoceros*. Willughby *t.* XVII.

* Il y a un Oiseau de la Côte Occidentale d'Afrique, nommé *Monoceros*, ou *Trompette de Brac*; mais il a trois doigts devant, & un derriere: ainsi il

ne peut être ni de ce Genre, ni de cette troiſiéme Famille, compoſée d'Oiſeaux qui ont tous deux doigts devant & deux derriere.

---

# FAMILLE IV.

Oiſeaux TETRADACTYLES, garnis de ſimples doigts aux pieds, dont trois devant & un derriere.

*Tetradactyli, digitis ſimplicibus, unico poſtico.*

CETTE quatriéme Famille des Oiſeaux, dit M. KLEIN, eſt très-nombreuſe & diviſée en vingt Genres différens. Ces Genres ſe ſubdiviſent la plûpart en Eſpeces ou Tribus. En continuant de ſuivre l'Ordre de ce Naturaliſte, nous continuerons auſſi à la diviſion des Genres & des Eſpeces, d'indiquer l'Ordre où M. LINNÆUS les place.

## GENRE PREMIER.

### OISEAUX DE PROIE. *ACCIPITRES.*

*Dont les uns vivent d'Animaux vivans ſur la terre, les autres font la chaſſe aux Poiſſons, les autres aux Oiſeaux, & les autres ſe nourriſſent de Cadavres.*

### TRIBU PREMIERE.

### AIGLES, *AQUILÆ.*

Oiſeaux mis dans l'Ordre des *Aves Accipitres* par M. LINNÆUS *Syſt. Nat. n. 36. édit. 6.*

1. AIGLE Chryſaëtos, AIGLE Royale; *Aquila fulva, ſeu aurea; Aquila regalis.* Par M. LINNÆUS *Falco cerâ luteâ, pedibus lanatis, corpore rufo;* en Anglois, ſelon Rai & Willughby, *The Golden Eagle;* en Polonois

*Orzel przedni.* La figure qu'en donne Albin *Tom.* 2. *n.* 1. n'eſt pas bien exacte, dit M. KLEIN. Le *Chryſaëtos* eſt la plus grande eſpece d'*Aigle*; *maxima.*

2. AIGLE Pygargos à queue blanche. *Albicilla*; *Hinnularia*; en Anglois *The Tawn-killing-Eagle and Erne.* Par M. LINNÆUS *Falco cerâ flavâ, rectricibus albis, verſuſque apices nigris.*

Cateſby *p.* 1. parle d'une *Aigle* à tête blanche de la Virginie & de la Caroline. C'eſt une varieté du précédent.

3. AIGLE Chryſaëtos des Anglois, qui a un cercle blanc à la queue, *Aquila ſimpliciter Chryſaëtos Anglorum, caudâ annulo albo cinctâ*; en Anglois *Eagle.* Il a la queue courte, & eſt de la grandeur d'un *Coq d'Inde.* Rai. Willughby.

4. AIGLE noir, *Aquila valeria*, ou *Melanaetos*; en Grec Μελαγωφονος; en Anglois *The Black Eagle.* Albin en donne la figure *Tom.* 2. *n.* 2. Celui de la Baye de Hudſon eſt une varieté. Il y en a un autre de l'Amérique Septentrionale, dont parle Édouard *p.* 1.

5. AIGLE-ORFRAIE d'Aldrovande, qui eſt le *Haliætos* de Cluſius, le *Balbuſardus* des Anglois, qu'ils nomment *The Sea-Eagle* ou *Oſprey*; en Polonois *Orzel tomignat, Orzel morſki.* Cet Oiſeau ſe jette ſur les Oiſeaux & ſur les Poiſſons.

6. AIGLE A CANARD; *Aquila clanga*; *Aquila anataria*, ſemblable au *Morphnos*; en Anglois, ſelon Rai, *The Kough-fœted Eagle.* Ce n'eſt pas, comme le croit Rai, le *Haliætos* ou *Balbuſard* des Anglois. A peine cet Oiſeau eſt-il de la grandeur d'un *Coq* domeſtique, ce qui fait qu'on l'appelle petit *Aigle*, *Parva Aquila.*

7. AIGLE blanc comme un Cygne. *Aquila alba Cygnea.* Selon Charleton, il ſe retire ſur les Rochers eſcarpés proche du Rhin. Voilà les *Aigles* d'Europe, que M. KLEIN a obſervés.

8. URUTAURANA; URUTAVI CUIQUICHU CARRIRIRI, ſelon Marcgrave. C'eſt, ſelon Willughby & Rai, un *Aigle* hupé du Breſil.

* Voyez dans Aldrovande & Jonſton les autres eſpeces d'*Aigles*, & dans le *Dictionnaire des Animaux.*

## TRIBU II.

### *VAUTOURS*, mis dans l'Ordre des *Aves Accipitres* par M. LINNÆUS.

Il y a quelques *Vautours* qui ſurpaſſent en grandeur les *Aigles*. On les diſtingue les uns des autres, 1°. en ce que les *Vautours* ont le tronc du corps plus horizontal vers la terre, qu'élevé ; au lieu que l'*Aigle* porte la tête & le col élevés, de façon que depuis le doigt de derriere juſqu'au ſommet de la tête élevée, on peut tirer une ligne verticale. 2°. Les jambes & les pieds des *Vautours* ſont plus courts. 3°. Le *Vautour* eſt couvert de beaucoup de plumes ; mais, excepté la queue & les ailes, il a peu de grandes plumes, *pennæ*. Sous ces grandes plumes ſont les petites, qui ſont comme de la laine, de façon qu'en dépouillant un *Vautour* de ſes grandes plumes, on le pourroit prendre pour une *Brebis ailée*, ou pour quelqu'Oiſeau extraordinaire, étranger & inconnu. 4°. Le *Vautour* eſt couvert de fort peu de plumes ſur la tête & au col, & bien moins que ſur le reſte du corps. 5°. Le *Vautour* a un vaſte jabot. 6°. On ne voit ſur terre que deux ou trois de ces Oiſeaux enſemble ; les *Buzards* en ſont de même. 7°. Les *Vautours* cherchent les cadavres nouvellement expoſés. 8°. Le *Vautour* s'éleve difficilement pour voler, & comme l'*Outarde*, il s'eſſaye à trois ou quatre fois avant que de prendre ſon vol. 9°. Le bec du *Vautour* eſt long, fort, différent de celui de l'*Aigle*, qui commence à ſe courber dès ſa racine. Le ſien ne devient courbe qu'au bout. 10°. Les ongles des *Vautours* ſont faits en demi-croiſſant, plus que ceux des *Aigles*, qu'on voit rarement ſur terre. Par ces marques on peut diſtinguer de loin les différentes eſpeces de *Vautours*, dont voici la notice.

1. VAUTOUR doré, *Vultur aureus. Vultur fulvo colli*,

*pectoris*, & *pedum*, *colore*, de Charleton. *The Golden Vultur* en Anglois. Il surpasse en grandeur l'*Aigle noir*, & son bec a quatre pouces de long.

2. VAUTOUR à *Lievre*. *Vultur Leporarius*. Il est de la grandeur de l'*Orfraie*; & quand il est en colere, les plumes de sa tête se dressent, & ont la forme de la crête d'un *Coq*.

3. VAUTOUR de couleur chatain. *Vultur Bæticus*; *Milvus æruginosus*; nommé par M. LINNÆUS *Falco cera luteo-viridi*, *pedibus luteis*; *corpore ferrugineo*, *vertice fulvo*; en Anglois *The chesnut Vultur*. Celui qu'Albin nomme le *Buzard de marais Tom.* 1. *n.* 3. en Anglois *The moor Buzzard*, & en Latin *Milvus æruginosus*, n'est pas ce *Vautour*.

4. VAUTOUR d'Albin *Tom.* 3. *n.* 1. *Vultur*, nommé *Aigle du Soleil*.

5. VAUTOUR cendré. *Vultur cinereus*. M. KLEIN pense que c'est une varieté du *n.* III. & que c'est le mâle ou la femelle.

6. VAUTOUR blanc. *Vultur albicans*, selon Willughby; *Milvus albus*. C'est le plus petit des *Vautours*.

7. AIGLE-VAUTOUR. *Vulturina Aquila*, selon Aldrovande; en Anglois *The Buld*; *Vulturine Eagle*. Albin *Tom.* 2. *n.* 3. en donne la figure. Willughby le met dans le rang des *Aigles*. Aldrovande & Gesner le decrivent sous les noms de *Percnopterus*, *Gypaetus*, & *Oripelargus*.

8. VAUTOUR du Bresil. *Vultur Brasilienſis*; nommé *Urubu* par Marcgrave. *Vautour* qui a la figure d'une *Poule* d'Afrique, dit Sloane *II.* 292. nommé *Tropitotle* par Hernandez; *Aura* par Nieremberg; *Buteo specie Gallo-Pavonis*; en Anglois *The Turkey-Buzzard*. Catesby *p.* 6. en Hollandois *Monschen Eeter*.

9. CUNTUR, *Vultur Gryps*; *Gryphus*; *Cuntur* par Rai & Sloane; *Cundon* par Acosta & Frezier. Thomas Preston *Transact. Phil. n.* 473. *p.* 62. Labat *Tom.* 3. *p.* 320. & 321. On dit beaucoup de choses fabuleuses de cet Oiseau, le plus grand de tous. Voyez le *Dictionnaire des Animaux*.

10. VAUTOUR Moine, *Vultur Monachus.* En Anglois *The King of the Vultures* d'Edouard *I. p.* 2. *Rex Warwou-warum, Indiæ Orientalis. Vautour des Indes* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 4.

## TRIBU III.

*FAUCONS* & autres Oiseaux de proie, mis dans l'Ordre des *Aves Accipitres* par M. LINNÆUS.

Ces Oiseaux ont été nommés *Faucons* à cause de leur bec fait en forme de faux ; mais M. LINNÆUS a étendu le nom de *Falco*, aux *Aigles*, aux *Vautours*, & aux *Oiseaux de nuit.* Les Latins & les Allemands n'ont jamais donné, les premiers le nom de *Falco*, les autres le nom de *Falct*, aux *Vautours*, *Hulotes* & *Aigles.* En Italie, en Russie, en Pologne & en Prusse, on appelle les *Aigles*, *Aves heraldicas*, & non pas les *Faucons.* Aussi M. KLEIN en fait-il la troisiéme Tribu ou espece des Oiseaux de proie, & il comprend sous ce nom les *Faucons*, les *Milans*, les *Buzards*, les *Laniers* mâles des *Faucons.* Il n'est pas bien difficile de distinguer tous ces Oiseaux qu'on appelle *Faucons*, des *Aigles* & des *Vautours.* 1°. Les *Faucons* ont le col court. 2°. Le bec court, courbé dès sa racine ; le bout est crochu & pointu. 3°. Leurs jambes sont chargées de plumes ; ces plumes sont polies, fines & courtes. La plûpart n'en ont point aux pieds. 4°. Les jambes avec les pieds sont très-élevés à proportion du corps. Quelques-uns ont des ailes qui passent la queue ou qui l'égalent, & pour cela ils sont appellés *macropteres.* D'autres ont des ailes plus courtes que la queue, & ils sont appellés *brachypteres.*

1. FAUCON-VAUTOUR. *Falco rapax ; Falco vulterinus.* C'est le *Gerfault*, *Gyrofalco*, nommé *Herodias.* Par M. LINNÆUS, *Falco rostro nigro, pedibus luteis, corpore supra fusco, subtus albo cinereo, maculis transversis* ; en Anglois *The Gerfalcon.* On voit beaucoup de choses sur ce *Faucon* chez Willughby, Aldrovande &

Rai, & ſur le caractere des *Faucons* dans Frederic Imperator.

2. FAUCON ſacre, qui approche beaucoup du *Faucon Gerfault*, mais il eſt plus petit. Tous les deux ſervent à la chaſſe des *Grues* & des *Hérons*. *Falco ſacer*; en Anglois *The Sacre*. Il eſt plein de courage & d'agilité.

3. FAUCON gentil, *Falco gentilis*; *Faucon* paſſager, *migrator* & *commeator*, nommé par M. LINNÆUS *Falco pedibus flavis, corpore cinereo, maculis fuſcis, caudâ faſciis quatuor*. Albin *Tom.* 2. *n.* 6. donne la figure de cet Oiſeau. Fréderic diviſe les *Faucons* en étrangers & gentils; cette diſtinction ne ſuffit pas. Voyez en la différence dans Willughby *p.* 43. & 46.

4. FAUCON de Tunis, *Falco Punicus*. Belon. En Anglois *The Tunis* ou *Barbary Falcon*. Albin *Tom.* 3. *n.* 2. ou *Falcon from barbaries*, oiſeau vigoureux & fort attentif à ſa proie. Ceux de l'Iſle de Teneriffe paſſent pour les meilleurs. Voyez *Voyage au Levant* de Corneille le Bruyn *in*-4°. *Tom.* 2. *p.* 362. *Combat opiniâtre d'un Faucon.*

5. FAUCON lanier, ou cruel, plus petit que le *Gentil*, plus beau que le *Sacre* par ſes taches. *Falco lanarius, crudelis*. Belon, Willughby, Jean de Franchieres, Guillaume Tardif, Charles d'Acuſia, & d'Eſparon, Auteurs à conſulter.

7. FAUCON blanc, ou FAUCON de Moſcovie. On voit de ces *Faucons blancs* en Iſlande. *Falco albus, lactei coloris*, *Falco Moſcovitus*, ſelon Schwenkfeld; en Anglois *The withe Falcon*.

7. QUERCERELLE, ou CRECERELLE, *Falco cenchris*; *Tinnunculus*, ſelon Aldrovande. En Anglois *Windhofer Stannel or Keſtrel*. Albin *Tom.* 1. *n.* 7. C'eſt le mâle, plus petit que la femelle, dont nous donnerons la notice *n.* XXIV. & qui elle-même n'eſt pas plus grande qu'un *Pigeon*. Ce n'eſt qu'un petit Oiſeau de proie, improprement mis dans le rang des *Faucons*.

8. FAUCON de tour, ou de murailles, *Falco murorum, ruderum, turrium*. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt le *Faucon rouge*, ou le précédent. Il vit de petits Oi-

seaux, fait la chasse aux *Alouettes*, & se niche dans les tours.

9. FAUCON varié, *Falco varius, pictus, Alaudarum. Falco parvus; Falconellus feriens.* Le *Nisus* des Modernes. Cet Oiseau se tient comme immobile dans l'air, pour envisager sa proie & tomber dessus. On fait en Prusse avec cet Oiseau la chasse à cheval aux *Alouettes*. Voyez l'*Accipiter Fringillarius* de Willughby, qui est une espece différente du *Faucon d'arbre*; le *Fringillarius* d'Albin, *Tom.* 1. *n.* 5. & le *Subbuteo* du même *n.* 6. Le premier est l'*Epervier*, l'autre le *Hobereau.*

10. FAUCON Emerillon, *Falco Acalon* d'Aldrovande, qui à peine est de la grandeur d'un *Merle.* Selon la figure qu'en donne Aldrovande, ce seroit le précédent. Willughby *Tab. III.* en donne une meilleure figure. On lâche cet Oiseau sur les *Alouettes.*

Ce peut être le petit *Epervier* de Feuillée, *Journal III. Accipiter minor, pullivorax.*

11. FAUCON de Colombier, ou ÉPERVIER, *Falco palumbarius*; en Anglois *Goshawk.* Ce *Faucon* fait la chasse aux *Oisons* & aux *Pigeons*, & on l'instruit à la chasse du *Faisan* & des *Perdrix.* Il faut mettre de ce nombre le *Faucon* de la Baye de Hudson, dont parle Édouard *Tom.* 1. *p.* 3.

12. BUZARD d'Albin *Tom.* 1. *n.* 1. qui est le *Falco Buteo* vulgaire des Auteurs. Il est de la grandeur du *Faisan.* La *Bondrée* d'Albin *Tom.* 1. *n.* 7. & celui-ci ne sont que des varietés. Le *Faucon* d'Édouard 1. *t.* 4. qui fut pris sur Mer comme il revenoit de la Baye de Hudson, & un autre, dont le même Édouard parle *II. t.* 13. ne sont que des varietés.

13. MILAN Royal, *Falco caudâ forcipatâ; Milvus* d'Aldrovande; *Milvus vulgaris* de Willughby; en Anglois *The Kite or Glead*, Albin *Tom.* 1. *n.* 4. nommé *Accipiter Stellarius seu guttatus* par Frisch.

14. FAUCON du Perou à queue fourchue, *Falco Peruvianus, caudâ furcatâ. Épervier* à queue d'*Hirondelle* de Catesby *p.* 4. en Anglois *The Swallow tail-Hawk* M. KLEIN ne sait si c'est la grande *Hirondelle*

du Perou, de Feuillée *III. p.* 32. qui a des éperons ou ergots comme les Oiseaux de proie.

15. Autre BUZARD, *Falco*, *seu Milvus æruginosus* d'Aldrovande, qui peut être le *Circus* de Belon; en Anglois *The more Buzzard*, selon Willughby.

16. Petit ÉPERVIER à tête rouge ou jaune. *Falco vertice vel rubro vel luteo.* L'*Accipiter minor, capite rubro*, de Catesby *p.* 5. en est une varieté, ainsi que celui d'Albin *Tom.* 1. *n.* 3. qui a le menton & la tete jaunes, *vertice & mento luteis*, qui en est le mâle, ou la femelle, si cet Oiseau a été bien peint par Albin.

17. FAUCON, ou ÉPERVIER à *Pigeons* de la Caroline, à queue variée. *Falco Carolinienſis Palumbarius, caudâ variâ.*

18. FAUCON bleu azur, *Falco cyanopus* de Schwenkfeld, Jonston & Willughby. *Asterias* d'Aristote, Oiseau étoilé, *Avis stellaris* de Peucer; & Oiseau du Soleil, *Avis Phœbea.* Schwenkfeld parle d'un autre *Faucon*, qu'il nomme *Falco nothus*, *Faucon bâtard.*

19. FAUCON pêcheur de Catesby, *Falco Piscator cyanopus*; en Anglois *The Fishing Hawk.* Catesby *p.* 2. L'*Aigle pêcheur*, ou l'*Aigle de Mer* enleve à cet Oiseau fort adroitement sa proie.

20. FAUCON montain; *Falco montanus, montarius*, d'Aldrovande, de Schwenkfeld, & de Willughby. C'est le *Cybindus* & *Accipiter nocturnus* de Pline. Il fait son nid dans les montagnes, & c'est un Oiseau fort en chair.

21. FAUCON doré, *Falco aureus capite plumbeo, rotundo; pictus nigris maculis sagitariis.*

22. FEMELLE de l'*Henbarrier* des Anglois, nommé *Perturbateur des Poules.* Albin *Tom.* 2. *n.* 5. nomme cette femelle *Aigle* à queue blanche. *Falco plumbeus caudâ tessellatâ*; en Anglois *The Ring-Tail.* Le mâle, Albin *Tom.* 3. *n.* 3. en Anglois *The Cock-ring Tail*, ou *Henbarrier.*

23. ÉPERVIER mâle d'Albin *Tom.* 3. *n.* 4. & ÉPERVIER femelle *Tom.* 1. *n.* 5. *Falco fringillarius*; en Anglois pour le mâle *Sparrow-Haw-Cock*, & la femelle *The Hen.*

24. Mâle de la CERCERELLE, *Falco fœminæ Cenchridis*; en Anglois *The Windhover-Cock*. Albin *Tom.* 3. *n.* 5.

25. FAUCON aux mains dorées & à bec noir, qu'on a envoyé de Marienbourg à M. KLEIN. *Falco manibus aureis, roſtro nigricante.*

26. Petit FAUCON nommé LANIER, *Falco minimus laniolus*; en Anglois *Bucher Bird*, ou *Mattugeſſ*, ſelon Willughby, dont pluſieurs eſpeces.

1. Le grand LANIER cendré, *Lanius cinereus major* de Willughby & d'Albin *Tom.* 2. *n.* 13. dont Schwenkfeld donne une fort bonne deſcription, & que M. LINNÆUS nomme *Ampelis cæruleſcens, alis caudâque nigricantibus.* Il en donne la figure *Tabl.* 11. *n.* 181. Albin le nomme *Grand Écorcheur cendré.*

2. LANIER à tête & col cendré, plus petit que le précédent. *Lanius minor primo, capite & collo cinereis, gutture & pectore incarnatis, alis & dorſo ex ærugine & nigredine variegatis, roſtro & pedibus nigris.* C'eſt le *Collurio mas* d'Aldrovande, le *Spinitorquus* de Schvenkfeld, le petit *Écorcheur* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 14. le *Coſtrida* d'Olina p. 41.

3. Petit LANIER roux de Schwenkfeld, nommé par M. LINNÆUS *Ampelis dorſo griſeo, maculâ ad angulos longitudinali.* C'eſt le mâle ou la femelle du précédent. Albin *Tom.* 2. *n.* 15. en parle auſſi ſous le nom de *petit Ecorcheur.*

4. LANIER, qu'Albin *Tom.* 2. *n.* 16. nomme *Ecorcheur à tête rouge*; en Latin, ſelon M. KLEIN, *Lanius pectore, gulâ & ventre, niveis; ex albo & fuſco variegatus, ſuperiore corporis parte & colli æruginoſâ.*

5. Petit LANIER cendré de Rai & de Willughby. *Lanius minor cineraſcens.*

6. LANIER étranger, nommé *Ococolin*, *Lanius Ococolin*, eſpece de *Pic*, ſelon Seba *II. p.* 102. *Tab.* 36. *n.* 3. Il deſcend du Mexique dans le Breſil.

7. LANIER Ayoquantotl. Seba *ibid. n.* 4. Il a le bec noir, les pieds rouges, & le corps doré. On dit que c'eſt un Oiſeau chantant.

8. LANIER de Bengale, nommé *Charah*, roux & cou-

ronné, *rufus & coronatus*; en Anglois *The creſted red* ou *rush Butcher-Birn*. Edouard *II. p.* 54.

9. LANIER de Bengele, nommé *Fingah. Lanius Bengalenſis*; en Anglois *The fork-tail'd Indian Butcher-Bird*. Edouard *II. p.* 56, Il eſt bleu, a le ventre blanc, & la queue un peu fourchue.

10. LANIER de roſeaux, *Lanius arundinum*, que les Païſans, dit M. KLEIN, nomment *Moineau de jonc* ou de *roſeaux*. M. LINNÆUS met les *Laniers* dans l'Ordre des *Aves Paſſeres*.

* On peut ſur les *Faucons Vautours*, ou autres Oiſeaux de la même Tribu ou Famille, auxquels les Naturaliſtes donnent le nom de *Falco* & de *Lanius*, conſulter Willughby, Aldrovande, Geſner, Jonſton, &c. M. Gautier dans ſes *Obſervations ſur l'Hiſtoire Naturelle*, *Tom. 2. part. 6. pag.* 420 *& ſuiv.* en donne ſur les Oiſeaux carnaſſiers ou de proie.

## TRIBU IV.

*OISEAUX DE NUIT*, mis ſous le nom de *Strix* dans l'Ordre des *Aves Accipitres* par M. LINNÆUS.

Les *Oiſeaux nocturnes* ſont de pluſieurs eſpeces, & ont différentes varietés; mais les deſcriptions qu'on en donne, ne ſuffiſent pas pour les diſtinguer. Ce qu'il y a de plus embarraſſant, c'eſt que les Latins attribuent à preſque tous, pour ainſi dire, les mêmes noms. C'eſt-à-dire, ſi l'un entend par *Ulula*, le *grand Duc*, l'autre entend le *moyen Duc*, & un autre le *petit Duc*, ou la *Cheveche* ou *Hulotte*. La même confuſion ſe trouve auſſi dans les Auteurs François. Par exemple, au mot *Aluco* nos Dictionnaires diſent *Hibou, Chat-Huant, Duc, Oiſeau nocturne*; à celui d'*Aſio*, *Duc*, ſorte de *Hibou*; à celui de *Bubo*, *Hibou, Chat-Huant, Duc*; à celui d'*Otus*, *Duc*; à celui de *Strix*, *Effraye* ou *Freſaye*, qui, ſuivant les Modernes, eſt le nom générique de tous les *Oiſeaux nocturnes*; & le nom Latin de la *Freſaye* & *Effraye* eſt *Ca-*

*primulgus*; au mot *Ulula*, *Chat-Huant*, *Hibou*, *Huette* ou *Hulotte*. A de pareilles nomenclatures, que peut-on comprendre, si l'on n'eſt pas un peu verſé dans l'étude de l'Hiſtoire naturelle du Regne Animal? Il en eſt de même des autres Claſſes des Animaux, auxquels les Lexicographes, ſur les vrais noms latins, n'ont pas eu l'attention de fixer des noms françois particuliers & analogues.

Le mot *Strix*, comme l'a fait M. LINNÆUS, doit être le nom générique de tous les *Oiſeaux nocturnes*, ainſi que *Noctua*, qui avec une épithete diſtingue les différences.

Nous voudrions que le mot *Aſio* ne convînt qu'au *Hibou* à oreille d'*Ane*.

Celui de *Bubo* à tous les *Ducs*, grands, petits & moyens, avec une épithete.

Celui de *Noctua aurita*, à la *Chouette* à oreille.

Celui d'*Aluco*, à la *Chouette*.

Celui d'*Ulula*, á la *Cheveche* ou *Hulotte*.

Celui de *Caprimulgus*, à la *Freſſaye* ou *Effraye*, & ainſi du reſte.

On peut ſur les *Oiſeaux nocturnes* conſulter Willughby, Geſner, Aldrovande, Rai, & les Modernes.

1. Grand CHAT-HUANT ou DUC, *Ulula*; *Chalcio* par Goropius; *Bubo* par Schwenkfeld; en Anglois *The Great Horn-owl* ou *Eagle owl* de Willughby & Rai, nommé par M. LINNÆUS *Strix capite aurito, corpore rufo*. L'*Ulula* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 3. & celle d'Edouard *II. p.* 60. ſont cornues proche du bec, & différentes de celles du Païs de M. KLEIN, qui ſont cornues proche des oreilles. *Cornuta juxta aures*. En Suedois *Uf*.

2. Moyen DUC-HIBOU cornu de Belon. *Ulula*, *Aſio*, *Otus*, *Noctua aurita*.

Rai l'appelle *Otus*; Dale, *Aſio*; M. LINNÆUS, *Strix capite aurito*. En Suedois *Penniſſek*. En Anglois ſelon Willughby, *The Horn owl*; ſelon Albin *Tom.* 3. *n.* 6. *The black wing'd Horn owl*. Le *Duc* aux ailes noires. Feuillée *III. p.* 397. parle d'un *Bubo ochrocinereus*, *pectore*

*pectore maculoso*; M. LINNÆUS d'un *Bubo*, qu'on voit en Scanie, Province de Suede, commun dans les Montagnes de Laponie, qui est de la grandeur d'un *Coq d'Inde*. Il a des oreilles, & il est tout blanc. Il le nomme *Strix capite aurito, corpore albido*. L'*Otus* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 10. doit être plutôt nommé *Scops*, *petit Duc*, dit M. KLEIN. Rai & Willughby marquent qu'il y a des Oiseaux de nuit (cela doit s'entendre du *Bubo* & de l'*Otus*) qui comme les *Perroquets* & les *Pics*, ont deux doigts devant & deux derriere, mais c'est que le dernier doigt de devant est placé de façon qu'il paroît être derriere. C'est la réflexion de M. KLEIN, qui les met au nombre de ceux qui ont trois doigts devant & un derriere, & appartiennent par conséquent à sa quatriéme Famille, & à cette quatrieme Tribu du Genre premier, comme Oiseaux nocturnes.

3. HIBOU cendré. *Ulula*, *Strix*, d'Aldrovande, de Gesner & des autres. *Strix cinerea* de Willughby, qui le nomme en Anglois *The common brown* ou *Iwy owl*; *The Gry owl*. Par M. LINNÆUS *Strix capite lævi, corpore ferrugineo, oculorum iridibus atris, remigibus prioribus serratis*. Il y a des varietés dans cette espece de *Hibou*.

4. CHOUETTE, petit HIBOU; *Ulula Aluco* d'Aldrovande; *Ulula flammeata* de Gesner; *Otus* de Turnerus; *Aluca minor*, *Lucheran* ou *Chouette blanche*, d'Albin *Tom.* 2. *n.* 11. En Anglois *The common Bern-Owl*; *white Owl*; *Church-Owl*, selon Willughby. La grande *Chouette brune* & la *Chouette noire* d'Albin *Tom.* 3. *n.* 7. & 8. sont de la même espece.

5. CHOUETTE blanche, marquée de taches couleur de terre, *Ulula alba terrei coloris*, peut-être le *Strix capite lævi, corpore albido* de M. LINNÆUS, nommé par Rudbeck, *Noctua Scandiana maxima, ex albo & cinereo variegato*; en Suedois *Hûrfang*. C'est le même que celui dont parle Edouard *II.* 61. M. KLEIN a eu un mâle & une femelle de cette espece d'Oiseau de nuit; le mâle étant mort, il a donné la liberté à la femelle.

6. CHOUETTE d'Albin *Tom.* 2. *n.* 12. *Noctua parva aucuparia ; Noctua minor.* En Anglois *The little Owl.* En Latin *Aluco*, selon Albin. *Schaffielt* à Vienne. La petite *Chouette* d'Albin *Tom.* 2. *n.* 12. est une autre de la même espece, différente par la variété.

7. HIBOU, ou Duc à oreille, *Ulula ; Scops auritus*, selon Aldrovande ; dont deux especes.

La premiere est de la couleur du *Bubo*, *Duc*, & grande comme le *Pigeon sauvage.*

La seconde est le petit *Hibou* de Catesby *p.* 7. *Noctua aurita minima ;* en Anglois *The little owl.*

8. CABARE de Marcgrave, dont il donne la description sans la figure. *Ulula Brasilienſis.*

9. HULOTTE ou CHEVECHE-VAUTOUR, parceque cet Oiseau a le bec fait comme un *Vautour. Ulula Vulturina.*

10. HULOTTE-FAUCON, *Falco-Ulula*, parcequ'elle a le bec fait comme un *Faucon.* Edouard *p.* 62. En Anglois *The little Hawck Owl.*

## GENRE II.

*CORBEAUX & CORNEILLES*, mis dans l'Ordre des *Aves Picæ* par M. LINNÆUS sous le nom générique *Corvus. Syst. Nat. n.* 40. *p.* 19. *édit.* 6.

Le propre de ces Oiseaux est d'avoir les pieds écailleux, la plûpart noirs, ou tirans sur le noir ; le bec fait en forme de couteau, *cultratum ;* le bout crochu, fort ; la mâchoire supérieure voutée tout du long ; le jabot semblable à celui des Oiseaux de proie, la racine du bec garnie de poils ; la langue fourchue. Ce Genre d'Oiseaux est *Macroptere.* Voyez ci-dessus à l'article des *Faucons* la différence d'un Oiseau *Macroptere* d'avec un Oiseau *Brachyptere.*

1. CORBEAU, en Grec Κοραξ ; en Latin *Corvus ;* en Anglois *The Raven ;* nommé par M. LINNÆUS, *Corvus alter, dorso cæruleſcente.* Albin *Tom.* 2. *n.* 70. en donne la description & la figure. Il est d'un noir clair. M.

KLEIN en a vû de blancs. Il y en a, dit-on, en Norvege & en Islande, quoique l'Islande nourrisse des *Corbeaux noirs*. Caius masque avoir vu proche de Lubec une *Corneille* blanche comme de la neige ; en Silesie & à Dresde des *Pies* blanches ; & en 1548. deux *Corbeaux* blancs dressés à la Fauconnerie. Il n'y a point de Naturaliste qui ne parle du *Corbeau*, Oiseau si connu partout.

2. CORBEAU à collier, à pieds cendrés, & bec arqué, de Feuillée *III. p.* 14. *Corvus Forquatus, pedibus cinereis, rostro arcuato.* Le même Auteur a vû un autre Oiseau semblable à celui-ci, dont la tête étoit chauve, ridée, & couleur de rose. M. KLEIN pense que ce pouvoit être une espece de *Vautour*.

3. CORBEAU hupé, *Corvus cristatus*. C'est l'*Ococolin* ou la *Perdrix* de Montagne du Mexique. Seba *I. p.* 100. *Tab.* 64. *n.* 1. M. KLEIN marque que cet Oiseau n'a aucune marque de *Perdrix*, que c'est un nom que Seba lui donne sans raison. On a vû plus haut qu'il y a un autre *Ococolin* du Mexique, qui est une espece de *Lanier*.

4. Autre petit CORBEAU, *Corvus altor minor*. C'est la *Corneille*, *Cornix simpliciter*, dont plusieurs especes.

1. CORNEILLE noire, *Cornix nigra*; Κορωνη en Grec ; en Anglois *The common Crow* ; *Chough*, selon Willughby. C'est la femelle du *Corbeau*, Oiseau rare en Prusse, dit M. KLEIN. Albin *Tom.* 2. *n.* 21. en donne la description & la figure.

2. CORNEILLE cendrée. *Cornix cinerea* ; en Anglois *The Royston Crow* ; Albin *Tom* 2. *n.* 23. *Cornix varia* de Gesner ; nommée par M. LINNÆUS *Cornix, capite gulâ alis caudâque nigris, trunco cineraſcente.* Ces especes de *Corneilles* pendant l'Hiver se retirent en troupe dans les greniers, d'où elles chassent les *Hibous*. Elles font un bruit terrible.

3. CORNEILLE noire, mangeuse de grains & de fruits. *Cornix nigra, frugilega frugivora*, selon Aldrovande. *Cornus alter* par M. LINNÆUS. *Spermologus* ou *Frugilega* par Caius *Rarior. p.* 100. En Anglois *The*

*Rook*, ſelon Willughby ; nommée *Grolle* par Albin *Tom.* 2. *n.* 22.

4. CHOUCAS, ou la *Corneille* apprivoiſée. *Cornix garrula ; Monedula ; Graculus ; Garrulus ; Monedula torquata.* Par M. LINNÆUS *Corvus fronte nigrâ, occipite incano, corpore fuſco, alis caudâque nigris.* En Anglois, ſelon Willugby, *The Gack-Daw.* Albin *Tom.* 1. *n.* 14. en donne le deſcription & la figure.

5. CORNEILLE criarde. *Cornix nigra, garrula* ; Rai, *Naribus amplis.* Celle dont parle Sloane *II. p.* 298. crie continuellement, & ne differe de celle d'Europe que par les narines.

6. Petite CORNEILLE d'un grand noir. *Cornix parva profundè nigra ; Monedula tota nigra*, ſelon Sloane *p.* 299. Elle eſt ſi noire, qu'il n'y a ſur tout ſon corps aucunes nuances de noir plus foibles les unes que les autres, ni aucun mélange de bleu. C'eſt un Oiſeau de la Jamaïque.

7. Grande CORNEILLE criarde du même Païs. *Cornix Garrula major. Monedula tota nigra, major, garrula*, dont la mâchoire ſupérieure eſt arquée. Sloane *II. p.* 298. C'eſt l'*Ani* de Marcgrave. Willughby & Rai la nomment en Anglois *The Great black Bird.* Sloane avertit que Marcgrave en a mal dépeint les pieds.

8. CORNEILLE jaune, *Cornix flava*, nommée *Ocoſtinitzcam*, de la grandeur d'un *Pigeon.* Seba 1. *p.* 97. *t.* 61. *n.* 3.

9. CORNEILLE jaune, aux ailes & à la queue cendrée. *Cornix flava, alis caudâque cinereis* ; nommée *Hoixotoel* ou *Saligna*, ſelon Seba 1. *p.* 96. *t.* 61. *n.* 1. d'après Hernandez. C'eſt un Oiſeau qui ne ſurpaſſe pas en grandeur le *Pigeon ſauvage.*

10. CORNEILLE, eſpece de *Corbeau. Cornix corvina, corvi ſpecies* ; nommée *Yrzquauhtli*, ou *Aigle* de la Nouvelle Eſpagne. Seba 1. *p.* 97. *t.* 61. *n.* 2.

11. CORNEILLE ou *Choucas* de Cornouaille. *Cornix roſtro pedibuſque rubris. Coracias.* En Anglois, ſelon Willughby, *The Cornish Chough.* Cet Oiſeau a le bec, les pieds & les yeux rouges. Albin *Tom.* 2. *n.* 24.

12. Petite CORNEILLE des Indes Orientales. *Cornicula seu Monedula Indiæ Orientalis.* En Anglois *The Minor or Mino, greater and-less.* Edouard 1. *p.* 17. En François *le Mineur.* La figure qu'en donne Bontius, ainsi qu'Albin *Tom.* 2. *n.* 33. n'est pas meilleure l'une que l'autre.

13. CHOUCAS couleur de pourpre, de Catesby *p.* 12. *Moncdula purpurea; Cornix purpurea.* En Anglois *The Purple Jack-Daw.*

## GENRE III.

Différentes especes de *PIES*, *Picæ*, & Oiseaux de Paradis, *Manucodiatæ*, mis dans l'Ordre des *Aves Picæ* par M. LINNÆUS, avec les *Corbeaux* & *Corneilles.*

Le Genre des *Pies*, nommé *Pica*, comme qui diroit *picta*, à cause de la varieté des couleurs, approche du Genre du *Corbeau* par le bec, les pieds & les ongles; ce qui fait que le Savant M. LINNÆUS joint les *Pies* aux *Corbeaux.* M. KLEIN, qui les fait marcher après, n'a pas jugé à propos de les confondre avec les *Corneilles.* On les en distingue surtout par leur queue longue: ce qui fait que les *Pies* sont *Brachypteres*; au lieu que les *Corbeaux* & les *Corneilles*, & le *Choucas* pourpré, que M. KLEIN nomme aussi *Pie*, sont *Macropteres.*

1. PIE, Πιττα en Grec. *Pica Rusticorum; vulgaris. Pica varia, caudata.* Par M. LINNÆUS, *Corvus caudâ cuneiformi.* En Anglois, selon Charleton, *The Pie.* Selon Albin *Tom.* 1. *n.* 15. & Willughby, *Agasse The Magpie*, ou *Piaret.* Vormius *p.* 293. dit avoir eu une *Pie blanche.* Mais une *Pie toute blanche* est un Oiseau très-rare, comme le remarque M. KLEIN.

2. GEAY, *Pica Glandaria*, de Gesner & de Willughby; & le *Garrulus* des Modernes; nommé par M. LINNÆUS *Corvus variegatus, rectricibus alarum cæruleis, lineis transversis albis nigrisque.* Par Olina *p.* 35. *Ghiandina.* En Anglois *The Gay.* Albin *Tom.* 1. *n.* 16. en donne la figure & la description. Il ne faut

pas confondre le *Geay* avec le *Perroquet* d'Allemagne. Voyez Zornius *Epit. à Bruckman sur les Oiseaux d'Allemagne.*

3. GEAY bleu hupé, de Catesby *p.* 15. *Pica glandaria cristata, purpureo-cærulea.* En Anglois *The blew Gay.*

4. CASSE-NOISETTE ; *Pica nucifraga ; Nucifragus.* Turnerus dit que c'est un Genre de *Geay* de Montagne. *Graculi alpini seu montani genus.* Gesner parle d'un autre, qu'il nomme *Graculus nucum, Sturni instar maculosus, caryocatactes p.* 216. & d'une autre espece *p.* 635. Willughby *p.* 90. d'un *Caryocatactes.* M. KLEIN a vû deux de ces Oiseaux qui n'étoient que des varietés, & non des especes différentes. On peut consulter Willughby, Gesner & Schwenkfeld sur ces especes d'Oiseaux. Albin *Tom.* 2. *n.* 28. parle d'un *Casse-noisette* qu'il nomme en Latin *Sitta* ou *Picus cinereus ;* & en Anglois *The Nathatch* *.

5. PIE, *Pica. Merle* du Mexique, *Merula Mexicana*, selon Seba 1. *p.* 101. *t.* 64. *n.* 5. M. KLEIN dit que Seba donne mal à propos le nom de *Merle* à cet Oiseau, qui surpasse en grandeur nos *Grives*, & qui a le bec beaucoup plus gros & plus grand.

Autre PIE du Mexique, *Pica Mexicana alia.* Seba 1. *p.* 101. *t.* 64. *n.* 6.

7. PIE ou GEAY de Strasbourg, *Pica seu Garrulus Argentoratensis.* Selon Aldrovande, *Cornix fera, picta, cærulea.* Selon Schwenkfeld, *Psittacus Germanica.* Par M. LINNÆUS *Corvus dorso sanguineo, remigibus nigris, rectricibus viridibus.* Wormius en parle *p.* 296. Willughby le nomme en Anglois *The Rollet.* Zornius *II. p.* 267. donne la description de cet Oiseau, qu'il nomme en Alleman *Birckheher.* Cet Oiseau après la moisson se nourrit de bayes & d'Insectes.

Le *Geay* du Cap de Bonne-Espérance, dont parle Albin *Tom.* 1. *n.* 17. approche beaucoup de celui-ci.

* Cet Oiseau rare aux environs de Paris, y a été fort commun pendant les Vacances dernieres. On en a tué & pris de vivans du côté de Soissons & à Malzerbe, proche de Fontainebleau. C'est ce que j'ai appris de M. Bernard de Jussieu, qui en a vu chez un de ses Amis, le mois d'Octobre dernier.

8. GEAY de Bengale d'Albin, *Pica Glandaria Bengalis.* En Anglois *The Gay from Bengal. Tom.* 1. *n.* 17.

9. PIE Grieche de Bengale, *Pica Græca Bengalensis.* En Anglois *The Bengal Dial-Bird. Cock.* Albin *T.* 3. n. 20.

10. PIE de Ternate, *Pica Ternata.* Selon Seba 1. *p.* 74. *t.* 46. *Avis Paradisiaca. Dea Ternatana.* C'eſt un Oiſeau, qui, ſelon M. KLEIN, doit être mis au rang des *Pies*, & qui peut être la *Pica caudata* de Charleton. Il faut ici remarquer que Seba appelle tous les Oiſeaux étrangers qui ont de longues queues, *Oiſeaux de Paradis.* C'eſt ce qui fait que M. KLEIN place les *Oiſeaux de Paradis* dans le Genre des *Pies*; mais il en faut excepter des Oiſeaux à longue queue, qui ne ſont ni *Oiſeaux de Paradis*, ni *Pies.*

11. PIE blanche & noire; *Pica ex albo & nigra varia, duabus caudæ pennis ſimplicibus prælongis*: nommée par Seba 1. *p.* 85. *t.* 52. *Avis Paradiſiaca Orientalis, ex albo & nigro varia* Cet Oiſeau a la tête & le col pourpré, le bec blanc, les ailes noires, le tronc blanc, les pieds rouges, les ongles blancs.

12. PIE jaune & noire, *Pica ex luteo & nigra varia*; en Anglois *The yellow and black Pie* ſelon Rai.

13. PIE de Paradis, *Pica Paradiſi.* Ce ſont les différentes eſpeces d'Oiſeaux de Paradis.

1. Le MANUCODIATA; *Avis Paradiſi.* Le *Manucodiata* d'Aldrovande, de Willughby à tête dorée, *capite aureo*, qu'Aldrovande, en ſuivant la fable des autres, a dit n'avoir point de pieds. Mais il a des pieds, *pedata.* On en voit, & on en a vû.

2. Le MANUCODIATA ſecond d'Aldrovande. Willughby en parle, & le nomme en Anglois *Bird of Paradiſe.* Cet Oiſeau a la tête blanche, avec des taches dorées, le bec d'un verd jaune; deux eſpeces de cordelettes couleur de corne & longues ſortent du croupion.

3. Le MANUCODIATA troiſiéme d'Aldrovande, qui eſt l'*Hippomanucodiata* de Willughby.

4. Le MANUCODIATA quatriéme du même, nommé *cirrata* par Willughby.

5. Le MANUCODIATA cinquiéme ou vulgaire d'Aldrovande, dont parlent Willughby & Gesner.

6. Le MANUCODIATA, Roi des Oiseaux de Paradis, de Marcgrave & de Willughby.

7. Le ROI des Oiseaux de Paradis, *Rex avium Paradisiacarum majoris moduli*, décrit par Willughby *p.* 61. On peut sur les Oiseaux de Paradis consulter Wormius.

8. Petit OISEAU ROYAL de Paradis d'Amboïne, *Avis Regia seu Paradisi, minor Amboïnensis.* Seba *t.* 65. *t.* 37. *n.* 15.

9. Autre OISEAU de Paradis, nommé par le même *p.* 99. *t.* 63. *n.* 1. 2. *Avis Parad. Aravica, maxima subrubra*, mâle & femelle.

10. Autre OISEAU de Paradis des Indes Orientales du même *p.* 95. *t.* 6. *n.* 2. 3. *Avis Parad. Orientalis, vario colore elegantissimo.*

14. PIE noire de la Jamaïque. *Pica nigra Jamaïcensis plumis interspersis purpureis, è viridi resplendentibus, rostro novaculæ-formi*; nommée par Sloane *II.* *t.* 298. *Monedula tota nigra*; en Anglois *The Razor-billed Black of Jamaïca.* Catesby *app. p.* 3. en parle.

## GENRE IV.

*ÉTOURNEAUX*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Passeres.*

Ce Genre d'Oiseaux a la langue fourchue, approche des *Pies*, & n'en differe pas beaucoup par les pieds. Le doigt de derriere dans la plûpart est plus long. La queue & le bec sont différents de ceux des *Pies.*

1. ÉTOURNEAU vulgaire, *Sturnus pratorum, vulgaris, sturnus simpliciter*; nommé par quelques-uns *Sturnellus*; en Italien *Storno* & *Stornello*; en Anglois *Starre Starl*; en Allemand, selon Schwenkfeld, *Rinder Staar, Spreche, Sprée*; par M. LINNÆUS, *Sturnus rostro flavescente, corpore nigro, punctis albis.* Albin *Tom.* 1. *n.* 40. donne la figure & la description de l'*Etour-*

*neau*, & *ibid. n.* 38. celle de l'*Etourneau à rouge aile.*

2. ÉTOURNEAU à rouge aile, de Catesby *p.* 13. qui est peutêtre le même que celui d'Albin, dont nous venons de donner la notice, & l'*Acolchichi*, dont parle Willughby *p.* 391. en Latin *Sturnus niger, alis superne rubentibus*; en Anglois *The red wing'd Starling.*

3. ÉTOURNEAU à crins cendrés de la Chine; *Sturnus crinibus cinereis & delibutis, calamistro in vallum ad frontem compositis*; en Anglois *The Chinense Starling* ou *Black-Bird.* Edouard *p.* 19.

4. ÉTOURNEAU à queue divisée, *Sturnus caudâ divisâ*; nommé par Seba 1. *p.* 107. *t.* 65. *n.* 4. *Turdus niger Mexicanus.* Ce n'est rien moins qu'une *Grive*, dit M. KLEIN.

Albin *Tom.* 2. *n.* 41. donne la figure & la description d'un *Etourneau* jaune de Bengale.

## GENRE V.

*GRIVES & MERLES*, mis dans l'Ordre des *Aves Passeres* par M. LINNÆUS.

Ce Genre d'Oiseaux a la poitrine élevée, le bec médiocrement fort, pointu, la mâchoire inférieure droite; la supérieure diminue au milieu, devient légerement crochue, & surpasse d'un peu l'inférieure. Ces Oiseaux different entr'eux par les couleurs. L'ouverture du bec est communément jaune, ou dorée. Ils sont de diverses grandeurs, & ils se nourrissent de Bayes & de Vermines.

1. Grande GRIVE, *Turdus viscivorus maximus*: *Turdela* de Gesner, d'Aldrovande & d'Isidore; *Turdus viscivorus major*, de Willughby. En Allemand, selon Schwenkfeld & Frisch, *Shnarr Drossel, mistel Drossel.* M. KLEIN fait plus de cas des figures d'Albin pour les *Grives*, que de celles de Frisch. Cet Oiseau est le plus grand de toutes les especes de *Grives.*

2. GRIVE ſimplement ; *Turdus ſimpliciter ; Turdus medius pilaris* d'Aldrovande ; *Turdus pilaris* de Willughby, Schwenkfeld & Friſch ; *Tourdelle* d'Albin *Tom.* 1. *n.* 36. qui la nomme en Anglois *The Fielfare.* Par M. LINNÆUS *Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite cano.* Cet Oiſeau eſt plus grand qu'un *Merle.* Beaucoup de ces Oiſeaux ſont paſſagers ; pluſieurs reſtent & font leurs nids en Pruſſe. On en voit tout l'Hiver à Dantzic. Schwenkfeld parle d'une de ces eſpeces de *Grives* à tête blanche ; en Grec Λευκοκεφαλος.

3. GRIVE, *Turdus iliacus*, *Illas*, ou *Tylas.* Schwenkfeld l'appelle *petite Grive*, *Turdus minor*, mais mal ; *Turdus viſcivorus maurus*, ſelon Friſch. M. LINNÆUS dit que le *Turdus iliacus*, & le *Turdus alis ſubtus ferrugineis, linea ſupra oculos albicante*, ſont le même. Cette *Grive* ne chante point ; ſon cri ſeulement eſt *Tip*, *Tip.* Albin, qui en donne la deſcription & la figure *Tom.* 1. *n.* 33. la nomme en Anglois *The-miſle Bird* ; Willughby *The red-wink*, *Swine-pine*, ou *wind Truſch* ; en Allemand *Tiep-pfeiff-Droſſel.* Cette *Grive* eſt plus grande que celle qui chante.

4. Petite GRIVE, ou MAUVIS, ſelon Albin *Tom.* 1. *n.* 34. *Turdus minimus*, ſelon Friſch ; *Turdus muſicus*, ſelon Schwenkfeld ; la *Grive à roupe aile* d'Albin *Tom.* 1. *n.* 35. *Turdus iliacus* eſt de la même eſpece : l'une eſt le mâle, l'autre eſt la femelle. M. LINNÆUS la nomme *Turdus alis ſubtus ferrugineis, lineâ ſupra oculos albicante : Klera, Kladra*, en Suedois ; *The Mauvis* ou *Sang Trush* en Anglois. Cet Oiſeau ſe retire dans les Forêts, ſe perche au haut des arbres : & dans le Printems il imite par ſon chant celui du *Roſſignol.*

5. MERLE, *Turdus niger ; Merula ſimpliciter*, *Merla* par Olina *pag.* 29. Κιχλη en Grec, ou Κιχηλα, ſelon Friſch ; *Turdus ater, roſtro palpebriſque fulvis*, ſelon M. LINNÆUS. La femelle eſt couleur de terre. La mâchoire ſupérieure de cet Oiſeau eſt mobile. Schwenkfeld parle d'un *Merle blanc.* Albin *Tom.* 1. *n.* 37. donne la deſcription du *Merle noir* & la figure. Il le nomme en Anglois *A Black-Bird* ; les Allemands

le nomment *Schmarbe Droſſel*, *Schmarbe Amſel*, *Meerle*.

6. MERLE à collier, *Turdus Torquatus*, *Merula Torquata*, *Merula fuſca*, ſelon Schwenkfeld, Friſch, & Eberus; *Merula nigricans roſtro flaveſcente, torque alba* par M. LINNÆUS; en Anglois *The Ring Owzel*, ſelon Albin *Tom.* 1. *n.* 39. en Allemand *Ring Droſſel*, *Ringel-Schnee-merros Droſſel*.

7. MERLE doré, *Turdus aureus*, *Oriolus*; *Pyrod*, *Galbula*, ſelon Schwenkfeld & Friſch; *Pic* qui ſuſpend ſon nid, *Picus nidum ſuſpendens*, dit Aldrovande; *Icterus* de Pline; en Allemand *Hold Droſſel*, *Mitthemale*, *Bierhold*, *Bierolff*, *Beerhold*, *Hold Meerle*, & *Airſch Bogel*, ſelon M. KLEIN.

L'Oiſeau jaune de Bengale d'Albin *Tom.* 3. *n.* 20. en Anglois *The yellow Bird from Bengal*, en eſt une varieté; & l'*Icterus* des Indes d'Edouard *II. p.* 77. dans le *Catalogue des Oiſeaux de Peterſbourg p.* 375. les *Galbula* ſont mis dans le Genre des *Etourneaux*. Schwenkfeld dit que cet Oiſeau eſt un genre de *Pic* de la grandeur d'un *Merle*, & M. KLEIN ſoutient qu'il a toutes les marques d'une *Grive*. Son nid eſt ſuſpendu, il a une voix claire qui varie, & il aime beaucoup les ceriſes.

8. GRIVE rouge à tête bleue-azur, *Turdus ruber cyaneo capite*; en Allemand, ſelon Friſch, *Blave Droſſel*, *Blautœpffige rohte Droſſel*. Edouard *I. p.* 18. dit que c'eſt le *Moineau ſolitaire*. Il ſe trompe, ſelon M. KLEIN, c'eſt la *Grive bleue*, qui chante.

9. GRIVES blanches. Friſch *Tab.* 33. donne la figure de deux; l'une blanche, & qui a quelques taches; l'autre qui a le dos brun, & qui a beaucoup de taches. Ce ſont des varietés, ou des couleus accidentelles, & ce peuvent être le mâle & la femelle. Dans l'Afrique occidentale à Bambuc & à Galam il y a des *Grives* & des *Merles* très-blancs, & variés de différentes couleurs. Voges en parle dans ſes Voyages.

10. GRIVE, nommée *Tourdelle*, *Pie* ou *Grieche* par Albin *Tom.* 2. *n.* 36. En Latin *Turdus Pilaris*, *maculis lunatis variegatus*; en Anglois *The Pied-field-fare*. M.

KLEIN ne sait si cet Oiseau est le *Moineau solitaire*, la *Grive bleue* des Indes de Willughby ; en Anglois *The Indian Moekbird.* Il dit n'avoir point vû de *Moineau solitaire.*

11. GRIVE, nommée le *Moineau solitaire* par Willughby ; *Passera solitaria* par Olina *p.* 14. Cet Oiseau est pris pour le *Moineau solitaire.* Il est de la grandeur de la *Grive noire*, qui est le *Merle* ; tigré de noir & de cendré comme l'*Etourneau.* Olina en a donné une fort bonne figure ; & selon cette figure, l'Oiseau précédent d'Albin, qui est le *Turdus pilaris variegatus*, n'est pas le *Moineau solitaire.*

12. GRIVE toute rouge de Surinam, *Turdus totus ruber*, *Icterus Surinamensis ruber.* Edouard, qui la nomme en Anglois *The red-bird from Surinam p.* 39. hésite s'il doit mettre cet Oiseau dans la Famille du *Pinson*, qui a la tête dorée, ou dans celle du *Rossignol de Virginie*, ou dans celle du *Geay de Bohéme.* M. KLEIN ne fait point de difficulté de le mettre dans le Genre des *Grives*, & de l'espece de celle que les Naturalistes nomment *Icterus.*

13. Petite GRIVE variée, *Turdus minor varius*, *Icterus minor.* Cet Oiseau, dit Rai, suspend son nid. C'est l'*Ipajuba* ou *Japu* de Marcgrave ; Willughby le nomme en Anglois *The* Watchy Picket, ou *Spanish Nightingale.* Sloane *II.* 299. *Tab.* 257. en parle ; *The American Hangnest*, selon Rai. Cet Oiseau de couleur blanche, noire, brune & feuille morte, paroît être le même que le *Rossignol* de Virginie, *Luscinia Virginiana*, *capite non cristato*, dont parle Clayton *Phil. Transf. N°.* 206. *p.* 933. quoique cependant cet Oiseau soit du Genre des *Gros Becs*, *Coccothraustæ.* Un autre *Icterus minor*, couleur de safran, qui fait aussi un nid suspendu, dont parle Sloane, & représenté à la *Table* 258. en est une varieté.

14. Petite GRIVE à gosier noir, *Turdus minor*, *gutture nigro*, *Icterus minor* ; en Anglois *The Bastard Baltimore*, selon Catesby *p.* 49. La femelle est plus belle que le mâle, selon la description de Catesby. Il n'y a que les femelles des Oiseaux de proie qui soient plus

belles que leurs mâles ; & M. KLEIN penſe que ce que Cateſby prend ici pour la femelle, eſt le mâle ; en Allemand *Schmarbhartiger Bittemall.*

15. GRIVE variée de noir & de jaune. *Turdus Icterus ex auro nigroque varius ;* en Anglois *The Baltimore Bird*, ſelon Cateſby *p.* 48. Cet Oiſeau eſt une varieté de l'*Icterus n.* 7.

16. MERLE-PIE d'Albin *Tom.* 2. *n.* 37. *Turdus niger, Merulus variegatus ;* en Anglois *The Pied-black Bird.* Le *Contra* de Bengale du même, *Tom.* 3. *n.* 21. en eſt une varieté.

17. GRIVE brune du paſſage de la Caroline, *Turdus muſicus Carolinienſis, Turdus pilaris migratorius ;* en Anglois *The field-fare of Carolina ;* en Allemand *Caſrolinſche Sang-Droſſel.* Cet Oiſeau approche beaucoup de la *Grive* qui chante.

18. MERLE aquatique, *Turdus aquaticus, Merula aquatica ;* en Anglois *The Water Owzell.* Albin *Tom.* 2. *n.* 39. nommé par M. LINNÆUS *Motacilla pectore albo, corpore nigro.* Peutêtre eſt-ce le *Picus murarius* d'Aldrovande.

19. GRIVE rouſſe, *Turdus rufus, caudâ longâ neglectâ.* Cateſby *p.* 28. en Anglois *The fox Coloured Trush.* En Allemand *Roſtige Droſſel.*

20. OISEAU de Banana dans la Jamaïque. *Turdus oculis cæruleis.* Albin *Tom.* 2. *n.* 40. en Anglois *The Banan-Bird from Jamaïca.*

21. Le MOCQUEUR de Cateſby *p.* 27. en Anglois *The Mock-bird ;* en Latin *Turdus minor cinereo-albus, immaculatus.* Sloane *II. p.* 306. *t.* 256. *f.* 3.

22. GRIVE aux jambes rouges, à l'iris dorée. *Turdus viſcivorus plumbeus ;* en Anglois *The red-leg'd Trush.*

23. Petite GRIVE de Cateſby *p.* 31. *Turdus minimus ;* en Anglois *The little Trush.* On la peut comparer avec la *Grive* qui chante, *n.* XVII.

24. GRIVE ou MERLE des Indes, dont la poitrine eſt couleur de cinnabre ; *Turdus, ſive merula indica, pectore cinnabarino.* Ce peut être le *Jacapu* de Marcgrave.

25. GRIVE à couronne rouge. *Turdus coronâ rubrâ ; Muſcicapa, coronâ rubra ;* en Anglois *The Thyrant.* Cette

eſpece de *Grive* nourrit ſes petits de *Mouches*, *Guêpes*, & autres inſectes, comme les autres eſpeces de *Grives*. Ce que fait auſſi le *Buzard*, *Falco Buteo*, Oiſeau de proie. C'eſt ce qui montre qu'on ſe trompe en tirant le Genre des Oiſeaux par la nourriture qu'ils prennent.

26. CUL BLANC à poitrine jaune, de l'Amérique; *Turdus pectore luteo*; *Œnanthe Americana pectore luteo*; en Anglois *The yellow breaſted Chat*. Cateſby *p.* 50.

27. GRIVE brune, ou MERLE brun de la Jamaïque; *Turdus fuſcus*, *Merula fuſca*; en Anglois *The Trush*. Son bec eſt doré, & il a un tache noire au bout.

28. PRENEUR de Mouches hupé, *Turdus criſtatus*; *Muſcicapa criſtata*, *ventre luteo*; en Anglois *The creſted Fly-catcher*.

29. Petite GRIVE de l'Amérique; *Turdus minor caruleo-albus*, *immaculatus alter*. Sloane *II. t.* 256. Rai *p.* 185. *Turdus Americanus minor*, *canorus*, *ex cinereo albus*, *non maculatus*; en Anglois *The American Song-Trush Mockbird* ou *Nightingale* de Rai *p.* 64. C'eſt le *Goncoktlatelli* de Nieremberg & d'Hernandez, & peutêtre le *Mocqueur* de Cateſby, ou du moins une varieté.

30. BANIAHBOW de Bengale, *Turdus Bengalenſis*; en Anglois *The Baniahbow* de Bengale. Albin *Tom.* 3. *n.* 19.

31. GRIVE hupée, ou Oiſeau de Paradis du Breſil. *Turdus criſtatus*, *avis Paradiſiaca Braſilienſis*, qui eſt le *Cuiri-acamaku* hupé de Seba *II. p.* 93. *t.* 87. *n.* 2. Cet Oiſeau eſt rare; on n'en prend que dans les lieux déſerts.

32. GRIVE ou MERLE de Rocher, qu'Albin *Tom.* 3. *n.* 55. nomme *Grand rouge queue*. *Turdus ſeu Merula ſaxatilis*; en Anglois *The Greater Redſtard*; nommé par M. LINNÆUS, *Turdus rectricibus ruſis*, *duabus intermediis cinereis*, *faſcia nigricante proxime apice cinerea*.

33. GRIVE jaune & noire de Cateſby, qu'on apprivoiſe, *append. p.* 5. *Turdus luteo-niger*, *gutture piloſo*, *capite*, *gulâ roſtroque*, *dorſo caudâque nigris*, *cervice*,

*uropygio, & toto ventre luteis, alis nigris, rectricibus albo-fimbriatis, roſtro unciali :* nommée *Pie* variée de jaune & de noir, *Pica luteo-nigra varia ;* en Anglois *The yellow and black Pie.*

34. GRIVE huppée, qui eſt le *Geay* de Boheme. *Turdus criſtatus roſtro brevi, ad ortum lato, Europæus ; Garrulus Bohemicus* de Geſner ; *Ampelides* d'Aldrovande ; *Bombicilla incendiaria, zincirella*, de ſon cri, par Schwenkfeld ; Γναφαλος, *Microphœnix* par Faber ; nommée par M. LINNÆUS *Ampelis remigibus quibuſdam apice membranaceo terminatis*, Oiſeau très-connu, dont on lit une ample deſcription dans le *Miſcellaneum* du Royaume de Boheme par Balbin, *Decad. I. lib. I. c. 31.* Il y a des varietés dans cette eſpece d'Oiſeau. Albin *Tom. 2. n. 26.* en donne la deſcription & la figure. Il le nomme en Anglois *The Bohemian Gayor Chatterer.*

35. JASEUR de la Caroline. *Turdus garrulus Carolinienſis ;* en Anglois *The Chatterer.* Cateſby *p. 46.* Cet Oiſeau n'eſt pas ſi beau en couleur que celui d'Europe (le *Geay* de Boheme).

36. GRIVE chantante de marais, *Turdus muſicus paluſtris dumetorum, arundinum. Hiſt. avi. Prodrom* de M. KLEIN *Part. III.* §. XXIV.

37. GRIVE couleur de roſe. *Tudus roſeus, capite ex nigro cæruleo & cirro retro compto, alis & caudâ nigris, roſtro ultra dimidium luteſcente ;* en Eſpagnol *Tordos ;* en Anglois *The roſe* ou *carnation colour'd Ouzel.* Aldrovande en parle XVI. *c.* 15. & Willughby. Edouard *p.* 20.

On peut placer ici, dit M. KLEIN, l'Oiſeau inconnu de Bruckmann, *Epiſt. iten.* CLXI.

## GENRE VI.

*ALOUETTES*, miſes dans l'Ordre des *Aves Paſſeres* par M. LINNÆUS *n.* 75.

Ce Genre d'Oiſeaux a le bec plus menu que les *Grives.* Il eſt obtus par le bout. On connoît les

*Alouettes* par le doigt de derriere, que les Oiſeleurs nomment *éperon.* Il eſt long & pointu. Les Grecs nomment ce Genre d'Oiſeau Κορυδαλος, de κορυς, *galea*, *hupe*, que n'ont cependant pas toutes les *Alouettes.* Les Latins les nomment *Alauda*, qui eſt un mot d'origine Gauloiſe. Cet Oiſeau eſt plus grand que le *Moineau.*

1. ALOUETTE ſimple, *Alauda ſimpliciter*, *Alauda calipeta*, *non criſtata*; *Alauda pratorum* de Friſch; *Alauda ſine criſtâ* de Geſner & d'Aldrovande. Quand cet Oiſeau a pluſieurs années, ſon éperon ou ergot eſt très-long. Il a le bec un peu jaune. M. LINNÆUS le nomme *Alauda rectricibus extimis duabus extrorſum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis.* Voyez Albin *Tom.* 1. *n.* 41.

2. ALOUETTE de Bois, *Alauda Sylveſtris*, *pratorum*, *Alauda novalium*, ſelon Friſch; *Alauda arborea*; par M. LINNÆUS, *Alauda rectricibus fuſcis extimis duabus extrorſum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis.* Albin *Tom.* 1. *n.* 42. en donne la deſcription & la figure.

M. KLEIN remarque que l'*Alauda Pratorum* de Friſch, eſt la même que la précédente, nommée *Calipeta.* Quand elle n'a pas plus d'un an & demi, ſon éperon eſt encore court. Olina *p.* 27. la nomme *Tattovilla di prato.* Il faut dire la même choſe de l'*Alauda fiſtulans* de Friſch, c'eſt-à-dire, que c'eſt le même Oiſeau; ainſi que de l'*Alouette de Pré*, & de la petite *Alouette* d'Albin *Tom.* 1. *n.* 43. & 44. Ainſi l'*Alouette vulgaire*, *Alauda vulgaris*; l'*Alouette* de Bois, *Alauda Sylveſtris*; l'*Alouette* de Pré, *Alauda Pratorum*; & la petite *Alouette*, *Alauda minor*, ne ſont que le même Oiſeau, à qui ces noms différents ſont donnés, ſuivant l'âge qu'il a. M. KLEIN ne met auſſi nulle différence entre des *Alouettes* de Leipſic, qui s'élevent en l'air, *Calipetæ*, & celles de ſon Païs (Dantzic), quoique les premieres ſoient diſtinguées par leur grandeur & leur corpulence, & une ou deux longues plumes.

3. ALOUETTE hupée; *Alauda capitata criſtata*, *viarum*,

*tum*, selon Schwenkfeld & Willughby ; *Londola* par Olina *p.* 13. *Galerita* par Frisch. Albin *Tom.* 3. *n.* 52. en donne la description. Cette espece d'*Alouette* fréquente dans l'hiver, comme les *Moineaux* & autres petits Oiseaux, les jardins, les chemins, & autres lieux fréquentés.

4. ALOUETTE blanche, *Alauda major*. Selon Frisch ces Oiseaux passent de Norvege, où il y en a beaucoup, en Allemagne. M. KLEIN dit qu'étant plus voisin des Païs Septentrionaux, il n'en a pas vu un dans l'espace d'un demi-siecle, & que ces *Alouettes blanches* ne peuvent l'être que par accident. C'est ainsi que l'on voit quelquefois des *Moineaux*, des *Hirondelles* & des *Pies blanches*. M. KLEIN marque avoir nourri pendant deux ans une nichée de *Souris*, dont deux étoient grises, & deux blanches. Cela n'est pas rare : on en voit à Paris & ailleurs.

5. ALOUETTE de la Virginie & de la Caroline. *Alauda gutture flavo, Virginiæ & Caroliniæ*, Catesby *p.* 32. M. KLEIN a eû le 21 Avril 1667. un de ces Oiseaux, que le gros tems avoit porté en Norvege, & de là à Dantzic, & un autre qui lui fut apporté en Décembre 1747. par un Oiseleur de Zopott.

6. Grande ALOUETTE de Catesby *p.* 33. *Alauda magna* ; en Anglois *The Large lark*. C'est un Oiseau de l'Amérique Septentrionale.

7. ALOUETTE ou CALENDRE de Belon ; *Alauda quæ Calandra*. Belon & Olina *p.* 30. en donnent la figure.

Willughby & Rai mettent la *Locustella* de Jonston, la *Spipoletta* plus grande que les *Alouettes*, & la *Glareola*, au rang des *Alouettes*. Il est parlé dans le *Cat. Av. Petrop. p.* 376. d'*Alouettes* qui ont des oreilles.

## GENRE VII.

Différens petits Oiseaux, comme les *Rossignols*, les *Rouge-Gorges*, *Rouge-Queues*, *Bergeronettes*, *Cul-blancs*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Passeres*.

M. KLEIN donne à ce Genre d'Oiseaux le nom de

*Ficedula*, Mangeur de Figue. Ils se nourrissent aussi de *Mouches* & de *Vermine*, *Musci-vermi-peta*. Ce sont de petits Oiseaux, dont le bec convient assez avec celui des *Alouettes*; il est menu & émoussé. Ils ont aux doigts des ongles courts, presque égaux entr'eux, sans éperon. Ce Naturaliste fait de ce Genre d'Oiseaux trois Tribus ou Especes. Il donne à la premiere le nom de *Luscinia Curruca*, ce sont les *Rossignols* & les *Fauvettes*, connus sous ces deux noms; à la seconde le nom de *Trochlodyta*, ce sont les *Roitelets*; à la troisiéme le nom de *Sylvia*, ce sont les *Rouge-Gorges*, *Rouge-Queues*, qui ne font leur séjour que dans les Bois.

## TRIBU PREMIERE.

### *ROSSIGNOLS, FAUVETTES, BECFIGUES, &c. sous le nom de LUSCINIA CURRUCA.*

1. ROSSIGNOL, *Luscinia simpliciter*, *Luscinia major & minor* de Schwenkfeld; Φιλομηλη en Grec, *Acredula* Cic. Ανδων, parceque cet Oiseau se plaît à chanter dans les bocages. En Anglois *The Nightingale* par Willughby & Albin *Tom. 3. n. 53.* Frisch donne deux Especes de *Rossignols*, l'une, qui est plus rouge; & l'autre, qui l'est moins. Cet Oiseau chante la nuit. Olina le nomme en Italien *Rossignuolo*. Il fait son nid dans l'herbe, dit-il. M. LINNÆUS le met dans le Genre des *Motacilla*, *Hoche-queue*, & le nomme *Motacilla russo-cinerea*, *genuum annulis cinereis*. Pour M. KLEIN il a retenu les noms anciens donnés à cet Oiseau.

2. BECFIGUE ordinaire d'Olina *p. 11. Beccafico ordinario*; en Latin *Luscinia altera*; *Curruca vera canora*; *Curruca cantu Luscinia* par Frisch. Ce peut être la *Ficedula septima* d'Aldrovande, ou la quatriéme de Willughby. On confond assez communément ensemble ces Oiseaux & plusieurs autres. M. KLEIN en donne la figure §. XXXIII.

3. BECFIGUE qui se retire dans le Chanvre. En Latin *Luscinia fusca*, Oiseau qui imite le chant du *Rossignol*; en Italien par Olina *p. 11. Beccafico cannapino*. Il a le

chant aigu. M. LINNÆUS nomme le vrai *Curruca*, *Motacilla supra fusca, subtus ex albida, macula pone oculos grisea;* & la *Ficedula septima* d'Aldrovande; *Motacilla virescens cinerea, artubus fuscis, subtus flavescens abdomine albido.* Le vrai *Curruca* est la *Fauvette.*

4. OISEAU de Fange, selon les Anglois, ou la *Salicaria* de Gesner; en Anglois *Sedge-bird*, selon Albin *Tom. 3. n. 60.*

5. PRENEUR de Mouches noirâtre de Catesby *p.* 53. *Luscinia nigricans*, *Muscipeta nigrescens*; en Anglois *The black cap Fly catcher.*

6. PRENEUR de Mouches aux yeux rouges. *Luscinia muscicapa oculis rubris;* en Anglois *The red ey'd Fly catcher.* Catesby *p.* 54.

7. PRENEUR de Mouches brun. *Luscinia muscicapa fusca*; en Anglois *The little brown Fly catcher.* Catesby *p.* 54.

8. MESANGE au croupion jaune. *Luscinia uropygio luteo*; *Parus uropygio luteo*; en Anglois *The yellow Rump.* Catesby *p.* 59.

9. MESANGE de Bahama. *Luscinia pectore flavo*; *Parus Bahamensis*; en Anglois *The Baham Titmouse.*

10. ROSSIGNOL brun & jaune de Rai & de Sloane 307. *t.* 259. en Latin *Luscinia seu Philomela e fusco & luteo varia.*

11. PRENEUR de Mouches brun & blanc de Sloane *p.* 309. *t.* 265. *Luscinia, quæ Muscicapa ex fusco & albo varia p.* 309. *t.* 265. en Anglois *The Small black and white bird*, selon Rai *p.* 186. Il y a sur la Côte de Malabar & de Coromandel des *Rossignols* qui ont des bandes noires. Cet Oiseau est une espece de *Rossignol.*

12. ROSSIGNOL aux ailes variées, *Luscinia alis variegatis*; *Ficedula variegata albo nigra*; qui peut être la *Ficedula tertia* d'Aldrovande, & peutêtre la *Motacilla nigricans, superciliis albis, maculâ alarum albâ, gulâ flavescente* de M. LINNÆUS; en Anglois, selon Edouard, *p.* 30. *The cold Finch*; mâle & femelle.

13. JACAPANI de Marcgrave. *Luscinia pullo-lutea*; *Muscicapa ex fusco & luteo variâ*; en Anglois *The*

*small yellow and brown Bird.* Sloane *t.* 265. Rai *p.* 86.

14. PRENEUR de Mouches d'un brun pâle. *Luscinia Muscicapa, pallidè fusca.* Rai & Sloane *p.* 310. en parlent.

15. ROSSIGNOL bleu & rouge d'Edouard *p.* 22. *Luscinia ex cæruleo & rubro varia*; en Anglois *The red belly'd blue bird.*

16. ARLEQUIN, *Luscinia diversicolor*. ou *Preneur de Mouches*, bleu, cendré, brun & jaune, selon Rai & Sloane *p* 310.

16. ROSSIGNOL de Bengale d'Edouard *II. p.* 79. en Latin *Luscinia Bengalensis*; en Anglois *The green Indian Fly Catcher.*

## TRIBU II.

*ROITELETS, Reguli*, petits Oiseaux connus en Europe; dont le corps est court & gros, d'où leur est venu le nom de *Trochlodytes.*

1. ROITELET ordinaire, *Trochlodytes simpliciter*; *Passer Trochlodytes* d'Aldrovande, de Belon & de Turnerus; *Regulus* par Willughby; en Anglois *The commom Wren*, selon Albin *Tom.* 1. *n.* 53. nommé par M. LINNÆUS *Motacilla grisea, alis nigro cæruleoque undulatis.* C'est cet Oiseau sur lequel on débite une Fable; que l'*Aigle* le porte sur sa queue, & l'éleve jusque proche du Soleil.

2. ROITELET non hupé, *Trochilus capite lævi, Regulus non cristatus*, selon Aldrovrande & Willughby; nommé par M. LINNÆUS *Motacilla cinereo-virescens, subtus flavescens, superciliis luteis.* Cet Oiseau est un peu plus grand que le suivant, & plus petit que le précédent. C'est lui qui est proprement nommé *Roitelet.*

3. ROITELET hupé, *Trochilus* d'Aristote & de Pline. *Regulus cristatus* d'Aldrovande. En Italien *Fior ramio*, c'est-à-dire, fleur de souci, à cause de la couleur de sa hupe: en Anglois *The crested Wren*, selon Albin *Tom.* 1. *n.* 53. nommé par M. LINNÆUS *Motacilla*

*remigibus secundariis exteriore margine flavis, medio nigris.* Catesby *append. p.* 13. parle du *Roitelet huppé.*

## TRIBU III.

*ROUGE-GORGE*, & autres petits Oiseaux qui ont la poitrine allongée & fourchue, & l'estomac laineux, ou comme une espece de bande ou de ceinture de différentes couleurs.

1. ROUGE-GORGE, *Sylvia sylvatica; Rubecula*, selon Schwenkfeld & Frisch. *Petti rosso* en Italien par Olina *p.* 16. nommé par M. LINNÆUS *Motacilla grisea, gulâ pectoreque fulvis.* Cet Oiseau fréquente les bois, les jardins, les maisons mêmes, en y entrant par les fenêtres, & y cherche des *Mouches.* Albin *Tom.* 1. *n.* 5. en donne la description & la figure.

2. ROSSIGNOL de muraille, ou *Rouge-queue*, selon Albin *Tom.* 1. *n.* 50. *Sylvia Rutticilla, Rubicellus, Rubecula domestica, Luscinia murorum;* par Schwenkfeld *Rubecula;* par Frisch *Rubecula nigra;* par M. LINNÆUS *Motacilla gulâ nigrâ, abdomine rufo, capite dorsoque cano.* En Italien par Olina *p.* 47 *Codi rosse maggiore e minore.* Le *Rossignol* de l'Amérique d'Edouard *II. p.* 80. *American Redstart;* le *Rossignol de murailles* de Catesby *p.* 61. *Rusticilla Americana* ne sont que des varietés.

3. GORGE-BLEUE, Oiseau dont le haut du gosier est bleu. *Sylvia gulâ caruleâ.*

I. A poitrine rouge, *pectore rubro, Rubicilla major; Saxatilis, Rubecula Saxatilis, Merula solitaria carulea,* selon Schwenkfeld; *Petrocossutus* de Belon; *Caruleus* de Pline; & *Passer solitarius* d'Aldrovande.

II. QUEUE ROUGE à estomac variée de blanc, *thorace ex albo variegato. Phœnicorus*, selon Frisch.

III. ROUGE-GORGE bleue de l'Amérique, *Rubecula Americana carulea. The blue bird.* Catesby *p.* 47. *ventre rubro.*

IV. ROUGE-QUEUE à gosier plombé, *Gulâ plumbeâ;*

nommée par Albin *Tom.* 3. *n.* 59. *Rouge queue noirâtre ; The hodge Sparrow* en Anglois.

4. ROUGE QUEUE *Sylvia griseâ thorace longo, caudâ totâ rubrâ.* Frisch.

5. ROUGE QUEUE à gosier gris. *Sylvia gulâ griseâ fimbriatâ*, de Frisch.

6. BERGERONETTE, *Sylvia pectore nigro ;* selon M. LINNÆUS *Motacilla pectore nigro ;* par Olina *p.* 43. *Balterina ò sia Crutettola* en Italien. *Motacilla alba*, Κελλυρος en Grec ; *Cnipologus* selon Aristote. *Albicilla caudâ tremulâ.* En Anglois *Water wag tail.* Albin *Tom.* 1. *n.* 49.

7. BERGERONETTE jaune, *Sylvia flava ; Motacilla minor flava ; Florus ; Boarula* d'Aristote, parceque cet Oiseau suit le bétail dans les champs ; nommée par M. LINNÆUS *Motacilla pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus exterioribus dimidiato-oblique albis.* En Anglois *The Cock and Hen yellow, Water wag tail.* Albin *Tom.* 2. *n.* 58.

8. BERGERONETTE, ou *Mesange* à longue queue, d'Albin *Tom.* 2. *n.* 57. *Sylvia lutea capite nigro ; Culicilega flava, Muscipeta secunda* de Schwenkfeld ; *Rubetra* par Frisch ; en Anglois *Stone chatter ;* nommée par M. LINNÆUS, *Motacilla nigricans, superciliis albis, maculâ alarum albâ, gulâ flavescente.*

9. CUL BLANC, *Sylvia buccis nigris ;* Œnanthe seu *Vitiflora* de Willughby ; en Anglois *Wheat-ear.* Albin *Tom.* 1. *n.* 55. parle du mâle & de la femelle *n.* 54. par M. LINNÆUS *Motacilla dorso cano, fronte albo, oculorum regionibus nigris.*

10. OISEAU à poitrine argentée. *Sylvia thorace argenteo.* Frisch. Il y en a une autre du même qui n'est qu'une varieté.

11. PETRONELLE des Italiens. *Sylvia Petrarum. Petronella ;* Πετροφιλος *Saxicola.* Ce peut être la *Straparola* d'Aldrovande ; le *Curruca major altera* de Frisch. *t.* 22. Espece de *Fauvette* qui fréquente les rochers dans les lieux déserts.

12. GRISOLE d'Aldrovande, *Sylvia pestilentialis*, ainsi

nommée parcequ'on croit qu'il s'en trouve en grande quantité dans les jardins quand il regne des maladies peſtilentielles. C'eſt la *Muſcipeta quarta* de Roiſel *p.* 87. de Jonſton *p.* 122. & peutetre la troiſiéme eſpece de *Cul-blanc* de Willughby.

13. FAUVETTE brune ou *Prunelle* de Jonſton *Tab.* 36. *Sylvia rectricibus alarum maculâ albâ. Curruca fuſca albâ maculâ in alis* de Friſch. M. KLEIN ne ſait ſi cet Oiſeau eſt la *Motacilla teſtacea, ſubtus cinerea, pileo obſcuro*, ou la *Motacilla ſupra cinerea, infra alba, rectrice prima longitudinaliter dimidiata alba* de M. LINNÆUS. Peutètre que l'un & l'autre ſont le ſuivant.

14. FAUVETTE à ſommet noir, *Sylvia atricapilla*; Μελανοκεφάλος d'Ariſtote; *Atricapilla*; *Ficedula* de Belon & de Schwenkfeld, du Genre des *Roſſignols*, nommée *Capinera* par Olina *p.* 9. la *Rouge-queue* de Bengale d'Albin *Tom.* 3. *n.* 56. *The Bengal Reſtart*, & le *Curruca atricapilla* de Friſch ſont le même Oiſeau.

15. Albin *Tom.* 2. *n.* 59. nomme *Roitelets non hupés* deux Oiſeaux, qui, ſelon M. KLEIN, ne ſont pas des *Roitelets*, mais des eſpeces de *Ficedula*. Il nomme *Sylvia vertice ſubrubro*, un Oiſeau dont parle Friſch. C'eſt la *Fauvette à ſommet rougeâtre.*

16. ROUGE-GORGE verte, *Sylvia gulâ phœniceâ. Rubecula viridis elegantiſſima*; en Anglois *The green Sparrow, green humming Bird*, ſelon Rai & Sloane *t.* 263.

17. Petit Oiſeau de l'Amérique de différentes couleurs, *Avicula Americana variis coloribus picta*, Seba *II. p.* 5. *t.* 3. *n.* 3. nommé par M. KLEIN *Sylvia verſicolor.*

18. Autre petit Oiſeau de l'Amérique du même Seba *II. t.* 3. *n.* 4. dont la tête eſt noire, le bec blanc, la poitrine & le ventre bleu-azur, le dos d'un verd de *Perroquet*, & les ailes de couleur d'herbe. *Sylvia Avicula Americana altera.*

19. CARDINAL, petit Oiſeau qui chante, rouge par tout le corps, verd, jaune, pourpré, & autres couleurs. *Sylvia verſicolor.* C'eſt un très-bel Oiſeau, dont parle Seba *II. p.* 8. *t.* 7. *n.* 2.

20. TA TAC, petit Oiſeau rouge à bec plus long, de la Nouvelle Eſpagne. Il eſt de la grandeur d'un *Moineau. Sylvia rubra roſtro longiori.* Seba *II. p.* 74. *t.* 70. *n.* 8.

21. Autre petit Oiſeau à poitrine rouge, dont le deſſus du corps & de la queue ſont bleus. *Sylvia thorace rubro, ſupero corpore & caudâ cæruleis*; en Anglois *The blue Red-breaſt.* Edouard 1. *p.* 24.

22. ROUGE-GORGE d'Edouard *p.* 25. verte & à tête noire. *Sylvia viridis, capite nigro.*

PRENEUR de Mouches verd & à tête noire d'Edouard *p.* 25. *Sylvia viridis, capite cyaneo.*

24. ROUGE-QUEUE d'Edouard à goſier blanc. *Sylvia ſeu Rutticilla gutture albo, zonâ cæruleâ, fimbriatâ.*

25. ROUGE-QUEUE griſe & à goſier noir. *Sylvia ſeu Rutticilla corpore griſeo, gutture nigro.*

26. CUL-BLANC d'Edouard *p.* 31. de couleur noirâtre. *Sylvia ſeu Nigricilla gutture nigro, nigriſque alis, corpore aruginoſo.*

27. CUL BLANC; nommé *Sylvia inferne ex albo cinerea, ſuperne ex terreo colore cinareſcens, genis albis, alis fuſco & albo variis, roſtro pedibuſque nigricantibus*; en Anglois par Edouard *II. p.* 78. *The leſſer Mock-Bird.*

Le *Mock-Bird* de Cateſby eſt une *Grive*; mais celui-ci, dont Edouard parle, eſt du Genre des *Sylvia.*

## GENRE VIII.

### *HIRONDELLES*, miſes par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Paſſeres.*

Ce Genre d'Oiſeaux, vû la figure de la tête, a le bec court & menu, comme membranacé, large à ſa racine, finiſſant en pointe, l'ouverture très-grande, de façon que ces Oiſeaux ont la facilité de prendre en l'air, ſur terre, ou ſur l'eau, & contre les murailles, les Inſectes qu'ils aperçoivent. Ils ont les pieds courts, mais les ongles pointus, qui leur ſervent à s'attacher; ce qui leur fait donner le nom d'*Hirundo*,

du verbe *hærere*. Leurs ailes ſont longues. Voilà les marques auxquelles on connoît les *Hirondelles*. M. KLEIN les diviſe en *Hirondelles* qui ont la queue égale, & en *Hirondelles* qui ont la queue fourchue ; c'eſt-à-dire, que les plumes du milieu de la queue de cette ſeconde Tribu, ſont plus courtes que celles des deux côtés.

## TRIBU PREMIERE.

*HIRONDELLES* à queue égale, *caudâ æquabili.*

1. FRESAYE ou EFFRAYE, Oiſeau nocturne. *Hirundo Caprimulga, Caprimulgus ſimpliciter, Strix* de Schwenkfeld *p.* 232. 353. en Anglois *Goat ſucking Owl*, ou *Night Jarr* par Charleton 8. nommée par M. LINNÆUS *Hirundo caudâ integrâ, ore ſetis ciliato.* En Ruſſie *Leleck.* C'eſt un Oiſeau nocturne irrégulier, de la couleur du *Coucou*, dont l'ouverture du bec eſt comme celle de l'*Hirondelle Apus.* M. KLEIN. dit en avoir tué pluſieurs qui erroient çà & là ſoir & matin. Il en eſt parlé dans le *Catalog. des Oiſ. de Peterſbourg p.* 363. Cet Oiſeau ſe nourrit de grands & petits Inſectes. M. LINNÆUS en donne une fort bonne deſcription. La *Freſaye* de la Caroline de Cateſby reſſemble à la nôtre, avec cette différence, qu'elle a au col & ſur les ailes des taches jaunes, & une grande tache blanche ſur les plumes des ailes les plus courtes, & la queue plus longue que celle d'Europe. Edouard *II. p.* 63. parle d'une autre *Freſaye*, & Cateſby *Append. p.* 16. d'une petite *Freſaye* de l'Amérique.

2. FRESAYE de la Jamaïque, *Hirundo Jamaïcenſis, naribus conſpicilia mentientibus. Caprimulgus ſeu Noctua Sylvatica Jamaïcenſis minor* ; en Anglois, ſelon Rai, *The Small-Wood-Owl. Noctua minor ex pallido & fuſco varia.* Sloane *II. p.* 298. *t.* 255. Cet Oiſeau n'a rien de commun avec les Oiſeaux de nuit.

3. Autre eſpece de *Freſaye*, qui eſt le *Guiraquera* de Marcgrave. *Hirundo Caprimulgi ſpecies.* Rai.

4. HIRONDELLE de Mer des Hollandois, qui ſem

l'ambre, *Hirundo marina Batavorum.* Sloane *I. p.* 102. *t.* 66. *n.* 4. *Hirundo ambram griseam redolens.*

## TRIBU II.

*HIRONDELLES* à queue divisée, *caudâ divisâ.*

1. HIRONDELLE domestique, *Hirundo domestica*; *Hirundo urbica*, *Hirundo secunda* de Schwenkfeld. Albin *Tom.* 2. *n.* 56 en donne la description & la figure. M. LINNÆUS la nomme *Hirundo rectricibus; excepto pari intimo, albâ maculâ notatis.* Cette *Hirondelle* fait son nid dans les cheminées.

2. HIRONDELLE rustique, qu'on peut aussi appeller *Hirondelle de fenêtre. Hirundo rustica*; *Hirondelle* premiere de Schwenkfeld; *Argatylis*; *Martinet* de Belon; en Italien *Spazzo camino*; nommée par M. LINNÆUS *Hirundo dorso nigro cærulescente, rectricibus immaculatis.* M. KLEIN dit avoir eu en 1747. une *Hirondelle* blanche de cette espece. Il est parlé d'une *Hirondelle* blanche dans les *Actes Literaires de Suede* 1731. *p.* 98. *fig.* 2.

3. HIRONDELLE de rivage, *Hirundo riparia*; Schwenkfeld, Aldrovande. Elle a un collier blanc. Willughby & Albin *II. n.* 96. en parlent. *Hirundo minor terrei coloris.* M. LINNÆUS l'appelle *Hirundo cinerea, gulâ abdomineque albis.*

4. Grande HIRONDELLE de muraille. *Hirundo muraria, saxatilis, sive spelunearis*, selon Schwenkfeld; *Apes, Apus*, selon Frisch. Par M. LINNÆUS, *Hirundo nigra tota, gulâ albicante.* Albin *Tom.* 2. *n.* 55. en donne la description.

I. HIRONDELLE de l'Amérique, nommée *Tapera*; *Hirundo Americana.* Rai *p.* 72. Oviedo, Marcgrave, du Tertre *p.* 259. Sloane p. 312 en parlent.

II. Grande HIRONDELLE du détroit de Gibraltar. *Hirundo maxima freti Herculei*; en Anglois *The Greatest Martin* ou *Swift*, Edouard *I. p.* 27. Voyez sur les *Hirondelles* M. KLEIN *Part. III. Prod. Avi.* & notre *Dictionnaire des Animaux* au mot HIRONDELLE.

5. HIRONDELLE qui par son chant imite celui de l'*Alouette*, *Hirundo cantu Alaudam referens*. Feuilée *III. p.* 267.

6. HIRONDELLE de l'Amérique, *Hirundo caudâ vel sexies divisa. Spazzo camino Americana fusca, gulâ albicante. Hirundo caudâ aculeatâ, Americana*; en Anglois *The American Swallow*. Catesby *Append. p.* 8.

7. HIRONDELLE de la Chine, *Hirundo Sinensis*. Les Chinois en mangent les nids. Bontius, Rai *p.* 72. Wormius *p.* 311. Uries *p.* 279. parlent de cet Oiseau.

## GENRE IX.

*MESANGES*, mises par M. LINNÆUS dans le Genre des *Aves Passeres*.

Ce Genre d'Oiseaux a le bec court, coupant, un peu fait en angle, les mâchoires égales & pointues.

1. Grande MÉSANGE, *Parus major*; *Fringillago* de Gaza, Schwenkfeld, & Willughby; *Spernuzzola* d'Olina *p.* 28. *Parus capite nigro, temporibus albis, nuchâ luteâ*, par M. LINNÆUS; en Anglois *The Ox-eye Titmouse*, selon Albin *Tom. I. n.* 46. qui en donne la description & la figure.

M. KLEIN ajoute à cet Oiseau un *Mésange Pinçon* de Catesby *p.* 64. *Parus Fringillarius*; en Anglois *The Finch-creeper*.

2. MÉSANGE de bois, *Parus sylvaticus*; *Parus minor atris tractibus*; *Parus ater*; *Parus carbonarius minor*, selon Schwenkfeld, Gesner & Willughby. Cet Oiseau n'est pas noir sous le ventre. M. LINNÆUS le nomme *Parus capite nigro, vertice albo, dorso cinereo, ventre albo*.

3. MÉSANGE nonette ou bleue. *Parus cæruleus*, Frisch. *Parus cæruleus montanus*, Schwenkfeld; par M. LINNÆUS, *Parus remigibus cæruleſcentibus, prima margine exteriore albâ, vertice cæruleo*. C'est la plus petite des *Mésanges*.

4. MÉSANGE brune, *Parus fuscus, cinereus, palustris, atricapillus*, selon Schwenkfeld & Frisch; nommé par M. LINNÆUS *Parus capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo.*

5. MÉSANGE au capuchon noir de Catesby. La même, dont parle Albin *Tom. III. n. 56. Parus cucullo nigro*; en Anglois *The hooded Titmouse.*

6. MÉSANGE huppée, *Parus cristatus* de Schwenkfeld & de Frisch; le *Parus cristatus* d'Albin *Tom. II. n. 57.* en Anglois *The crested Titmouse* est le même ou une varieté.

7. MÉSANGE à queue longue de Schwenkfeld & de Willughby, nommée par M. LINNÆUS *Parus vertice albo, caudâ corporeque longiore.* Il en donne la figure *Tabl. I. n. 243.* Cet Oiseau suspend son nid. Son bec est très-court, petit, brun, pointu, & verd.

8. MÉSANGE à barbe noire, *Moineau d'Inde*, ou le *Moustache*; *Parus barbâ nigrâ utrinque, ab oculis dependente. Passer barbatus Indicus*; en Anglois *The beard-Manica*, ou *bearded Titmouse*, selon Albin *Tom. I. n. 48.*

9. MÉSANGE à queue longue & à tête variée, *Parus caudatus capite vario*; en Anglois *The long tail'd Titmouse*, selon Albin *Tom. II. n. 57.*

10. MÉSANGE de Lithuanie, qui suspend son nid. *Parus Lithuanicus, nidum suspendens*; en Polonois *Remirz.* Rzaczynski *I.* 294. Cet Oiseau se trouve en Volhynie, à Sendomir, & en différens endroits de Lithuanie.

11. MÉSANGE jaune de la Caroline. *Parus luteus Carolinienſis*; en Anglois *The yellow Titmouse.*

12. MÉSANGE huppée de Catesby *p. 57. Parus cristatus, pectore rubro*; en Anglois *The crested Titmouse.* Ce peut être une varieté de celle du *n.* VI.

13. MÉSANGE dont la tête est de couleur d'or, le corps noir, le dos pourpré, & la queue courte; en Anglois *The golden headed black Titmouse.*, selon Edouard *I. p.* 21. Cet Oiseau est mis par l'Auteur parmi les *Alcyons.* M. KLEIN n'en fait pas la raison. Il dit qu'il a les doigts & les pieds faits comme ceux

des *Méſanges*. Albin *Tom. III. n.* 57. parle de deux petites *Méſanges*.

14. MÉSANGE de l'Amérique à gorge jaune. *Parus Americanus gutture luteo ;* en Anglois *The yellow throaded Creeper*, ſelon Cateſby *p.* 62.

15. MÉSANGE à figure de *Pic*, *Parus facie Pici ; Sitta capite nigro, & altera capite fuſco.* Le *The Nuthatch, and The ſmall Nuthatch*, & le *Caſſe-noiſette* de Cateſby *p.* 21. le *Picus ſubcæruleus*, *Sitta* d'Aldrovande, le *Sitta ſeu Picus cinereus*, le *Caſſe-noiſette* d'Albin *Tom. II. n.* 28. & en Allemand le *Spechtartige Meiſſe ; Blau Specht* de Schwenkfeld & de Friſch, ſont des varietés.

Parceque ces petits Oiſeaux montent dans les arbres, il y a des Naturaliſtes qui les rangent parmi les *Pics*. Le *Certhia* eſt auſſi mis mal à propos parmi les *Pics*. Les *Pics*, comme on l'a vû *Fam. III.* ont deux doigts devant & deux derriere. Le petit & le grand *Grimpereau*, *Sitta* & *Certhia*, ont trois doigts devant & un derriere ; & quoiqu'ils s'attachent aux arbres & aux branches, ils ne ſont pas pour cela des *Pics*. La *Sitta* eſt une grande eſpece de *Méſange*, car il n'a point la langue faite comme les *Pics*. Zornius *II. p.* 174. en donne une fort bonne deſcription.

## GENRE X.

Oiſeaux nommés *Paſſeres*, qui ont le bec large à la racine, diminuant peu à peu, coupant, & pointu. Ce Genre a la tête plus élevée que les autres petits Oiſeaux. On peut ſur ces petits Oiſeaux, qui ont le bec gros & fort, conſulter le *Catalog. Avi. Petrop. p.* 388. *& ſuiv.* M. KLEIN diviſe le Genre en cinq Tribus. La premiere contient les *Moineaux* & *Serins*, *Paſſeres ;* la ſeconde les *Ortolans*, *Emberizæ ;* la troiſiéme les *Linotes*, *Linariæ ;* la quatriéme les *Gros-Becs*, *Coccothrauſtes ;* la cinquiéme les *Pinçons* & *Chardonnerets*, *Fringillæ*. Ce Genre nombreux eſt mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Paſſeres*.

## TRIBU PREMIERE.

### *MOINEAUX.*

1. MOINEAU domeſtique. *Paſſer domeſticus*, ſelon Aldrovande, Schwenkfeld, Willughby, Friſch; nommé par M. LINNÆUS, *Fringilla remigibus rectricibuſque fuſcis, gulâ nigrâ, temporibus ferrugineis*; en Anglois ſelon Albin *Tom. I. n. 62. The Houſe Sparrow*; en Italien *Paſſera noſtrale*, ſelon Olina *p.* 42. Schwenkfeld dérive le mot *Paſſer* du verbe *pati*, ſouffrir, parceque cet Oiſeau eſt ſujet au mal caduc. C'eſt un Oiſeau très-connu, & dont tous les Naturaliſtes ont parlé. Il y a des *Moineaux blancs.*

2. MOINEAU d'arbre ou de Campagne, *Paſſer arboreus, montanus ferus, Paſſer ſylveſtris*, ſelon Schwenkfeld & Friſch; en Italien par Olina *p.* 46. *Paſſera Mattugia.* Le *Grimpereau* de Hambourg d'Albin *Tom.* 3. *n.* 24. *Hambourg Troe-Creeper* en eſt une varieté; en Latin *Hamburgienſis Certhia*; & le *Moineau* à tête rouge du même *Tom. III. n.* 6. en approche. Olina *p.* 48. parle d'un *Paſſera montanina*, ou *montanara*, de la grandeur d'un *Moineau domeſtique.* Il diſtingue ce *Moineau montain*, du *Moineau vulgaire* & d'*arbre*, *di Paſſera domeſtica, e compagnuola o ſi Sylvatica.* Le *Moineau d'arbre* n'oſe ſe mêler avec le *Moineau domeſtique.* Il eſt plus petit. Il fait ſon nid dans les creux d'arbre. Son bec a de hauteur deux lignes & $\frac{3}{4}$, & de long trois lignes & $\frac{3}{4}$.

3. SERIN de Canarie. *Paſſer Canarius*, *avis Canaria*, *Luteola Canaria*; *Avicula Sacharina* ſelon Schwenkfeld & Willughby.; en Italien, ſelon Olina, *Il Canario o Paſſera di Canaria*; en Anglois *Canary Bird.* Albin *Tom. I. n.* 65. en donne la deſcription & la figure. Cet Oiſeau eſt venu en Europe des Iſles Canaries, & il eſt fort commun parmi nous. On l'éleve en cage, où il fait ſon nid. Il varie par les couleurs. Les *Chardonnerets* s'accouplent avec les *Serins* de Canarie; mais les petits qui en proviennent ne multi-

plient point. Ainſi le *Chardonneret* & le *Serin* conviennent enſemble, quoiqu'ils ne ſoient pas de la même Tribu ou de la même Eſpece, & ils en créent une troiſiéme. Mais nous n'aſſurons pas avec Friſch, & c'eſt le ſentiment de M. KLEIN, que des Animaux différents entr'eux, qui s'accouplent, faſſent des petits qui ſoient du même Genre. Géſner avance que deux Animaux de différente eſpece, peuvent produire un troiſiéme Genre d'Animal, & que la nature n'en differe pas beaucoup. Sans doute c'eſt comme le *Mulet*, qui provient d'un *Ane* & d'une *Cavale*, mais qui ne produit pas.

4. MOINEAU de Bengale, *Paſſer Bengalenſis*; en Anglois *The Bengale Sparrow*. Albin *Tom. II. n.* 52.

5. MOINEAU de la Chine à bec bleu. *Paſſer Sinenſis roſtro cæruleo.* Albin *Tom. II. n.* 53.

6. Autre MOINEAU de la Chine de couleur ferrugineuſe, *Paſſer Sinenſis ferrugineus*; en Anglois *The Chinenſe Sparrows* Albin *ibid.*

7. MOINEAU noir, aux yeux rouges. *Paſſer niger, oculis rubris, iride nigrâ*; en Anglois *The Towhe Bird.* La femelle eſt de couleur terreuſe. Cateſby *p.* 14. Ce peut être le *Paſſer niger punctis croceis ornatus* de Rai *p.* 187. en Anglois *The Black Sparrow*. Sloane *p.* 311.

8. MOINEAU de neige, *Paſſer nivalis, cervice albâ*; en Anglois *The Snowbird*. Cateſby *p.* 36.

9. MOINEAU de Bahama, *Paſſerculus bicolor Bahamenſis*; en Anglois *The Bahama Sparrow*. Cateſby *p.* 37.

10. Petit MOINEAU, *Paſſerculus ſimpliciter*; en Anglois *The little Sparrow*. Cateſby *p.* 35.

11. MOINEAU de Prés, *Paſſer pratorum*, qui eſt l'*Alauda pratorum minor, roſtro breviore*, de Sloane *p.* 306. *t.* 255. Mais comme il a le bec court, gros & pointu, ſelon Rai *p.* 188. ce n'eſt donc pas une *Alouette*, dit M. KLEIN.

12. MOINEAU bleu-brun de Rai *p.* 157. & de Sloane *p.* 311. *t.* 257. *Paſſer cæruleo fuſcus.*

13. MOINEAU approchant du *Serin*, *Paſſer Serino affinis.* Rai & Sloane *p.* 312. Il y a un autre *Moineau*

approchant du *Serin*, cendré, jaune & brun, dont parlent auſſi Rai & Sloane *p.* 311. & un des Indes d'Edouard *II.* 84. qui ſont des varietés.

14. MOINEAU hupé à bec rouge, *Paſſer criſtatus, roſtro rubro.* Le *Picitli* du Breſil. Seba *I. p.* 95. *t.* 59. *n.* 4. C'eſt un très-petit Oiſeau.

15. MOINEAU très-beau d'Afrique. *Paſſer Africanus eximius* de l'Iſle de St Euſtache. Seba *II. p.* 67. *t.* 65. *n.* 6.

16. MOINEAU hupé derriére la tête, dont la hupe eſt compoſée de plumes pendantes. C'eſt ſelon Seba *II. p.* 74. *t.* 70. *n.* 7. le *Coquantotolt* du Breſil. *Paſſer in occipite criſtatus, criſtâ plumaceâ dependente.* Petit Oiſeau hupé de la grandeur d'un *Moineau.*

17. MOINEAU noir avec une bande blanche, qui eſt le *Cacatotolt. Paſſer toto corpore niger, vittâ albâ.* Seba *II. p.* 102. *t.* 96. *n.* 5.

18. MOINEAU varié ou tacheté. *Paſſer varius maculatus;* en Anglois *The Gowry Bird.* Edouard *I. p.* 40. Ce peut être, dit M. KLEIN, la femelle du *Moineau* ſecond de la Chine d'Albin *Tom. II. n.* 53. Voyez ci-deſſus *n.* 5.

19. MOINEAU brun à tête noire, mâle & femelle. *Paſſer fuſcus, capite nigro, mas & fœmina;* en Anglois *The Chineſe Sparrow.* Edouard *p.* 43. Voyez *n.* 5.

20 Petit MOINEAU montain. *Paſſer montanus, minimus;* en Anglois *The montain Sparrow.* Albin *Tom. III. n.* 66.

21. MOINEAU du Cap de Bonne-Eſpérance. *Paſſer Capenſis;* en Anglois *Cape Sparrow.* Albin *Tom. III. n.* 67.

22. MOINEAU à queue très-longue & changeante. *Paſſer caudâ longiſſimâ & mutabili.* Edouard *II. p.* 86. qui le nomme en Anglois *The Red-breaſted long Taitled Finch.* Cet Oiſeau change tous les ans de couleur, & ſa queue longue en une courte, mais qui devient longue en peu de tems. Voyez l'*Auteur.*

TRIB.

## TRIBU II.

*ORTOLANS*, connus sous le nom *Emberiza.*

Ces Oiseaux ont le bec gros, la mâchoire supérieure inégale & serrée proche de la pointe, & élevée au milieu de cette pointe. Ce Genre d'Oiseau a une tumeur proche du palais, qui est remarquable, & une éminence ou petite tumeur dure sur la mandibule supérieure du bec. On estime ces Oiseaux à cause de la délicatesse de leur graisse. On peut consulter le *Catalogue des Oiseaux de Petersbourg pag.* 397.

1. ORTOLAN blanc. C'est l'*Emberiza alba* de Gesner; *Alaudæ congener* d'Aldrovande; *Miliaria cana* de Frisch; en François *Bruant grisâtre; Strillozzo* d'Olina *p.* 44. Le grand *Ortolan* d'Albin *Tom. III. n.* 50. *Hortulanus maximus*, dont le bec est noir, long de cinq lignes, est une varieté de l'*Emberiza alba.*

2. ORTOLAN qui s'engraisse de mil. *Emberiza miliara pingueſcens* de Frisch; *Cenchrumus Avis miliaria*; *Ortolano* en Italien, d'Olina *p.* 22. C'est le *Traquet* d'Albin *Tom. II. n.* 50. qu'il nomme en Anglois *The Bunting*, Oiseau très commun en Lombardie. On en fait beaucoup de cas pour la table.

3. ORTOLAN nommé *Emberiza* ou *Cirolus* par Aldrovande. *Primum genus Luteolæ* du même; nommé *Zivola* par Olina *p.* 56. de son cri *zi zi*, que les autres especes d'*Ortolans* prononcent aussi. Willughby *p.* 196. parle de cette espece d'*Ortolan*. Frisch l'a nommé en Allemand *Fettammer.*

4. ORTOLAN varié, qu'Albin nomme *Tom. III. n.* 71. *petit Pinçon-Pie* des Montagnes. C'est l'*Emberiza varia*; *le Passer hybernus*, *Avis peregrina* de Gesner & de Schwenkfeld; le *Miliaria nivis* de Frisch. On trouve dans cet Auteur une fort bonne figure de cet Oiseau, qui a le bec haut de trois lignes, & long de quatre lignes $\frac{1}{2}$. M. KLEIN met le *Miliaria nivis* de Frisch, en François *Bruant de neige*, avec l'*Emberiza varia.* Ne

seroit-il point plutôt le même que l'*Emberiza alba?* C'est ce que l'on peut croire suivant la couleur du plumage.

Uriés dans ses *Notes sur le voyage de* Martens *p.* 230. parle de cet Oiseau. M. KLEIN en parle encore (*Part.* 3. *Prodrom. Avi.*) M. LINNÆUS dans les *Actes Littéraires de Suede* 1736. *p.* 107. l'appelle *Passer Laponicus*, ou *nivalis*, Il le nomme (*Faun. Suec. n.* 194.) *Alauda remigibus albis, primoribus extrorsum nigris, lateralibus tribus albis, Miliara ex albo & cano varia.* A la fin du même Ouvrage *Tab. I. n.* 194. il en donne la figure. Selon Frisch, cet Oiseau change de couleur.

5. BRUANT ou ORTOLAN jaune. *Emberiza flava* de Gesner; *Chloreus* ou *Lutea* d'Aristote; *Hortulanus* de Belon; *Luteæ alterum genus* d'Aldrovande; *Anthus seu Florus*, *Lagopus crocea*; en Anglois *The yellow Hammer*, selon Willughby; en Allemand, selon Schwenkfeld, *Gelbling*; selon Frisch, *Æmmerling.* Cet Oiseau a le bec haut de deux lignes $\frac{1}{2}$, & long de quatre.

6. ORTOLAN de la Caroline, ou *Oiseau de Ris* de Catesby *p.* 14. *Emberiza Carolinienſis*; en Anglois *The Rice-Bird.*

7. ORTOLAN d'Amboïne, nommé *Calatti*, fort bel Oiseau. *Emberiza Amboïnenſis.* Il est un peu plus grand que l'*Alouette*, & c'est un Oiseau chantant. Seba *I. p.* 63. *t.* 38. *n.* 6.

8. ORTOLAN du Mexique, de la grandeur d'un *Moineau. Emberiza Mexicana magnitudine Passeris.* Seba *I. p.* 94. *t.* 59. *n.* 3. C'est un Oiseau docile, qui imite la voix de l'*Homme.*

9. ORTOLAN jaune du Mexique. *Emberiza flava Mexicana. Lutea Mexicana*, selon Edouard *p.* 44. en Anglois *The yellow-headed Linnet.*

10. ORTOLAN à tête noire. *Emberiza capite nigro, luteis maculis vario.* C'est le *grand Pinçon de montagne*, d'Albin *Tom. III. n.* 63. qu'il nomme en Latin *Monti-fringilla major*; en Anglois *The greater Bramling.*

Le petit *Pinçon de Montagne* d'Albin *Tom. III. n.* 64. *minor Bramling*, en eſt un varieté. Voyez la deſcription qu'il en donne, ou l'extrait qu'en fait M. KLEIN, *Ord. avi. pag.* 92. *n.* 10.

## TRIBU III.

*LINOTS.* Le Dictionnaire de Trevoux dit *Linote.*

Ces Oiſeaux ont le bec très-court, en forme de cone, les bords coupans, le bout très-pointu, & les pieds très-courts.

1. LINOT ſimple, ou grand LINOT rouge. *Linaria ſimpliciter ; rubra major.* Cet Oiſeau eſt doux & s'apprivoiſe. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt celui que M. LINNÆUS nomme *Fringilla remigibus, rectricibuſque fuſcis, margine obſeletè pallido, liturâ alarum albidâ*, ou celui que le même Naturaliſte nomme *Fringilla remigibus nigris, primoribus margine utroque albis, rectricibus nigris utroque margine albis.* C'eſt un Oiſeau très-connu. Albin le nomme en Anglois, *Red-Linner Cock.* Mais la figure qu'il en donne *Tom. III. n.* 72. ne répond pas à la deſcription qu'il en fait.

2. LINOT de Montagne, ou LINOT ſauvage ; en Latin *Linaria fera, Saxatilis*, ſelon Schwenkfeld. *Linaria montana* ; en Anglois *The mountain Linner* par Willughby. Ce peut être l'Oiſeau qu'Olina *p.* 8. nomme *Fanello dell' Aquila* ; en Allemand, ſelon Friſch, *Stein-Henffling ; Der-Henfling ;* & *Hraver Henffling.* Cet Oiſeau n'a point de rouge à la poitrine, mais il chante auſſi-bien que le précédent, & on l'inſtruit auſſi à ſiffler. M. KLEIN même croit qu'il chante mieux. Bruckmann, au ſujet des Oiſeaux d'Allemagne, veut prouver qu'il n'y a qu'une eſpece de *Linot.* La premiere a la poitrine rouge, ou de couleur d'écarlate. La ſeconde n'a aucune de ces marques, & elle eſt connue en Allemagne comme en France.

3. Petit LINOT rouge. *Linaria rubra minor* ; en Anglois, ſelon Willughby, *The leſſer red-headed Linner.*

Ce peut être celui que M. LINNÆUS nomme *Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, margine obsoletè pallido*; nommé *Rohtplattiger Henfling Zitzcherlein*, en Allemand, selon Frisch; *Tschetzke* en Prusse. Cet Oiseau a sous le bec une espece de barbe noire. Il est beaucoup plus petit que les précédens. C'est l'Oiseau à *tête rouge* d'Albin *Tom. III. n.* 75: qu'il nomme en Anglois *The Red-pole*. M. KLEIN au commencement du Printems de 1746. blessa légerement d'un coup de fusil un *Linot* de cette espece & un *Chardonneret*: il mit ces deux Oiseaux dans une cage, où ils vécurent jusqu'au mois d'Octobre de la même année. Il a remarqué que le premier perdit entierement sa couleur rouge & la noirceur de sa barbe, & l'autre sa couleur rouge & de citron. C'est aussi une expérience que j'ai faite dans ma jeunesse. Et même les petits des *Linots* rouges qu'on éleve en cage, ne le deviennent jamais. Cela doit s'entendre des mâles; car les femelles n'ont point de marques rouges à la poitrine.

4. LINOT à poitrine jaunâtre. *Linaria pectore subluteo, rostro flavicante.*

5. LINOT jaune & noir. *Linaria seu Luteola nigra.* Il n'est jaune que sur la tête.

6. LINOT vert. *Linaria viridis* de Frisch. *Luteola Germanica citrina*; *Zisela. Zeitzgen* en Allemand, Schwenkfeld; *Vercellina* par Olina, & peutêtre celui qu'il nomme *Lucarino p.* 17. *Citrinella* par Willughby. *Acanthis; Spinus; Ligurinus*, par Gaza. C'est un Oiseau très-connu, qu'Albin *Tom. III. n.* 76. nomme *Verdier* en François; en Anglois *The Aberduvine* ou *Sisslin*. C'est notre *Tarin*.

7. LINOT du Mexique, mâle & femelle, nommé *Chichiltotolt*; en Latin *Linaria Mexicana.* Seba *I. p.* 96. *t.* 60. *n.* 7. 8.

8. LINOT à queue longue du Bresil. *Linaria caudâ longâ. Fringilla Brasilienſis.* Seba *I. p.* 103. *t.* 66. *n.* 5.

## TRIBU IV.

### *GROS-BECS.*

Ces Oiſeaux ont le bec fort gros, en forme de ſabot.

1. GROS-BEC ordinaire. *Coccothrauſtes ſimpliciter. Ligurius major; Cinclus; Enucleator*, ſelon Schwenkfeld & Friſch; *Coccothrauſtes vulgaris*, ſelon Geſner & Aldrovande; *Froſolone* par Olina *p.* 37. nommé *Loxia, lineâ alarum duplici albâ* par M. LINNÆUS; en Anglois *The Groſbeck* ou *Haw-finch*, ſelon Willughby & Albin *Tom. I. n.* 56. Cet Oiſeau a le bec haut à ſa racine de huit lignes $\frac{1}{2}$, long de trois lignes $\frac{3}{4}$, la queue longue de deux pouces, & les pieds hauts de neuf lignes.

2. GROS-BEC de Gamboa. *Coccauthrauſtes citreâ tota, capite nigro*; en Anglois *The Gamboa Groſbeack*, Albin *Tom. III. n.* 62. Cet Oiſeau a le bec & les pieds bleus, la tête & le col de la couleur du *Corbeau*, à la poitrine un croiſſant, qui vient finir ſur le dos; du reſte il eſt couleur du citron.

3. GROS-BEC hupé des Indes. *Coccothrauſtes Indica criſtata*, Aldrovande; *Enucleator Indicus*; *Luſcinia Virginiana*; *Coccothrauſtes criſtatus*, Friſch; nommé le *rouge Gros-bec*, ou *Roſſignol* de Virginie; en Anglois *The red Great-beack of Virginia* par Albin *Tom. I. n.* 53. *Coccauthrauſtes ruber*; le *Cardinal*, par Cateſby *p.* 38. en Anglois *The red Bird*; par Willughby *The Virginian Nichtingale*; en Allemand *Rohte Steinbeiſſer*; *Indianſcher hauben-finck.*

Seba *I. p.* 96. *t.* 60. *n.* 4. appelle cet Oiſeau *Perroquet hupé rouge, petit.* Albin *Tom. III. n.* 61. donne la figure & la deſcription de la femelle de cet Oiſeau; & on dit qu'elle chante auſſi-bien que le mâle; ce qui paroît ſurprenant à M. KLEIN.

4. GROS-BEC verd. *Coccothrauſtes viridis*; *Chloris*; *Linaria*; *Fringilla viridis*, Aldrovande, Willughby. Albin *Tom. I. n.* 58. le nomme en François *Verdier*;

en Anglois *The Green Finch* ; en Italien *Verdone* par Olina *p.* 26. nommé par M. LINNÆUS *Fringilla remigibus primoribus antice luteis, rectricibus tribus lateralibus in basi luteis.* Il a bien des noms en Allemand. Voyez Frisch & Schwenkfeld. Son bec est haut de cinq lignes, long de six, & d'un verd jaune. C'est aussi le *Verdier* de Belon, qu'on nomme *Serrant* dans le Maine, dit-il. On a vu plus haut qu'Albin donne aussi le nom de *Verdier* au *Tarin*, Oiseau de la Tribu des *Linots*, au lieu que celui-ci est du rang des *Gros-becs.*

5. GROS-BEC de couleur sanguine. *Coccothraustes sanguinea ; Rubicilla ; Fringilla sanguinea*, selon Schwenkfeld & Frisch ; *Pyrrhola*, selon Aldrovande ; *Ciafolotto* par Olina *p.* 40. *Albicilla* par Willughby ; en Anglois *Bulfinch*, *Alp* ou *Nope*, par Willughby ; *Albicilla*, Albin *I. n.* 59. femelle *n.* 60. Cet Auteur en donne la description & la figure. C'est notre *Bouvreuil* ou *Pivoine.* Son bec a trois lignes de haut, & cinq de long.

6. GROS-BEC noir, nommé par Catesby *p.* 68. *petit Rouge-gute noir. Coccothraustes nigra, Rubicilla minor nigra ;* En Anglois *The little black Bulfinch.* C'est le *Mariposa nigra* des Espagnols. Il est de la grandeur du *Serin* de Canarie, un peu blanc aux ailes.

7. GROS-BEC bleu de Catesby *p.* 39. *Coccothraustes cærulea ;* en Anglois *The blew Gross Beack.*

8. GROS-BEC aux ailes noires. *Coccothraustes alis nigris.* Seba *I. p.* 101. *t.* 65. *n.* 1. C'est un Oiseau rouge du Mexique, qui n'est pas une espece de *Moineau*, comme le dit Seba. Il a la tête, la poitrine & le dos, couleur de sang ; les grandes plumes des ailes & la queue noires, imbues de rouge.

9. GROS-BEC pourpre ou violet. *Coccothraustes purpurea ;* en Anglois *The purple Grosbeack.* Catesby *p.* 40. C'est, je pense, celui qu'on nomme *Evêque.*

10. GROS-BEC bleu azur. *Coccothraustes, Phœnicori species ;* Oiseau de l'Amérique nommé *Rubicilla* par Seba, *p.* 160. *t.* 102. *n.* 3. *Americanscher Thum-herr* en Allemand. Il a le bec blanc & la tête noire ; proche la

poitrine au col des taches noires ; la poitrine & le ventre bleu azur ; les ailes, la queue & le dos pourprés.

11. GROS-BEC noirâtre, ſelon Albin *Tom. III. n. 69. Rouge-queue noirâtre. Coccothrauſtes atricilla* ; en Anglois *The Bulfinch.* Il eſt tout noir ; les pointes des grandes plumes des ailes ſont blanches, & la poitrine ornée de grains d'or luiſans.

12. GROS-BEC bleuâtre, mâle & femelle, qui eſt l'*Oryzevora* ; en Latin *Coccothrauſtes cæruleſcens*, Edouard *p.* 41. & 42. en Anglois *Padda* ou *Rice Bird.* C'eſt un Oiſeau de l'Iſle de Java. Les Allemands le nomment *Reis-Meher.* Le mâle a le dos bleu, varié par écailles, la queue noire, le tronc du corps par en bas couleur de chair, la tête noire, les joues blanches, le bec rouge & fort.

13. GROS-BEC ou BEC CROISÉ. *Loxia.* En Grec Λοξια par Faber, Geſner, Aldrovande, Willughby, Schwenkfeld. En Latin *Avis crucifera, cruciata*, parcequ'il a le bec en forme de croix ; *Greeritz* en Allemand ; *Loxia*, ſelon Friſch ; *The Cro-ſſbill* en Anglois, ſelon Albin ; *The Croſſ-beack*, ou *Shell-apple*, ſelon Charleton *p.* 77. Albin *Tom. I. n.* 61. en donne la deſcription & la figure. Celle de Charleton eſt meilleure. Le bec de cet Oiſeau eſt par le bout diviſé en croix. Il a à ſa racine cinq lignes $\frac{2}{1}$ de haut, & juſqu'où il eſt partagé en croix ſix lignes $\frac{1}{3}$ de long. Son plumage eſt doré, jaune & citron, mais il change de couleur au moins trois fois l'année.

## TRIBU V.

### *PINÇONS & CHARDONNERETS.*

Ces Oiſeaux, dont M. KLEIN parle ſous le nom de *Fringilla*, ont le bec conique en forme de ſabot. *Trochi-forme*, ou *Roſtrum Trocho-conicum.* Dès ſa racine il va en diminuant, & devient un cone pointu. Ces Oiſeaux, comme les autres du même Genre, ont les bords du bec très-tranchans. Leurs mâchoires, faites en ligne droite, ſont égales & pointues.

1. PINÇON. *Fringilla ſimpliciter. Vinelia avis* par Albert le Grand. Par M. LINNÆUS, qui en donne la figure *Faun. Suec. n.* 199. *Tab. II. Fringilla artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus obliquè albis.* Olina *p.* 31. le nomme en Italien *Fringello*; Willughby en Anglois *The Chaffing.* M. KLEIN en Allemand *Buch-Finck.* Albin *Tom. I. n.* 63. en donne la deſcription & la figure. Schwenkfeld fait mention d'un *Pinçon blanc, albæ Fringillæ.*

2. PINÇON montain. *Fringilla hyberna, montana. Monti-fringilla*, ſelon Schwenkfeld & d'autres. Par M. LINNÆUS *Fringilla alarum baſi flaviſſimâ.* Il en donne la figure *Faun. Suec. n.* 198. *Tab. II.* Willughby le nomme en Anglois *The Bramlay*, ou *Bramling.* Olina en Italien *p.* 32. *Fringuello montano.* Il a le bec jaune, la pointe & le tranchant du bec noirs; à la tête & au dos les couleurs variées de l'*Etourneau*; les ailes brunes, variées de blanc & de jaune, la poitrine rouſſe & d'un jaune irrégulier.

3. PINÇON à tête blanche, & tache jaune à la poitrine. *Fringilla ſubcana maculâ luteâ in pectore*, Friſch. *Grau-Finck* en Allemand. Par M. LINNÆUS *Capite cucullo nigro tecto, inferiore mandibulâ luteſcente, ſuperiore cæruleſcente.*

4. PINÇON de Jupiter. *Fringilla Jovis.* C'eſt le *Chardonneret. Carduelis. Zena*, ſelon Schwenkfeld & Friſch. *Luteola* d'Albin *I.* 64. *Cardello*, Olina *pag.* 10. *The Goldfinch* en Anglois, Willughby. *Diſtel-Finck, Stieglitz, Rochtvogel*, en Allemand. *Chardonneret* en François. *The Canary Goldfinch* d'Albin *Tom. III. n.* 70. Le *Chardonneret* qui tient de l'*Hirondelle* & du *Serin* de Canarie, en eſt une varieté. Albin le nomme en Anglois *The Swallow Goldfinch.* Cet Oiſeau a la partie antérieure du corps noire. Mais c'eſt une fable que ce que dit Albin, ſavoir, que cet Oiſeau eſt engendré d'un mâle *Hirondelle*, & d'un *Chardonneret* femelle. Voyez le même Auteur ſur la deſcription du *Chardonneret. Tom. I. n.* 64.

5. CHARDONNERET de l'Amérique. *Fringilla, Car-*

*dùelis America*; en Allemand *Gelber Diſtel-Finck*; en Anglois *The American Goldfinch*, Cateſby *p.* 43. Il a le front & les environs des yeux noirs, les ailes de couleur de terre, les extremités des plumes de couleur de paille & en maniere de frange, la queue noire & fauve, le reſte fauve.

6. PINÇON de Bahama. *Fringilla Bahamenſis*; en Anglois *The Bahama Finch*. Il a une ligne blanche à ſa tête, noire au deſſous des yeux, le goſier noir, marqué d'une tache blanche, la poitrine dorée, le ventre blanc, le dos noir, les ailes & la queue bruns.

7. PINÇON de trois couleurs. *Fringilla tricolor*; en Anglois *The pointed Finch*; en Allemand *Blau-Kœpfiger*, *Diſtel-Finck*. Il a le bec gris, la tête & le col bleus azurs, la poitrine & le ventre couleur de feu, le dos & le deſſus des ailes fauve & verd, les grandes plumes des ailes & la queue rouges-pourprées.

8. LINOT bleu du Mexique. *Azul Lexos* au Mexique. *Fringilla cærulea*, *Linaria cærulea*; en Anglois *The blue Linner*; en Allemand *Blaver Diſtel-Finck*. M. KLEIN dit que cet Oiſeau n'eſt point une eſpece de *Linot*. Excepté les grandes plumes qu'il nomme *rectrices* *, tout l'Oiſeau eſt de couleur d'outre-mer.

9. PINÇON rouge, ou *Preneur de Mouches*, de Cateſby *p.* 56. *Fringilla rubra*. *Muſcicapa rubra*; en Anglois *The ſummer Red-bird*. Cet Oiſeau eſt tout rouge, & de la grandeur d'un *Moineau*. Quoiqu'il ſe nourriſſe d'*Inſectes*, il n'a pas le bec fait comme les *Muſcicapa* de la Tribu des *Sylvia*, mais comme des *Fringilla*, *Pinçons*; ce qui fait que M. KLEIN le range ici parmi eux. Il le nomme en Allemand *Rohter-Finck*.

Il ne faut pas, nous l'avons, je penſe, déja dit ailleurs, tirer le Genre des Animaux ſuivant la nourriture qu'ils prennent; on en mettroit enſemble qui n'auroient aucun rapport entr'eux; par exemple, un *Chien* avec un *Chat*, qui ſont de genres bien différens, quoique l'un & l'autre vivent de chair, d'arrêtes de Poiſſon, &c.

* *Plumæ rectrices* chez M. LINNÆUS ſont celles de la queue, & M. KLEIN entend celles de la queue & des ailes.

10. PINÇON à tête blanche. *Fringilla capite albo*; en Anglois *Pied Chaffinch*; en François *Pinçon-Pie*, ſelon Albin, qui en donne *Tom. II. n.* 54. la deſcription & la figure. Il eſt nommé en Allemand *Weiskopff*. Il a la moitié du bec bleue, & l'autre couleur de chair, la tête entiere & le col blancs comme de la neige, le dos & le ventre violets, au dos trois plumes bleue-azur, à la poitrine ſix, les ailes & la queue d'un blanc fauve.

11. PINÇON hupé. *Fringilla criſtata*; nommé *Xomolt*, Seba *II. p. 66. t. 65. n.* 5. En Allemand, ſelon M. KLEIN; *Straus-Finck*. Il a la tête & le plumage rouge, le bec jaune, une tache jaune en deſſous & proche des yeux, la poitrine & le dos couleur de vermillon, les petites plumes qui couvrent les grandes, jaunes, les plumes inférieures rubicondes, aux côtés du ventre quatre plumes pourprées, la queue de trois couleurs, rouge, pourpre, & jaune au bout.

12. PINÇON à poitrine bleue d'Edouard *I. p.* 23. *Fringilla pectore cæruleo*; en Anglois *The red headed Green-Finch*; en Allemand *Blaubruſtiger Finck*. Il a la tête rouge, la poitrine bleue, un collier jaune, le reſte verd & jaune.

13. CHARDONNERET de la Chine, nommé *Rouge-queue* de la Chine par Albin *Tom. III. n.* 68. *Fringilla purpurea. Carduelis Sinenſis, capite purpureo*, en Anglois *The China-Bull-Finch*; en Allemand *Cardinalchen*. Il a tout le ventre depuis le bec juſqu'aux joues & la queue rouges, le dos & les ailes verts, la tête & le deſſus de la queue pourprés.

14. PINÇON noir du Mexique, nommé par Albin *Tom. III. n.* 18. *Pie Grieche* de Bengale; en Latin *Fringilla nigra*; *Fringilla Mexicana nigra*; en Anglois *The Dial Bird*, ou *Bengal Magpie*; en Allemand *Schwartzer Bengalcher Fink*. Cet Oiſeau a la tête, le dos, les plumes qui reglent ſon vol, de couleur de Corbeau; le bec un peu bleu, la poitrine & les pieds d'un noir brun, les petites plumes qui couvrent le ventre & la queue, blanches.

15. Petit PINÇON rouge, nommé par Albin *Tom.*

*III. n.* 77. *Oiſeau d'Amaduoads*, mâle & femelle. *Fringilla rubra minima ;* en Anglois *The Amaduoads Cock and Hen* ; en Allemand *Rohte, Kleinſte Stieglitz, Diſtel-Finck.* C'eſt un petit Oiſeau : le mâle a le bec & tout le corps rouge, les pieds jaunes. La femelle a la poitrine jaune ; la tête, le dos, les ailes, brunes ; le bec & la queue comme le mâle, & les pieds jaunes.

16. PINÇON brun de l'Amérique. *Fringilla fuſca Americana ;* en Anglois *The Greater Bulfinch*, ſelon Edouard *Tom. II. p.* 85. Il y en a un autre *p.* 83. qu'il nomme *The little brow Bulfinch.* Il a le haut du goſier, *gula*, le bas du col juſqu'aux cuiſſes, & les épaules des ailes, très-rouges ; le reſte brun ; le bec blanchâtre, & les pieds bruns.

17. PINÇON brun & noir de l'Amérique à belle queue. *Fringilla ex fuſco & nigro varia, Americana, caudâ ſuperbiens ;* en Anglois *The Schomburger.* Edouard *II. p.* 85. doute ſi cet Oiſeau n'eſt pas une *Grive*, ou un *Ortolan.* Ce n'eſt ni l'un ni l'autre, dit M. KLEIN, mais une eſpece de *Pinçon, Fringilla.*

## GENRE XI.

*BÉCASSES & BÉCASSINES*, Oiſeaux à long bec, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Scolopaces.*

Ce Genre d'Oiſeaux eſt nommé en Latin *Scolopax* ; en Allemand *Schnepfe.* Le bec eſt droit, cylindrique, allongé ; la baſe obſcure provient du crâne, de laquelle ſortent des mâchoires de ſubſtance de corne, obtuſes par le bout, flexibles, & ayant la figure d'une pincette, *volſella.* Ils ont les doigts des pieds très-longs, déliés, propres à raſer les marais. On les nomme communément *Aves naſutæ* ; en Allemand *Lang naſen* ; & *Scolopaces*, de la figure de leur bec, du mot Grec σκολοπαξ, de σκολοψ, *palus*, parceque leur bec reſſemble à un pieu. C'eſt en ce ſens que *Scolopax* eſt rendu en Hebreu par le mot *Kore.* Ce ſont des Oiſeaux qui ſe nourriſſent de vers, & qui fourrent leur bec dans le limon. Ils ſe tiennent tous cachés, & il faut

des *Chiens* pour les faire lever. Ils ont la langue très-fine, faite en forme de vers.

1. BÉCASSE ordinaire. *Scolopax ſimpliciter*, Ariſtote & Aldrovande. *Perdix ruſtica major*, Schwenkfeld. *Gallina ruſtica*, *Gallinago*, Gaza; nommé en Anglois par Dale, Willughby & Albin *The wood Cock*. Albin *Tom. I. n.* 70. en donne la deſcription & la figure. M. KLEIN doute ſi c'eſt celle que le Comte de Marſilly *Tom. V. t.* 13. 14. nomme *Gallinago major cinerea, mas & femina*, ou la ſeconde dont il parle. Rai nomme cet Oiſeau *Scolopax Gallinago maxima*. M. LINNÆUS *Numenius, roſtri apice lævi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris, apice albis*. Cet Oiſeau, plus petit que la *Perdrix*, vole ſoir & matin aux bords des forêts, & s'y retire. Son bec a plus de trois pouces & $\frac{1}{4}$ de long. On en eſtime la chair.

2. Moyenne BÉCASSE, *Scolopax media*; *Gallinago*, *Ruſticula media*; *Gallinago paludana major*; *Gallinago minor*, Aldrovande. *Scolopax minor*, ſelon Willughby, Dale & Albin; en Anglois *The Snipe*, ou *Snite*. Albin *Tom. I. n.* 71. en donne la deſcription & la figure ſous le nom de *Beccaſſine*. On la nomme en Allemand *Duppel Schnepffe*. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt la *Gallinago vulgaris minor* du Comte de Marſilly. Cet Oiſeau eſt plus petit que le précédent, & la plus grande des *Bécaſſines de marais*. Son bec a un pouce & $\frac{1}{6}$ de long. Dale *p.* 400. dit qu'en Angleterre c'eſt un Oiſeau paſſager, ainſi que l'autre. M. LINNÆUS le nomme *Numenius capite lineis quatuor fuſcis, longitudinalibus, roſtri apice tuberculoſo, femoribus ſeminudis*.

3. BÉCASSE, *Scolopax*, nommée par les Naturaliſtes *Capella cæleſtis*, *Chevrette volante*, parce qu'elle imite le cri de la *Chevre*, en prononçant *mec*, *mec*. C'eſt celle à qui l'on donne proprement le nom de *Bécaſſe*, celle que les Seigneurs & les Nobles chaſſent, *Dominorum ea nobilium Gallinago*, enfin la *Bécaſſe* des Chaſſeurs; en Allemand *Schnepffe*. Elle fréquente les marais.

4. Très-petite BÉCASSINE, *Scolopax minima*, qui peut

être le mâle de la *Bécaſſine* d'Albin *Tom. III. n.* 86. nommée en Anglois *The Jack Snippe*, ou *Judeock*; en Allemand *Haar Schnepffe*. Parceque ſes plumes ſont beaucoup plus longues que celle de la troiſiéme Eſpece, & qu'elles ſont comme des crins, on la nomme en Allemand *Haar-Pudel-Schnepffe*.

5. BÉCASSE de Campagne, *Scolopax Ruſticolax*, ſelon Aldrovande, plus grande que la *Bécaſſe*; *Scolopace major*, dit le Comte de Marſilly *t.* 16. C'eſt la *Barge* ou *Ægocephalus* de Belon, la *Fedoa* de Geſner, que Dale *p.* 400. nomme en Anglois *The Yarwhelp*, ou *Yarwip*. M. KLEIN marque qu'il ne connoît pas aſſez bien cet Oiſeau pour en pouvoir parler.

6. BÉCASSE blanche, *Scolopax alba*; en Anglois *The white Wood-Cock*; en Allemand *Weiſſe Wald-Schnepfe*. Albin *Tom. III. n.* 85. en donne la deſcription & la figure. Mais elle eſt mal peinte, dit M. KLEIN. C'eſt le *Guaranna* de Marcgrave, la *Ruſticula aquatica* du Breſil. Outre la *Fedoa* de Geſner, il y a la *Fedoa ſecunda* de Willughby, qui eſt la *Vetola* des Vénitiens, & une troiſiéme *Fedoa*, dont parle encore Willughby. M. KLEIN dit qu'il n'a pû déterminer ſi ces eſpeces de *Fedoa* ſont des *Poules aquatiques*, ou des *Courlieus*, ou des *Bécaſſes*.

## GENRE XII.

*CHEVALIERS* & autres Oiſeaux, nommés *Glareola* par M. KLEIN, parcequ'ils fréquentent les lieux ſabloneux, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Scolopaces*.

Ce Genre d'Oiſeaux nommé *Glareola*, de *glarea* ſable; en Allemand *Sand-Strand Lauffer*, ſe trouve ſur les bords des Fleuves, des Etangs, & dans les lieux marécageux. On les confond aſſez ordinairement avec les *Bécaſſes*, *cum Scolopacibus ſeu Gallinaginibus*, & ils ſont appellés par les Oiſeleurs Allemands *Schnepffen*. Mais ils en ſont diſtingués, non ſeulement par la bonté de leur chair (car celle de pluſieurs a

un goût ſauvagin de Poiſſon), mais encore par leur bec menu, luiſant comme de la corne, beaucoup plus court, conique & pyramidal, étroit, obtus au bout, & par la mâchoire ſupérieure faite en angle. Ils ont de plus les pieds élevés, & les jambes longues; les doigts de devant plus forts que ceux des *Bécaſſes*; celui de derriere court, placé plus haut; l'ongle fait en poignard; il touche la terre quand l'Oiſeau eſt droit. Le plumage eſt poli, le col aſſez long & rond, la tête petite par rapport au tronc. Ces Oiſeaux ſont de grand coureurs; ils volent par paire ou en troupe, ſoit vers les rivages ou dans les campagnes les moins herbues, où ils ſe repoſent. Ils ſont toujours en mouvement, & ne ſe cachent pas comme les *Bécaſſes*; d'où leur eſt venu le nom de *Gallinulæ*, petites *Poules*. Ce ſont, dit M. KLEIN; les *ſuivantes* des *Bécaſſes*, *pediſſequæ Gallinaginum*. Ces Oiſeaux, comme les *Bécaſſes*, ont la queue courte. Il y en a pluſieurs eſpeces. Voici la notice de quelques-unes, que M. KLEIN a obſervées & fait peindre.

1. TOTAN. *Glareola* premier de Schwenkfeld; nommé *Redshanea* par Turnerus; *Erythropus major* par Geſner, Marſilly *t.* 23. qui eſt le *Totan* d'Aldrovande, peutêtre le *Callydris* de Belon *p.* 208. nommé par Willughby & Dale en Anglois *The Redshank* ou *Bol Snipe*. Par Albin *Tom. II. n.* 68. *The Totana*; en Allemand *Roht-Beinlein*. M. KLEIN dit qu'il y en a un autre ſemblable à celui-ci, qui a les pieds d'un jaune tirant ſur le rouge, & que la *Gambetta* d'Aldrovande & de Willughby eſt le *Totan* d'Albin. Voyez le grand *Pluvier* d'Aldrovande, le *Glottis* de Baltner, le *Totan* du Comte de Marſilly *t.* 22. & le *The Pool Snipe* d'Albin *Tom. III. n.* 87. qu'il nomme en François *Bécaſſine d'étang*.

2. POULE d'eau, *Glareola* troiſiéme de Schwenkfeld. *Gallinula aquatica quarta*, ou *Ochropus magnus* de Geſner, que les Allemands nomment *Geel-Gelb-Beinlein*; *Schmirring*; *Geel-Fuetkelo*.

3. GLAREOLA ſeptieme de Schwenkfeld. *Gallinago cinerea, ex minimis Gallinularum*. La plus petite des

*Poules d'eau ;* en Allemand *Aſch-Hunlein.*

4. GLAREOLA quatrieme de SCHWENKFELD, qui eſt le *Tringa* d'Aldrovande *p.* 481. le *Cinclus* de Belon & de Willughby ; la *Gallinula aquatica octava* & *Ochropus medius* de Geſner ; autre eſpece de *Poule aquatique*, nommée en Allemand *Gruen-Fueſſel ; MATKVILLIS.*

5. GLAREOLA, couleur châtain, *caſtanea*, qui a depuis le haut de la tête juſqu'au bout de la queue ſept pouces de long. Son bec eſt noir & un pouce de long. M. KLEIN dit en avoir tué un le 16 Août 1746.

6. GLAREOLA cinquiéme de SCHWENKFELD, qui eſt la *Gallinula paluſtris* XII. de Geſner, l'*Ochropus minor* du même, & l'*Ardea arenalis ;* en François *petite Poule* de marais ; en Allemand *Sandre gerlein* ; *Riegerlen*, comme qui diroit *Motricula.*

7. GLAREOLA huitiéme de SCHWENKFELD. *Gallinula Paluſtris* ; en Grec Λευκοπυγος ou Πυγαργος de Geſner ; en Allemand *Bunt mott-huenlein ; Geſcheckt mott-huenlein.*

8. GLAREOLA neuvieme de SCHWENKFELD. *Cenchramus ; Gallinula novalis minor*, *MATKnelt zell* de Belon ; *Gallinula Erythra* de Geſner & de Willughby ; en Allemand *MATKern Slein Brac-Bogel.*

9. GLAREOLA. *Gallinula Melampus* de Geſner, Aldrovande & Willughby ; en Allemand *ROHTKnuſſel*, ſelon Baltner.

10. GLAREOLA *pugnax*, Oiſeau de combat, ſoldat ; *Avis pugnax*, ſelon Aldrovande, Willughby, Geſner & Marſilly *t.* 24. qu'Albin *Tom.* 1. *n.* 72. & 73. nomme *Heron étoilé.* Les mâles different entr'eux pour les couleurs. Ils ſe battent ; d'où leur eſt venu le nom d'*Avis pugnax.* Il n'y a aucune différence entre les femelles.

11. GLAREOLA *Ægocephalus*, qu'Albin *Tom. II. n.* 70. nomme *Francolin ;* en Anglois *The Godwit* ou *Yarwelp* ; en Allemand *Gelbe-naſe*, *Roeht-Halſtz.* Il a les pieds noirs, le bec jaune, trois grandes plumes des ailes de devant variées de noir & de blanc. Les plumes du corps ſont de la grandeur de celles de la *Gelinote* de bois, *Gallinæ urogalli minoris.*

12. GLAREA BARKER, qu'Albin *Tom. II. n.* 71. nomme *petit Corlieu* ou *Aboyeur* des Anglois. Il a le bec

noir, le col & le ventre gris, le dos & les ailes bruns & blancs par écailles, trois grandes plumes noires aux ailes, les pieds jusques par delà les genoux d'un cendré fauve.

M. KLEIN ne sait s'il faut mettre au rang des *Glareola*, le *Pluvier* jaune & verd, mâle & femelle, du Comte de Marsilly *t.* 27. & 28. & le *Pluvier* brun cendré du même *t.* 29. 30. le petit *Pluvier* du même *t.* 31. Les descriptions que le Comte de Marsilly en donne, ne sont pas exactes, & les figures ne sont pas conformes aux descriptions.

On peut mettre au rang des *Glareola* le *Chevalier noir* de Belon.

## GENRE XIII.

*RALES*, mis par M. LINNÆUS dans le Genre des *Aves Passeres.*

Ce Genre d'Oiseaux a le bec serré, fort, long d'un pouce. Le doigt de derriere avec celui du milieu sont les plus longs. Les ongles courts, & les jambes longues.

1. RÂLE terrestre, *Rallus terrestris*; *Ortygometra* d'Aldrovande & de Schwenkfeld; *Crex* d'Aristote, à cause de sa voix; vulgairement nommé *Roi des Cailles*; en Anglois par Willughby *The Dacker Hen* ou *Rail*; par Albin *Tom I. n.* 32. *Land Rail*; en François *Roi* ou *Mere des Cailles*; en Allemand *Graf-Wiesen-Lauffer*, *Alte-Knecht*; vulgairement *Wachtel-Konig*; *Schecke*, *Schryck*. Il est nommé par Aristote Ορτυγομητρα, de Ορτυξ & μητρα, c'est-à-dire *Mere des Cailles*; & *Rallus* ou *Grallus*; peut-être de son grand pas, *gradus grallatorius*; ou peut-être du mot *Regale*; parce que c'est un mêt royal, dit Willughby. On confond, dit M. KLEIN, mais mal, cet Oiseau avec les *Cailles*, & on l'appelle leur *Roi*, quoiqu'il n'ait aucun rapport avec elles. C'est Aldrovande qu'il lui a donné ce titre. Il y a de la varieté dans ces Oiseaux.

2. RÂLE aquatique, *Ralus aquaticus*, selon Aldrovande;

vande ; *Gallinula Chloropus altera* du même ; & peut-être auſſi celui qu'il nomme *Serica* ; en Anglois *The Water Rail* par Willughby ; *Ortygometra aquatica* par Belon. Il raſe l'eau en volant. En Allemand *Schwartzer Waſſer-Treter* ; *Waſſer-Lauffer* ; en Latin *Gallinula Chloropus* ; en Anglois *The More-Hen* par Albin ; en François *grande Poule d'eau* ou *de marais*. Il en donne la figure & la deſcription *Tom. II. n.* 72. Cet Oiſeau d'Albin a le bec rouge, & le bout jaune ; & M. KLEIN dit que le *Chloropus major* & *altera* d'Aldrovande, la *Grinetta* de Willughby, le *Râle aquatique*, *The water Rail* d'Albin *Tom. I. n.* 77. ne ſont que des varietés. On en peut voir les deſcriptions chez ces Auteurs. On les trouve ſur les lys d'étangs.

3. RÂLE cendré, à face de *Mouette*. *Rallus cinereus facie lari*, qu'Albin *Tom. II. n.* 82. nomme *Mouette à pieds fendus* ; en Anglois *The Cloven footed Hull* ; en Allemand *Grave-Rall* ; *Aſter-Mewe*. Il a le bec noir & jaune en quelques endroits, la mâchoire inférieure bleue, les yeux noirs, les pieds verds de mer ; le bas du col, la poitrine & le ventre, blancs, &c.

4. RÂLE terreſtre de l'Amérique, Cateſby *p.* 70. *Rallus terreſtris Americanus* ; en Anglois *The Sorée*. Ce ſont des Oiſeaux ſi gras, qu'ils ne peuvent échaper des mains des Indiens, & on les compare pour la bonté aux *Ortolans*. En Allemand *Braune Raille*.

5. Râle aquatique de Bengale. *Rallus aquaticus Bengalenſis* ; en Anglois *The Bengall water Rail*. Albin *Tom. III. n.* 90. en donne la deſcription & la figure. Il a les yeux blancs, la tête & le col noirs, les ailes vertes, le bec & les pieds jaunes.

6. RÂLE aquatique, dont le bec, le front & les pieds ſont rouges, le reſte du corps bleu-azur, & les plumes de deſſous la queue blanches. *Rallus aquaticus, roſtro, fronte, pedibuſque rubris, reliquo corpore cyaneo, ſub caudâ plumis albis* ; en Anglois, ſelon Edouard *II. p.* 87. *The purple Water-Hen*.

7. RALE du même Edouard *I. p.* 48. dont les doigts ont trois pouces de long, l'éperon deux pouces ; en forme d'aiguillon & irrégulier. *Rallus digitis triuncia-*

*libus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo; Follata excelsa.*

A ce Genre d'Oiseaux, on peut, dit M. KLEIN, rapporter les *Lares* ou *Mouettes* fissipedes ou à doigts dégagés, de Willughby & d'Albin.

## GENRE XIV.

Petits Oiseaux *Suceurs de miel*, que l'on peut mettre dans l'Ordre des *Aves Passeres* de M. LINNÆUS.

Ce Genre d'Oiseaux, qu'on nomme *Guainumbi*, *Tominegi*, *Colibri*, honorés chez les Malabares d'un culte divin, sont les plus petits Oiseaux qu'il y ait dans l'Univers. Ils se nourrissent du suc ou du miel des fleurs. Ils sont nommés *Ourussiæ* dans le *Catal. Avi. Petrop. p.* 385. On dit qu'après la saison des fleurs ils se retirent dans des lieux couverts, où ils tombent dans une espece de léthargie. Ce qui fait que dans les Antilles on les nomme *Renati*, parcequ'au Printems ils reprennent une nouvelle vie. Mais à Surinam & à la Jamaïque, où il y a toujours des fleurs, on y voit de ces Oiseaux toute l'année. Il y a des Voyageurs qui disent que ces Oiseaux chantent. Thevet, Marcgrave, Catesby, veulent qu'ils ne prononcent que le mot *screp*. Tous ces Oiseaux n'ont pas le bec droit. Ceux qui l'ont courbé, sont mis par M. KLEIN dans le Genre des *Falcinelli*. Au commencement de Novembre 1753. je me trouvai chez M. DE RÉAUMUR, quand un Monsieur nouvellement arrivé de l'Amérique lui apporta une femelle de *Colibri* dans son nid. Elle n'est pas plus grosse qu'un *Hanneton*. C'est la plus petite espece.

1. COLIBRI de la Caroline. *Mellisuga; Colibri*; *Mellivora avis Carolinienſis*; en Anglois *The Humming-Bird*. Catesby *p.* 65. Cet Oiseau a le bec droit, & long de trois quarts de pouces.

2. COLIBRI de l'Amérique, le plus petit de tous. *Mellisuga; Thaumantias Americana, omnium minima.* Seba *l. p.* 6. *t.* 39. Cet Oiseau, en lui ôtant la tête &

la queue, n'eſt pas ſi grand que le petit bout du doigt. Ce peut être le *Mellivora avis* de Sloane *p.* 307. *t.* 264. la ſeptieme eſpece de Marcgrave dont parle Willughby *p.* 231. celui que Rai *p.* 187. nomme en Anglois *The leſt Humming-Bird.* Voyez Edouard, Sloane, ſur ces Oiſeaux, dont les plumes, ſuivant Acoſta, Laet *l. v. c.* 24. *p.* 268. Rochefort, du Tertre, ſervent aux Indiens à faire des Ouvrages merveilleux.

3. COLIBRI, nommé *Ronckje*, petit Oiſeau de l'Amérique. *Melliſuga, Ronckje dicta, avicula Americana Colibritis*, Seba *I. p.* 59. *n.* 5. Il a le bec long & pointu. Friſch *t.* 24. parle de la femelle, qu'il nomme *Roitelet des Indes*, ou *Moineau muſqué.* Seba *t.* 68. donne deux autres petits Oiſeaux, & Meriana *t.* 18. la figure de leurs nids & des œufs.

4. COLIBRI hupé. *Melliſuga criſtata*; en Anglois *The criſted Humming Bird.* Edouard *I. p.* 37. En Allemand *Blau--haubiger Honig Sauger.*

5. COLIBRI à poitrine rouge. *Melliſuga pectore rubro.* Edouard *p.* 38. en Anglois *The Red-throated Humming-bird*, Edouard *I. p.* 32. En Allemand *Rohtbruſtiger.*

6. COLIBRI à ailes brunes. *Melliſuga alis fuſcis*; en Anglois *The green and blue Humming-bird.* Il y a d'autres *Colibris*, don le bec eſt en forme de faux, & qui ſont du Genre ſuivant.

## GENRE XV.

Oiſeaux qui ont le bec fait en forme de faux, *roſtro falciformi.* M. KLEIN en fait deux Tribus. Il met dans la premiere les *Grimpereaux*; dans la ſeconde les *Courlieux*, les *Guêpiers*, & les *Hupes.* Ils ſont mis par M. LINNÆUS dans le Genre des *Aves Scolopaces.*

### TRIBU PREMIERE.

Les Oiſeaux nommés *Falcinelli* ont le bec menu, allongé, fait en forme de faux. De ce nombre ſont tous les petits Oiſeaux *Suceurs de miel*, ou *Colibris*, qui

ent le bec en maniere de faux, & que l'on confond avec les *Colibrie*, qui ont le bec droit.

1. GRIMPEREAU grisâtre. *Falcinellus arboreus* de Dantzic; *Certhia; The Creeper* de Willughby; *Certhius* de Turnerus; *Certhia*, *Certhius*, du Grec Κερθιος; *Rarycheus* d'Albert le Grand; *Scandulaca* de Gesner; *Certhius major*; en Allemand *Der grau Spaſt*, *Grimpereau griſâtre*; & *Certhius minor*, Frisch *t.* 39. en Anglois *The ſmall Tree creeper* par Albin *Tom. III. n.* 25. Il est ici parlé du grand & petit *Grimpereau* variés de gris & de blanc, dont Frisch donne de bonnes figures, mais non des noms convenables. Les autres *Grimpereaux* sont mis dans le Genre des *Pies* par M. KLEIN.

Les suivans sont des petits Oiseaux des Indes, du Genre des *Colibris*.

2. NOGHTOTOTL, de la couleur du *Moineau* d'Espagne. *Falcinellus colore Paſſeris Hiſpanici*, Seba *I. p.* 69. *t.* 42. *n.* 5. C'est un Oiseau qui ressemble à nos *Grimpereaux*, & qui chante comme un *Roſſignol*.

3. FALCINELLES du Mexique. *Falcinellus Mexicanus*, dont plusieurs especes.

La premiere nommée *Hoitzillin*. C'est un Oiseau qui chante; *Avicula canora*. Seba *ibid. n.* 6.

La seconde un très-bel Oiseau, couleur de bleu-azur, dont la queue est courte & pointue. *Avicula cyaneo colore venuſtiſſima*. Seba *I.* 102. *t.* 65. *n.* 3.

La troisieme un petit Oiseau, dont le plumage est de couleur d'or, & si beau, qu'il n'est pas possible au plus habile Peintre de l'imiter. *Avis Auricoma nec vel Apellea manu imitabilis*, dit Seba *I. p.* 166. *t.* 99. *n.* 4.

La quatrieme un Oiseau nommé *Ani* au Mexique, qui a la queue très-longue, & du triple & demi plus longue que le corps., *Avis Ani Mexicana*, *caudâ longiſſimâ*. Seba *I. p.* 72. *Tab.* 45. *n.* 3.

4. YAYAUHQUITOTOLT de la nouvelle Espagne, dont la queue, composée de deux plumes, est longue. *Falcinellus novæ Hiſpaniæ*, *caudâ bipenni longâ*. Seba *I. p.* 84. *t.* 61. *n.* 7. Il est bleu-azur proche des yeux, au col & à la queue, & le bec jaune.

5. SUCEUR de miel hupé de la Nouvelle Eſpagne, dont deux longues plumes compoſent la queue. *Falcinellus criſtatus. Mellivora avis criſtata, cum duabus pennis longis, ex novâ Hiſpaniâ.* Seba *I. p.* 97. *t.* 61. *n.* 4. Il eſt tout rouge. Il a les ailes bleues, une longue hupe; ſelon Sloane *t.* 264. un collier rouge; en Anglois *The largeſt Humming-bird, ibid. f.* 3. *Mellivora avis fœmina.* M. KLEIN doute que le mâle ſoit le *Mellivora avis maxima;* en Anglois *The long tail'd Humming-bird*, qui eſt la troiſiéme eſpece de *Guainumbi* de Marcgrave & de Rai, & qui reſſemble aux *Manucodiata* ou *Oiſ. de Paradis* par deux très-longues plumes.

6. HOITZILLIN, nommé PAPILLON, *Falcinellus Papilio*, à cauſe de ſa belle couleur bleue & noire. *Falcinellus Papilio.* Seba *I. p.* 97. *t.* 61. *n.* 5. Hernandez *p.* 26. en Allemand *Schmetterling.*

7. KAKOPIT TSIÆI, Oiſeau des Indes Orientales, nommé *Roi des fleurs. Falcinellus Rex florum.* Seba *I. p.* 100. *t.* 63. *n.* 3. & 11. *Tab.* 62. *n.* 3. en Allemand *Blumen-Koenig.*

8. Oiſeau de toute couleur de l'Iſle de Ceylan. *Falcinellus omnicolor Zeylanicus.* Seba *I. t.* 69. *p.* 110. *n.* 5. C'eſt un magnifique Oiſeau par la varieté de ſes couleurs, & le mélange doré qu'on y voit. Les Allemands le nomment *Cey Lanſche Baumklette.*

9. ATOTOTL, Oiſeau de la Virginie. *Falcinellus phœniceus.* Seba *I. p.* 116. *t.* 73. *n.* 7.

10. ROUGE-GORGE de l'Amérique hupé. *Falcinellus Rubetra, Avis Americana criſtata.* Seba *I. p.* 160. *t.* 105. *n.* 3. en Allemand *Gelb-Schuys.* Cet Oiſeau, ſous ſon bec jaune, eſt de couleur de terre; il a les environs du col & le corps ferrugineux & jaunes; les petites plumes qui couvrent les grandes, jaunes; celles qui dirigent ſon vol & la queue, de couleur de turquoiſe.

11. GUIGUIT de l'Iſle de Cuba. *Falcinellus de Guiguit.* Seba *p.* 96. *t.* 60. en Allemand *Kurtz Schwantz, Lang Haltz.* Il a le col, les ailes & la queue, de la couleur du *Corbeau;* la poitrine, le dos & le ventre, de couleur d'outremer; le front d'un bleu argenté, les pieds jaunes; il eſt de la grandeur du *Roſſignol*, & il a le col plus fort.

12. COLIBRI bleu des Indes Orientales. *Falcinellus cyaneus.* Seba *II. p.* 20. *t.* 19. *n.* 2. Il a le haut du gosier blanc, le reste est bleu. M. KLEIN dit qu'il est de la grandeur du *Certhia*, petit *Grimpereau* qu'on voit dans son païs.

13. GRIMPEREAU à gosier, ailes & queue, noirs; le reste bleu. *Falcinellus gulâ, alis, caudâque, nigris; reliqua cærulea;* en Anglois *The blue Creeper.* Edouard *I. p.* 21. en Allemand *Blave Klette.*

14. GRIMPEREAU brun à ventre blanc. *Falcinellus fuscus ventre albicante;* en Anglois *The little brown and white Creeper; Honey-thief.* C'est un Oiseau des Indes Orientales. Edouard *I. p.* 26.

15. COLIBRI au gosier verd. *Falcinellus gutture viridi. The long-tail'd red-humming bird.* Edouard *I. p.* 32. en Allemand *Gruenkehlige Klette.* La noirceur de sa tête est distinguée de son col verd par une bande qui descend proche la poitrine; elle est de couleur sanguine; le ventre verd de buis; le dos d'un rouge orangé; les petites plumes qui couvrent les grandes, de couleur de gramen; celles nommées *rectrices*, & les deux plus longues plumes de la queue, couleur de pourpre.

16. COLIBRI à tête & queue bleues. *Falcinellus vertice caudâque cyraneis;* en Anglois *The long-tail'd green Humming-bird.* Edouard *I. p.* 33. en Allemand *Blaukappige gruene Klette.* Il a les plumes des ailes brunes, la queue fourchue; les pennes les plus longues ont cinq pouces.

17. COLIBRI qui a la queue longue de sept pouces. *Falcinellus caudâ septem unciarum;* en Anglois *The long-tail'd black cap Humming-bird.* Le corps n'a pas deux pouces de long. Edouard *I. p.* 34. M. KLEIN le nomme en Allemand *Schwartz platige gruene Klette.*

18. COLIBRI à queue courte & ventre noir. *Falcinellus ventre nigricante, caudâ brevi æquabili*; en Anglois *The black belly'd green Humming-bird.* Edouard *I. p.* 36. Les *Murmures de Mango* d'Albin *Tom. III. n.* 43. en Anglois *The long tail'd Humming-bird, and the Mango bird*, en sont une varieté.

19. GRIMPEREAU de Bengale. *Falcinellus Bengalenſis*; en Anglois *The little black whithe and red, Indian Creeper.* Edouard *II. p.* 81. Il a le dos, la queue & les ailes, noires; trois taches larges & rouges depuis le derriere de la tête juſqu'à la queue; le goſier, la poitrine, le ventre, blancs; le bec & les pieds bruns.

## TRIBU II.

De cette Tribu, dont M. KLEIN parle ſous les noms *Arquata* & *Falcatores*, ſont 1°. les *Courlieux*, *Numenii*. 2°. Les *Guepiers*, *Meropes*. 3°. Les *Hupes*, *Upupæ*, qu'il nomme *Arquatæ ſtercorariæ*, parceque ces Oiſeaux ſe plaiſent dans l'ordure & la fange.

### COURLIEUX.

1. GRAND COURLIEU. *Numenius Arquata*, Geſner; Aldrovande. *Numenius ſeu Arquata colore atro cinereo*, ſelon le Comte de Marſilly *t.* 17. nommé par M. LINNÆUS *Numenius roſtro arcuato, alis nigris, maculis niveis, pedibus cæruleſcentibus*; en Anglois *The Curlew* par Willughby & Albin *Tom. I. n.* 79. Cet Oiſeau préſage les tempêtes. Il a ſept palmes de long depuis la pointe du bec juſqu'au milieu du doigt.

2. Petit COURLIEU. *Numenius minor*, *Phæopus altera*, *ſeu Arquata minor.* Geſner & Aldrovande *l.* 20. *c.* 21. *Arcuata minor puniceo colore, pectore vireſcente* par le Comte de Maſilly *t.* 18. Par M. LINNÆUS *Numenius roſtro arcuato, dorſo maculis fuſcis rhomboïdalibus*; en Anglois *Wimbrel*; en Italien *Taraniolo.* C'eſt auſſi l'*Arquata minor* du païs de M. KLEIN.

3. COURLIEU blanc de Cateſby *p.* 82. *Numenius albus*; en Anglois *The white Curlew*; en Allemand *Weiſſer-Braacker.* Il a le bec rouge, & eſt de ſix pouces de long. Les quatre dernieres plumes des ailes ſont vertes, les pieds couleurs de chair, & la chair couleur de ſafran.

4. COURLIEU brun du même *p.* 83. *Numenius fuſcus*; en Anglois *The brown Curlew.* M. KLEIN doute ſi

ce n'eſt pas le *Falconellus* de Geſner & d'Aldrovande ; de couleur fauve, ſelon le Comte de Marſilly *t.* 19. en Allemand *Brauner Braacher.*

5. COURLIEU rouge de Cateſby *p.* 84. *Numenius ruber* ; en Anglois *The red Curlew.* C'eſt le *Guara* de Maregrave, le *Curlieu* des Indes de Cluſius & de Willughby ; en Allemand *Rohter Braacher.* C'eſt un Oiſeau tout rouge, excepté les extremités de ſes ailes qui ſont noires.

6. COURLIEU noir. *Numenius niger.* C'eſt le *Curiaca* de Marcgrave, le *Maſarino* des Portugais. Il a, dit Willughby, un bec long de la largeur de ſix doigts, courbé comme un ſabre hongrois, & de couleur de feu brunâtre.

7. COURLIEU à figure de *Heron. Numenius ſeu Falconellus punice-oviridis.* Marſilly *t.* 20. en Allemand *Gruener Braacher.*

8. COURLIEU couleur brune du même *t.* 19. *Numenius ſubaquilus ; Falconellus* de Geſner & d'Aldrovande ; en Allemand *Braunrohter Braacher.*

9. COURLIEU. *Numenius holoſericus*, qui eſt la *Gallinago ſylveſtris aquatica* de Beſler, Oiſeau rare, qui cherche ſa vie dans les marais ; de couleur noire & rouſſe, dont le bec eſt oblong, en quelque façon courbé, les jambes hautes & brunes, & les doigts longs.

*GUEPIERS*, Oiſeaux qui ſe plaiſent dans les lieux déſerts.

10. GUÉPIER. *Merops*, du Grec Μερόψ. *Apiaſter* de Geſner ; *The Bee-eater* de Willughby & d'Albin *Tom. II. n.* 44. de Belon *p.* 225. Charleton en donne une très-bonne figure. Albin croit que cet Oiſeau eſt la femelle du *Guépier* de Bengale, dont il parle *Tom. III. n.* 30. mais il ſe trompe.

11. GUÉPIER cendré. *Merops cinereus*, nommé *Quauheilui* à queue longue. Seba *I. p.* 50. *t.* 31. *n.* 10. en Allemand *Graver Bienen-Fraſtz.* Il a des taches très-rouges & fauves ; deux longues plumes rouges ſortent de ſon croupion ; la poitrine & le ventre de

couleur de soufre avec du rouge, la tête cendrée, & le bec verd.

12. Autre GUÉPIER de Gesner, Oiseau du même Genre, selon Aldrovande & Willughby. *Merops alter*, *Meropi congener* ; en Allemand *Seerchwalm*.

13. GUÉPIER du Brésil. *Merops Brasilienſis*. C'est la *Pie* du Brésil de Seba *I. p.* 102. *t.* 66. *n.* 1. que les Allemands nomment *Rubinglantz*.

*HUPE. Arquata ſtercoraria.* En Allemand *Wiedhoff Kohthahn.*

14. HUPE. *Upupa.* Ἔποψ en Grec. *Gallus lutoſus*, *Gallinaceus ſtercorarius*, selon Schwenkfeld, Aldrovande & Gesner ; en Anglois *The Hoop* ou *Hoope*, selon Willughby ; *The Cock Hoope*, selon Albin *Tom. II. n.* 42. & 43. qui donne les descriptions & les figures du mâle & de la femelle.

15. HUPE, espece d'Oiseau de Paradis. *Upupa manucodiata. Avis Paradiſiaca manucodiata criſtata.* C'est un Oiseau très-rare des Indes Orientales, dit Seba *I.* 48. *t.* 30. *n.* 5. La plûpart des Oiseaux à longue queue sont nommés chez les Auteurs, surtout chez Seba, *Oiseaux de Paradis.*

16. HUPE de Montagne ; *Upupa Montana.* Ermite des Montagnes de Suisse ; *Eremita Montanus Helveticus* ; en Anglois par Albin *Tom. III. n.* 16. *The* wood *Crow*, *from Switzerland*, qu'il nomme en François *Corneille de Bois des Cantons Suisses.* C'est un Oiseau solitaire, d'un verd foncé, qui se nourrit de *Cigales*, petits Poissons, *Grenouilles*, & de divers Insectes ; en Allemand *Wald-Rapp* ; *Stein-Rapp.*

## GENRE XVI.

Oiseaux du Genre des *Poules*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Gallinaceæ.*

Le bec de ces Oiseaux est court à proportion du corps ; un peu courbé. Les bouts des mâchoires sont

obtus. Ils ſe battent en mangeant, & ſe déchirent avec leurs éperons. Leurs ailes ſont courtes, creuſes en dedans, & peu propres à les faire voler. Les uns ont des éperons pointus ; les autres, au lieu d'éperons, des groſſeurs oſſeuſes, ou couvertes d'une peau dure. Ce Genre d'Oiſeaux ſe diviſe en domeſtiques & ſauvages. Les domeſtiques ſont de trois eſpeces différentes, ſavoir le *Coq* & les *Poules*, le *Paon* & ſa femelle, & le *Coq d'Inde*. Les ſauvages ſont le *Faiſan*, la *Perdrix*, la *Caille*, la *Gelinote*, & le *Coq de Bruiere*.

## *COQS & POULES.*

1. COQ, mâle de la *Poule domeſtique*. *Alector*; du Grec Αλεκτωρ, parcequ'il réveille la nuit. *Gallinaceus* ; *Gallus Gallinaceus domeſticus* ; *Gallus villaticus* ; la femelle, *Gallina* ; le *Coq* coupé, *Capo*. Aldrovande *c.* 10. 11. 12. 14. dit beaucoup de choſes au ſujet du *Coq* ; il en dit auſſi beaucoup de fabuleuſes, ainſi que Jonſton. En Anglois *The Dunghill-Cock and Hen*.

2. POULE de Guinée, ou POULE pintade. *Alector Guineenſis*. *Gallina Guinea Africana*. *Gallus mauritanus* de Geſner & Willughby. C'eſt, ſelon Rai, le *Meleagris* des Anciens ; *Poule Pintade* par Rochefort. Cajus *p.* 93. parle d'un *Meleagris* qui eſt plus rare. *Figur.* Albin *Tom. II. n.* 35. En Anglois *The Guiney-Hen* ; en Allemand *Perlhuhn*.

3. COQ de Curaſſau. *Alector Curaſſaus*. C'eſt le *Mituparanga* de Marcgrave ; le *Tepetotolt* ou *Oiſeau de Montagne* de Nieremberg. Sloane *II. p.* 302. *t.* 260. l'appelle *Gallus Indicus*. Il y a un autre *Coq* des Indes, qu'Aldrovande décrit avec une hupe. Marcgrave parle d'un *Coq* nommé *Mitu* ou *Mutu*, que les Eſpagnols mettent dans le rang des *Faiſans*. Le *Pauxi* de Nireemberg, qui a ſur le front une tumeur de la figure d'une figue, la *Poule d'Inde* d'Aldrovande *l.* IV. *c.* 12. ne ſont que des varietés. Ces Oiſeaux ne different du *Mitu* de Marcgrave que par la tumeur qu'ils ont ſur le front. C'eſt le ſentiment de Sloane & de Rai *p.* 52. & 63. La *Poule rouge* du Perou d'Albin,

qu'il nomme *Faiſan de Curaſſau Tom. II. n.* 31. mâle & femelle, n'eſt auſſi qu'un varieté du *Coq de Curaſſau.*

4. COQ du Breſil. *Alector Braſilianus*, que les Indiens nomment *Quan* ou *Guan*, dit Edouard *p.* 13. Il a une hupe noire ſur la tête; mais au lieu du cartilage que nos *Coqs* ont au deſſous du bec, il a une peau ridée, en quelque façon rouge, garnie de poils noirs aux bords. Du reſte il eſt variée de brun, de noir, de doré, de bleu, de blanc, de gris; ſes pieds ſont d'un rouge doré; le bec eſt étroit & noir. M. KLEIN regarde la *Gallina* dont parle Albin *Tom. III. n.* 40. comme une varieté du *Coq de Curaſſau.*

## *PAON.*

PAON; *Pavo*; *Gallinaceus Junonis*; *Pavus*; en Grec Ταως, Ταων, de l'étendue de ſa queue. Les Grecs modernes le nomment Παγωνι. On le nomme Oiſeau de Medie, de Perſe, Oiſeau de Junon; en Anglois *The Pea Cock*; en Allemand *Pfau*, *Paw*. Le plumage de cet Oiſeau eſt varié. Il y en a de tout blancs. Cet Oiſeau, qu'on ne voyoit autrefois que dans les Ménageries des Rois, & qui eſt remarquable par la beauté de ſa queue, n'eſt pas rare aujourdui. On en voit à la campagne dans les baſſes-cours des riches particuliers.

## *COQ D'INDE.*

1. COQ D'INDE. *Meleagris*; *Pavo Gallus*; *Gallo-Pavo*; *Avis Numenia*, *Numidica*; *Gallus Indicus*; *Gallina Africana.* Il y en a de fort bonnes deſcriptions dans Gillius, Aldrovande, Willughby, &c. C'eſt le *Meleagris vulgaris* des Auteurs. Albin *Tom. III. n.* 35. donne la deſcription & la figure du *Coq d'Inde.* Il y a dans la nouvelle Angleterre & la Virginie des *Coqs d'Indes ſauvages.* Cet Oiſeau ne vient pas des Indes Orientales, mais des Indes Occidentales. A moins, dit Chardin *Tom. III. c. 9. p.* 38. qu'on ne l'ait appellé *Coq d'Inde*, à cauſe qu'étant plus grand que les *Coqs* ordinaires, il

reſſemble en ceci aux *Coqs des Indes*, qui ſont plus grands que les *Coqs* ordinaires de tous les autres Païs.

2. COQ d'Inde hupé. *Meleagris; Gallo Pavo criſtatus;* en Anglois *The creſted Turchey Cock.* Albin *Tom. II. n.* 33. Il eſt un peu plus grand que nos *Coqs d'Inde.* M. KLEIN dit en avoir vû à Amſterdam & à Londres. Dale & Albin rapportent que ce ſont des Oiſeaux ſauvages de la nouvelle Angleterre qu'on apprivoiſe aiſément. Cet Oiſeau n'eſt qu'une varieté du précédent.

## *Oiſeaux du Genre des* FAISANS.

1. FAISAN. *Phaſianus; Gallinaceus ſylveſtris minor, variegatus & albus.* Il a les éperons courts, les pieds dégarnis de plumes. On en voit beaucoup en Pruſſe & en Boheme; en Anglois *The Pheaſant*; en Allemand *Faſahn.* Belon, Aldrovande, Geſner, Jonſton, Dale, Rai, & les autres, parlent de cet Oiſeau.

2. FAISAN brun du Breſil, *Phaſianus fuſcus Braſilienſis.* C'eſt le *Jacupema* de Marcgrave, Willughby, Rai; le *Coxolitli* d'Hernandez, avec quelques varietés. Les *Faiſans* de l'Iſle de Sainte Hélene ſont de la couleur de nos *Perdrix*; mais ils ſont plus grands, dit Thomas Candish *p.* 48.

3. FAISAN rouge de la Chine. *Phaſianus ſangnineus*; en Anglois *The red Pheaſant Cock from China*, ſelon Albin *Tom. III. n.* 36. *The plaiſant Pheaſant from China*, ſelon Edouard *II. p.* 68. Il eſt mal peint par Albin. Voyez en la femelle chez Edouard *fig.* 2. *p.* 63.

4. FAISAN blanc de la Chine. *Phaſianus Sinenſis, albus, capite nigris pennis dependentibus*; en Anglois *The White China Pheaſant*, ſelon Albin *Tom. III. n.* 37. La figure d'Albin ne vaut encore rien. Il eſt mieux dépeint & décrit chez Edouard *II. p.* 66. qui le nomme en Anglois *The black and White Chineenſe Cock Pheaſant with its Hen.*

5. FAISAN-PAON. *Phaſianus Pavoneus;* en Anglois *The Pea Cock Pheaſant from China.* Edouard *II. p.* 67. C'eſt un Oiſeau de la Chine, qui a la mâchoire ſupérieure rouge; il a deux éperons, des taches bleues en forme

d'yeux sur les petites plumes qui couvrent les grandes; elles sont vertes à la queue.

6. FAISAN brun. *Phasianus fuscus.* Edouard *II. p. 6.* Il a des yeux bleux-azur sur les plumes, qui sont d'un bleu obscur aux ailes & à la queue. C'est une varieté du précédent, & peutêtre sa femelle.

### *PERDRIX. Gallinaceus campestris major.*

1. PERDRIX grise. *Perdrix cinerea vulgaris.* Aldrovande, Gesner, Rai, & les autres; en Anglois *The commom Partridge*, Albin 1. *n.* 27. en Allemand *Gemeines Feldhuhn.*

2. PERDRIX de Damas. *Perdrix Damascena*, Aldrovande: plus petite que la précédente. *Damascener* en Alleman.

3. PERDRIX de la nouvelle Angleterre. *Perdrix novæ Angliæ*; en Anglois *The New England Partridge*, Albin *Tom. I. n.* 28. M. KLEIN doute si ce n'est pas la *Perdrix* du Bresil, qui est le *Jambu* de Pison. Il la nomme en Allemand *New-Engellander.*

4. PERDRIX rouge. *Perdrix rufa*, Aldrovande. *Perdrix Græca*; *Coturnice* en Italien. Celles de Grece sont plus grandes que celles de France. Celles d'Espagne & de Portugal sont mieux peintes; en Anglois *The red legg'd Partridge.* Albin *I. n.* 29. Edouard *II. p.* 70. parle de la *Perdrix* de Barbarie, qu'il nomme en Anglois *Red legg'd Partridge from Barbary.*

5. PERDRIX nommée *Alchata* ou *Filacotoa* par Aldrovande. *Alchata* est un nom Arabe, car cet Oiseau est fort commun en Arabie. On en voit à Montpellier. Charleton *pag.* 85. en donne la figure.

6. PERDRIX de la Virginie. *Perdrix Virginiana*; en Anglois *The American Partridge*, Catesby *App. p.* 12. Elle a sur la tête trois bandes noires; aux côtés deux d'un blanc sale; depuis le bec, le long de la tête, par derriere, une bande rouge & large.

*CAILLES. Gallinaceus campestris ; minor perdice ;* en Allemand *Wachtel.*

1. CAILLE vulgaire. *Coturnix vulgaris ; Quisquila ; Qualea ; Quaquila ;* en Allemand *Ovackel*, Schwenkfeld, Willughby, Rai. *Quaglia* par Olina *p.* 58. Albin *Tom. I. n.* 30. en donne la description & la figure.

2. CAILLE du Cap de Bonne-Espérance. *Coturnix Capensis. The Quail from the Cape of Grood Hope*, selon Albin *t.* 31.

## COQ DE BRUYERE.

*Lagopus ; Gallinaceus pedibus villosis, vel lanatis ; superciliis rubris.*

1. Grand COQ de Bruyere. *Lagopus maximus ; Urogallus major. Aver-hahn, aver Ochse ; Oh-hahn ; Berg-Fasan*, Schwenkfeld ; à queue divisée, *caudâ divisâ.* C'est le *Tetraon* de Pline & de Gesner ; le *Gallus Urus, Uragen Tetrao major* d'Aldrovande ; le *Gallo di montana* des Venitiens ; le *Cock of the montain* ou *Of the vood* de Willughby, & le *The montain cock from Moscovia* d'Albin *Tom. II. n.* 29. & 30. mâle & femelle, nommé par M. LINNÆUS *Tetrao rectricibus exterioribus subbrevioribus, alarum basi alba macula.* On en voit beaucoup à Dantzic & dans les Païs Septentrionaux. Il est parlé dans le *Catal. Avi. Petrop. p.* 312. d'un *Coq* de Bruyere de Guinée hupé.

2. Petit COQ de Bruyere. *Lagopus ; Urogallus minor ; Tetraon minor ; Attagen Alpinus ; Phasianus montanus ; Grygallus ; Gallus Betularum*, Schwenkfeld ; nommé par M. LINNÆUS *Tetrao remigibus secundariis à medio basin versus albis, caudâ bifurcâ.* Albin *Tom. I. n.* 22. donne la description & la figure du mâle, qu'il appelle *Coq de Bruyere* ou *Francolin ;* & *Tom. II. n.* 34. celle de la femelle.

3. GELINOTE. *Lagopus corylorum ; Gallus Gallina corylorum*, Gesner, Aldrovande. *Perdrix Alpina ; Attagen* de Charleton. Par M. LINNÆUS *Tetrao rectricibus-*

*cinereis, punctis nigris, fasciâ latâ nigrâ, exceptis intermediis duabus*; en Anglois *The Hazelhen*; en Allemand *Hasel-Hasselhum*; *Rotthun*, selon Schwenkfeld. Aristophane nomme en Grec cet Oiseau Ατλαγας.

4. PERDRIX blanche. *Lagopus simpliciter, Perdrix alba, Perdrix blanche* ou *Bartavelle* des Savoyards: chez les Grisons *Rabalino: Lagopus altera sive varia* de Gesner. *Pedum plantis quoque, prout leporum plantis, villosis; vel nivea, vel plumis fuscis varia:* nommée par M. LINNÆUS *Tetrao rectricibus albis, intermediis nigris, apice albis.* On en voit en Prusse, dans la Laponie, à Dantzic, mais il y a des varietés. Edouard II. *p.* 72. parle d'une *Perdrix blanche* de la Baye de Hudson, qui a une membrane rouge & charnue sur les yeux, & qui est plus haute que celles de cette espece. Roberg a fait l'anatomie de cet Oiseau.

5. COQ de marais d'Albin *Tom. I. n.* 23. 24. en Anglois *The Cock Radgame*: selon Willughby *The Gor Cock*, ou *Mor Cock*, ou *Radgame*. Le mâle est rouge, & a une hupe sur la tête. C'est le *Lagopus altera* de Pline.

6. COQ de marais de la Baye de Hudson. *Lagopus e fusco & albo in inferiore corporis parte, & fusco & nigro in superiore, ad oculos duabus lineis albis varia*, Edouard II. *p.* 71.

7. Petit COQ de Bruyere de l'Amérique, Catesby *App. p.* 1. *Lagopus seu Urogallus minor Americanus.* Il n'a point de cercle rouge autour des yeux. On ne sait de quel endroit de l'Amérique est cét Oiseau. Il a les pieds jaunes. Il est distingué de tous les autres Oiseaux de ce Genre, par ses petites ailes, qui sont attachées au col d'une maniere qui donne à l'Oiseau le pouvoir de les serrer ou de les étendre comme les autres. La femelle ne les a pas de même.

## GENRE XVII.

*PIGEONS*, Oiseaux mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Passeres.*

Ce Genre d'Oiseaux domestiques & sauvages a les

pieds rouges, courts, les ailes longues, la voix gémissante. Ils different entr'eux par le bec. Les uns l'ont plus menu, les autres plus gros, les autres plus courts, les autres plus longs; cependant leurs deux mâchoires sont faites comme celles des Oiseaux du Genre précédent. Ils se nourrissent comme eux de grains & de gland. Ils volent haut, & se tiennent longtems en en l'air. Ils sont *Monogames*, c'est-à-dire, ne s'attachent qu'à une seule femelle. Les domestiques varient par les couleurs, comme nos *Poules domestiques*. Gesner & Aldrovande en donnent de plusieurs espèces. Voici les plus connues.

1. PIGEON commun. *Columba Rusticorum, vulgaris, arvorum;* en Anglois *The commom Pidgeon* ou *Dove, Dove Housepigeon*, selon Dale, Tayler. Albin *Tom. III. n.* 42. le nomme *Pigeon sauvage*. Sloane *p.* 302. parle de ceux de la Jamaïque. Oviedo *l.* XIV. *c.* 3. dit qu'ils sont semblables à ceux de la nouvelle Espagne.

2. PIGEON de Fuie. *Columba gutturosa;* en Anglois *Kroppers Dove*. Cette espece de *Pigeon* & les autres domestiques proviennent du grand *Pigeon* à collier. *Palumbus major torquatus*, ou des *Pigeons fuyards, vinagines*. C'est le sentiment de M. LINNÆUS, mais M. KLEIN en doute.

3. PIGEON à large queue. *Columba laticauda; tremula Pavonia*, parcequ'il fait la roue avec sa queue, comme le *Paon*; en Anglois *Bread-tail'd Shaker;* en Allemand *Pfau-Taube*.

4. PIGEON Messager, ou Courier. *Columba Tabellaria, cera magna in rostro*; en Anglois *The Horsman Pidgeon*, Albin *Tom. II. n.* 45. en Allemand *Pavedette*.

5. PIGEON à Capuchon, ou JACOBIN. *Columba cucullata;* en Hollandois *Capper;* en Anglois *Jacobine*, Albin *Tom. III. n.* 43. Il y a des varietés dans cette espece; les uns ont les pieds nuds, les autres ont les pieds garnis de plumes. A cette espece appartiennent les *Tympanista*.

6. PIGEON Turc. *Columba Turcica; Turbita*, dont le bec

bec eſt turbiné ; *Gyratrix*, parce qu'il fait la roue ; *Columba nothus*, parceque c'eſt un *Pigeon* bâtard.

7. PIGEON à collier. *Columba torquata. Palumbus major torquatus, ferax avis*, Aldrovande ; en Anglois *The Ring Dove* ou *Queeſt*, Dale ; nommé par M. LINNÆUS *Columba collo utrinque alba, pone macula fuſca* ; en Allemand *Ringel-Taube* ; *Ploche-Taube*. Il a le bec un peu jaune, couvert d'une peau pouprée, où ſont les narines. Sa couleur eſt un noir bleuâtre, qui varie ſuivant les différentes réflexions de la lumiere. Il eſt plus grand que celui qui ſuit.

8. PIGEON de bois. *Columba lignorum ; Palumbus ſimpliciter*. Par M. LINNÆUS *Columba cæruleſcens, collo nitido, maculâ duplici alarum nigricante*. En Allemand *Holtz-Taube*.

9. PIGEON de Rocher. *Columba Rupicola ;* en Anglois *The Rock Pigeon*, ſelon Willughby ; & qui peut être la *Columba ſaxatilis* d'Aldrovande ; en Allemand *Felſen Taube*.

10. RAMIER. *Columba Livia*, Geſner ; en Anglois *The Stock Dove* ou *Wood Pidgeon*, Dale, Willughby, & Albin 2. *n.* 46. & 3. *n.* 44. Biſet.

11. PIGEON ſauvage de l'Iſle de S. Thomas. *Columba ex inſulâ S. Thomæ ſylveſtris*, Willughby & Marcgrave.

12. TOURTERELLE ; en Grec Τρυγων ; *Columba turtur* ; en Anglois *Turtle Dove*, Albin 2. *n.* 47. *Palomas tortoras quelas Eſpanola*, Oviedo XIV. *c.* 2. qui peut être le *Turtur auritus* ; en Anglois *Eardowe*, de Sloane *p.* 304. *t.* 262. *Furtul-Taube* en Allemand.

13. TOURTERELLE des Indes. *Columba Turtur Indica*, Aldrovande *l.* 15. *c.* 9. en Anglois *The Turtle Dowe from India*, Albin *Tom* 3. *n.* 45. En Allemand *Lach-Taube*.

14. COLOMBE de Portugal. *Columba Portugalenſis, ex Turturum Tribu*, Albin *Tom.* 2. *n.* 48.

15. COLOMBE à tête noire de la Jamaïque. *Columba capite nigro. Turtur Jamaïcenſis* ; en Anglois *A Turtle Dowe from Jamaïca*, Albin 2. *n.* 49.

16. PIGEON de paſſage, de la Caroline. *Columbus*

*Palumbus Carolinienſis*, Cateſby *p.* 23. Edouard 1. *p.* 15. donne la deſcription d'un *Pigeon* de l'Amérique d'une élégante varieté. Il le nomme en Anglois *The long-tail'd Dowe.*

17. TOURTERELLE de la Caroline. *Columba Turtur Carolinienſis.* Cateſby *p.* 24. en Anglois *The Turtle of Carolina.*

18. Pigeon à couronne blanche. *Columba capite albo*, Sloane 2. *t.* 261. en Anglois *The white crown'd Pigeon.* Cateſby en parle *p.* 25. Il y en a un autre petit à couronne blanche, *Columba minor capite albo*; en Anglois *The bald pate*, dont parle Sloane *p.* 303. un autre dont parle Rai, qu'il nomme *Columba minor leucocoryphos*; & un autre nommé *Goritas* par Oviedo *l.* 4. *c.* 2. Ces *Pigeons* ne peuvent differer que par quelques varietés.

19. PIGEON des Indes Orientales, plus petit que notre *Tourterelle. Columba Turture noſtrate minor, principibus coloribus ſuperbiens.* Edouard *I. p.* 14.

20. TOURTERELLE des Indes Orientales. *Columba Turtur Ind. Orientalis, alis dorſoque ex cinereo ſeriatim quaſi ſquammatis.*

21. Beau PIGEON de la Chine. *Columba Sinenſis elegans*, Albin *Tom.* 3. *n.* 46.

22. PIGEON dont la queue eſt entourée de cercles. *Columba caudâ torquatâ, ſeu faſciâ notatâ*, Sloane *p.* 302. *Columba caudâ faſciâ fuſcâ notatâ velut annulo cinctâ.* Rai.

23. PIGEON de Nincombar aux Indes. *Columba Nincombar, Indica*; en Anglois *The Cock and Hen*, Albin *Tom.* 3. *n.* 47. 48.

24. Petite TOURTERELLE. *Columbus minimus*; *Turtur minimus guttatus*; en Anglois *The Ground Dove*, Cateſby *p.* 26. Sloane *p.* 305. *t.* 264. Rai la nomme *Turtur minimus alis maculoſis.* M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt l'*Orletan* de la Martinique de Labat & de du Tertre, ou le *Picui pinima* de Marcgrave, ou la petite *Tourterelle* des Barbades de Willughby & de Rai.

25. PIGEON de Guinée au bec noir. *Columba Guineenſis roſtro nigro.* Edouard *II. p.* 75.

26. PIGEON brun des Indes. *Columba Indica fusca* Edouard *II. p. 76.* Cet Oiseau, comme le précédent, a une membrane, mais bleue, qui fait le tour des yeux.

27. PIGEON cavalier d'Albin *Tom. II. n.* 45.

## GENRE XVIII.

Différentes especes de *Grues*, mises par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Scolopaces.*

Les Oiseaux de ce Genre sont grands, leurs ailes en volant font du bruit. Ils volent en troupe, veillent, & placent des sentinelles, de peur qu'on ne les insulte, font leur nid dans des lieux marécageux & de difficile accès. La *Grue* differe du *Héron*, 1°. par sa grandeur. 2°. Par l'ongle du doigt du milieu, ou plutôt par le doigt même, qui n'est pas dentelé. 3°. Par son bec qui est plus court. 4°. Par son ventricule, qui est musculeux. 5°. Par la trachée artere, ou conduit par où l'air entre dans le poumon, qui est singulier, au rapport de Schwenkfeld. La *Grue*, en Grec γέρανος, en Allemand *Kranich*, parceque cet Oiseau va chercher les semences qui sont dans la terre. Une jeune *Grue* est nommée *Vipio* en Latin.

1. GRUE. *Grus nostras, Avis Palamedis*; en Anglois *The Crane*, Willughby, Albin *Tom. II. n.* 65. Marsilly *t.* 1. En Allemand *Graver Kranich.* Sa queue est composée de plumes flotantes.

2. GRUE des Indes. *Grus Indica.* Elle a le bec un peu plus long que la précédente, la queue courte, & couverte par les ailes.

3. GRUE Baléarique. *Grus Balearia*, Aldrovande, Willughby, Sloane *p.* 314. Rai *p.* 95. qui est le *Pavo marinus* de Clusius. Charleton en donne la figure, & il en parle sous le nom de *Grue du Japon.* Aldrovande & Willughby en donnent la description.

4. GRUE du Japon. *Grus Japonensis*; *Grus Americana alba*; en Anglois *The hooping Crane*; nommée par

Catesby *p.* 75. *Grue blanche de l'Amérique ;* en Allemand *Weisser Krahn.* Elle est toute blanche, excepté le bec, le bas du col, les pieds & les ailes. Le haut de la tête est d'un beau rouge, & marqué de taches noires.

5. Grande GRUE des Indes. *Grus Indica major ;* en Anglois *The greater Indian Crane*, Edouard *I. p.* 45. Son col tire sur le blanc. Elle a la tête & le premier article du corps rouges, le haut de la tête blanc, proche des yeux une tache ronde & blanche, le bec vert, les pieds couleur de rose.

6. GRUE de Numidie. *Grus Numidiæ ;* en Anglois *The Numidian Crane*, Albin *Tom. III. n.* 83. C'est ce que nous nommons en François *Demoiselle.*

Le *Jabiru* de Marcgrave, le *Negro-Jabiruguacu* du même, le *Cariama*, sont des especes de *Grues.* En Allemand *Fraulein auf Numidica.* Elle a le bec jaune, & le bout rouge.

## GENRE XIX.

Oiseaux que M. KLEIN nomme *Hamiota.* Ils cherchent leur nourriture dans les eaux, & font un grand dégât de Poissons. Ce Genre est composé de trois especes différentes. La premiere sont les *Hérons*, la seconde les *Cigognes*, la troisiéme des Oiseaux qui ont le bec irrégulier, ou singulier.

### TRIBU PREMIERE.

*HÉRONS*, mis dans l'Ordre des *Aves Scolopaces* par M. LINNÆUS.

Ces Oiseaux sont nommés en Latin *Ardea*, *Herodias*, *Ardua*, parcequ'ils volent fort haut. Ils ont les doigts très-longs, l'ongle du doigt de derriere plus long que ceux des autres. Le dernier doigt de devant tient à une membrane jusqu'au premier article ; ils s'en servent pour nager. Celui du milieu est comme une scie par ses côtés ; il leur sert pour se tenir sur

les arbres, au haut desquels ils font leurs nids. Le doigt de derriere, comme dans les autres Oiseaux *Tetradactyles*, ne répond pas diametralement au doigt du milieu de devant; mais placé de côté, il répond au dernier. Les *Hérons* qu'a observé M. KLEIN, ont le bec pointu comme une *aleine*. Quelques-uns ont de longues plumes pendantes sur la tête. Le bec de quelques *Hérons* étrangers est un peu différent. Le *Héron* n'a qu'un simple intestin *cæcum*, au lieu que les autres Oiseaux l'ont double.

1. HÉRON cendré. *Ardea pella, pulla, cinerea*, selon Schwenkfeld; en Grec Πελλος par Aristote; *Ardea cinerea major* de Willughby; par M. LINNÆUS *Ardea crista dependente*. Albin *Tom. I. n.* 67. & *Tom. III. n.* 78. en Anglois *The crested Heron, The common Heron*; en Allemand, *Reihel Heergans*. M. KLEIN dit avoir tué le 2. Juillet, proche Dantzic, un *Héron* varié de bleu; tel que celui dont Albin *Tom. I. n.* 67. donne la description & la figure.

2. Grand HÉRON blanc. *Ardea alba major*, Willughby. *Ardea candida*. Λευκερωδιος par Aristote. *Albardeola*; nommé par M. LINNÆUS *Ardea alba tota, capite lævi*. Cet Oiseau est plus petit que le précédent. Il y a le petit *Héron blanc* du Comte de Marsilly, & le grand *Héron blanc* de Sloane *II. p.* 314. *t.* 266. de Rai *p.* 189. Le *Guiratringa* de Marcgrave n'a point de plumes sur la tête.

3. HÉRON noir. *Ardea nigra*; en Grec Μελανοκραvος; *Ardea palla*; *Ardea cærulea-nigra* de Sloane *p.* 315. *t.* 263. C'est le *Crabier* de Labat. M. KLEIN dit n'avoir point vu de cette espece de *Héron*.

4. HÉRON étoilé. *Ardea stellaris*. Ασερίας Ερωδιος par Aristote; *Oknos*; *Ardea palustris, vel arundinum, piger*; *Botaurus*; *Asinus*, selon Schwenkfeld. Par M. LINNÆUS *Ardea vertice nigro, pectore pallido, maculis longitudinalibus nigricantibus*; en Anglois *The Bittern*, Albin *Tom. I. n.* 68. On le nomme *Botaurus & Asinus*, parcequ'avec son bec, qu'il plonge dans l'eau, il imite le beuglement du *Bœuf*, ou le brayement de l'*Ane*.

5. HÉRON varié, ou CORBEAU de nuit, ou *Nycticorax*. *Ardea varia*, selon Schwenkfeld. Νυκτικοραξ en Grec, selon Gesner. *Corvus nocturnus* par Agricola. *Ardea cinerea minor Nycticorax*, selon Willughby, & le Comte de Marsilly *t.* 3. Il a le bec & les pieds rouges, & trois plumes longues sur la tête.

6. Petit HÉRON étoilé. *Ardea stellaris minima.* Petit *Butor* de Catesby *p.* 80. *Ardea stellaris minor*; en Anglois *The small Bittern.* Rai & Sloane *p.* 315. *t.* 263. En Allemand *Grune Nachtrabe.* Il a le bec noir, la tête & le dos verds, les ailes verdâtres, les pieds bruns, de longues plumes, le col & la poitrine de couleur de tuile.

7. HÉRON bleu. *Ardea cyanea*; *Ardea cærulea*; en Anglois *The blew Heron*, Catesby *p.* 76. Albin *Tom. III. n.* 79. Il a les pieds tirant sur le verd. En Allemand *Hochblaner Carolinscher Reyger.*

8. HÉRON brun, ou *Héron étoilé* de l'Amérique. *Ardea Fusca*; *Ardea stellaris Americana*; en Anglois *The brown Bittern*; *Butor brun* par Catesby *p.* 78. M. KLEIN ne sait si c'est celui dont le Comte de Marsilly parle *pag.* 24. t. 10. En Allemand *Braaner Reyger.* Cet Oiseau est plus petit que le *Nycticorax* a un bec long de quatre pouces, noir par dessus, verd par dessous, de grands yeux, & une iris dorée.

9. HÉRON étoilé hupé de l'Amérique. *Ardea stellaris cristata America*; nommé *Butor hupé* par Catesby *p.* 79. en Anglois *The crested Bittern*; en Allemand *Blaver Reyger.* Il a les yeux grands & l'iris rouge, la peau verte autour des yeux. Ces *Hérons* se nourrissent de *Cancres* dans l'Isle de Bahama.

10. Petit HÉRON blanc de la Caroline. *Ardea alba minor Carolinienſis*; en Anglois *The little white Heron.* Catesby *p.* 77. Il a le bec rouge, un peu courbe, l'iris jaune, les pieds verds, & le reste blanc.

11. HÉRON Porphyrio d'Amboïne. *Ardea Porphyrio Amboïnenſis, ſeu Ardea rubra corallina.* C'est une espece d'*Ibis*, dit Seba *I. p.* 98. *t.* 62. Voyez Willughby *p.* 212. Belon *p.* 199. Hérodote en parle. Il a le bec un peu courbé, les doigts, le col, & le tronc entier,

faits comme les *Hérons*. Edouard *Tab. itiner.* M. KLEIN *Prodrom. Avi. Part. III.* où il eſt parlé du paſſage des *Cicognes*, & de l'*Ibis* noir & varié. C'eſt l'*Oiſeau pourpre* d'Albin *Tom. III. n.* 84. en Allemand *Rohter Reyger.*

12. HÉRON cendré jaunâtre, nouvelle eſpece du Comte de Marſilly *p.* 20. *t.* 8. *Ardea cinerea flaveſcens;* en Allemand *Graugelblicher Reyger.* On dit qu'il eſt ſemblable au *Héron cendré.* Il a le bec & la tête plus longs, le col cendré, des lignes noires & brunes juſqu'à la poitrine, le ventre cendré.

13. HÉRON verd jaune, nouvelle eſpece du Comte de Marſilly *p.* 22. *t.* 9. *Ardea viride-flaveſcens, nova ſpecies*; en Allemand *Gruen-gelber.* Le bec a trois pouces de long; le deſſus eſt noir, le bas fauve, l'iris des yeux blanche.

14. Grand HÉRON hupé de l'Amérique. *Ardea criſtata maxima Americana*, Cateſby *Append. p.* 10. en Anglois *The largeſt creſted Heron.* C'eſt un Oiſeau de la Virginie, que M. KLEIN nomme en Allemand *Hoechſter Americanſcher Reyger.* Cet Oiſeau a quatre pieds & demi de haut.

On peut ſur les *Hérons* conſulter Willughby, Aldrovande & Marcgrave; Feuillée *Journal III. p.* 57. touchant un grand *Héron* varié de Chili, un *Héron* varié *p.* 268. un *Héron cendré* à gros bec *p.* 411. qui peutêtre eſt le *Héron* du *n.* XII. dont nous avons donné la notice.

## TRIBU II.

### *CICOGNES*, miſes dans l'Ordre des *Aves Scolopaces* par M. LINNÆUS.

Ces Oiſeaux ſont rares en Italie & en Angleterre. Ils ont le col plus court & plus gros que les *Hérons.* Les ongles des doigts ſont ſi larges, qu'ils reſſemblent à ceux de l'*Homme.* Ils font avec leur bec une eſpece de cliquetis en approchant les deux mâchoires l'une de l'autre; d'où le nom Latin *Crotaliſtria*, qu'on leur a donné.

1. CICOGNE blanche. *Ciconia alba*; en Anglois *The white Storck*, Willughby, Albin *Tom. II. n.* 64. Marsilly *t.* 2. C'est un Oiseau assez connu, que les Allemands nomment *Bunte, Weisse, Gemein Storch.*

2. CICOGNE noire. *Ciconia nigra*, Willughby. *Ciconia fusca*, Schwenkfeld; en Allemand *Schwartze Storch.* Il y en a en Pologne, Lithuanie & Prusse. Elles y font leur nid dans les lieux écartés des forêts. La figure qu'en donne Albin n'est pas représentée avec de vives couleurs. Willughby leur donne un bec verd; il s'est trompé. M. KLEIN dit que ces Oiseaux ont le bec & les pieds rouges.

3. CICOGNE de l'Amérique. *Ciconia Americana.* C'est le *Maguari* de Marcgrave. Willughby en parle sans en donner la figure. Il paroît cependant qu'outre le bec, dont la moitié est jaune & l'autre cendrée, elle ressemble assez à la *Cicogne* blanche.

## TRIBU III.

Oiseaux à bec irrégulier, *Anomaloroster*, dont le bec est fait en forme de cuillere, ou sinueux, ou conique, & courbé au bout.

### *PALETTES*, mises dans l'Ordre des *Aves Scolopaces* par M. LINNÆUS.

1. PALETTE. *Platea*, *seu Pelecanus*: Πελεκανος en Grec par Aristote; *Leucorodius* par Aldrovande. *Albardeola. Anser Cochlearius*; *Cochlearia*; *Anser platyrynchus* par Schwenkfeld; *Anomaloroster* par Willughby; *Alba Ardeola* par le Comte de Marsilly *t.* 12. en Anglois *Spoonbill* par Albin *Tom. I. n.* 66. *Beccaroveglia* en Italien; *Calpetre* en Russien; *Lepelaer* en Flamand; *Loeffelgans Pelican* en Allemand. Albin a mal dépeint cet Oiseau, & il est mal décrit dans Willughby, dit M. KLEIN. Il a le bec jaune. Les jeunes ont le bec & les pieds noirs; c'est dont convient Willughby. M. KLEIN a eu vivant un de ces Oiseaux, qui étoit tout blanc, excepté le bec & les pieds. Il

eſt nommé par Albin *petit Heron* ou *Bec à cuillere*.

2. PALETTE du Breſil. *Platea Braſilienſis* ; nommée *Ajaja* ; *Colherado* par les Portugais, diſent Marcgrave & Willughby. Celles de l'Iſle de Surinam ont le bec noir, & celles du Breſil, couleur d'ivoire. Ce peut être la *Platea incarnata* de Sloane *p.* 316. Les Allemands la nomment *Roſenfenfarbener Lœffler*.

3. PALETTE de couleur ſanguine. *Platea ſanguinea tota*. C'eſt le *Thlanquechul* ou *Platea Mexicana* d'Hernandez & de Nieremberg; en Anglois *The American ſcarlet Pelican* ou *Spoonbill* ſelon Rai. Le bec eſt cendré, & tout le corps couleur de ſafran.

4. FLAMANT ou PHŒNICOPTERE. *Phœnicopterus*. Plin. Aldrovand. Seba *I.* 103. *t.* 67. Cateſby *p.* 73. Albin *Tom. II.* n. 77. Willughby *pag.* 240. Grew. *Muſ. Reg. p.* 67. Douglaſſ *Phil. Tranſact. n.* 350. Du Tertre ſous le nom de *Flamant*. Frezier *p.* 74. Labat. *Paſſer Flaminga*, Smiths *Obſerv. p.* 54. Sloane *p.* 321. *Flamenco* par Laet I. *c.* 11. *p.* 13. En Anglois *The Flamingo*. Ariſtophane eſt le premier qui lui a donné le non de Φοινικοπτερος à cauſe de ſes rouges plumes: φοινικεος, *puniceus*, & πτερον, *ala*. Philoſtrate *l.* 8. *p.* 387. le nomme Ορνις φοινικεος; Geſner *Avis rubra*; Aldrovande *Fiamingo*; Charleton *Phœnicopter*. Il eſt tout rouge, excepté ſix plumes noires qu'il a aux ailes.

5. TANTALE, ou PELICAN d'arbre de l'Amérique. *Tantalus; Loculator; Pelicanus Americanus arboreus*; en Anglois *The Wood Pelican*, Cateſby *p.* 81. Oiſeau monté ſur de grandes jambes, approchant de la grandeur d'un *Oie*. Son bec a neuf pouces & $\frac{1}{2}$ de long; il eſt conique, courbé au bout, & a de tour à ſa baſe trois pouces & un quart. Il a la queue & les pieds noirs, & les premiers articles des doigts joints par une membrane. C'eſt un Oiſeau ſtupide, auſſi bien que le *Flamand*, & la *Palette*. Les Perſans le nomment *Tacab* & *Miſe*, ſelon Chardin *III. c.* 9. *p.* 40. Quand il ouvre le bec, un *Agneau* y paſſeroit. Il fréquente les arbres, & il y fait ſon nid.

6. BEC à ſpatule, de la Côte Occidentale d'Afrique. Labat *Afriq. Occid.*

## GENRE XX.

Oiſeaux auxquels M. KLEIN donne le nom de *Jaculator*; en Allemand *Harpunierer*, en François *harponnier*, parceque leur bec eſt fait comme le *Harpon* dont on ſe ſert pour frapper les Poiſſons cetacés. Ils ont les pieds courts, trois doigts devant, & un derriere. Leur tête, vû le volume de leur corps, eſt très-ample. Leur bec eſt pointu par le bout, ils s'en ſervent pour frapper les Poiſſons.

1. HARPONNIER, eſpece de *Heron* ſingulier du Mexique. *Jaculator; Ardeæ Mexicanæ ſpecies ſingularis*, Seba *I. p.* 101. *t.* 65. *n.* 2. Il frappe les Poiſſons en volant. En Allemand *Schwarber Harpunier.* Il a la poitrine & les ailes d'nn marbre cendré, le reſte eſt noir, ſes cuiſſes ſont groſſes, les doigts couverts d'écailles, & les ongles allongés.

2. HARPONNIER cendré. *Jaculator cinereus*; *Pica Mexicana*, ſelon Seba *I. p.* 101. *t.* 64. *n.* 6. En Allemand *Dunckelgraver Harpunier.* Il eſt d'un rouge tranſparent, & de la grandeur d'une *Pie.*

3. HARPONIER coeffé de rouge. *Jaculator mitella rubra.* Seba *I. p.* 100. *t.* 64. *n.* 3. En Allemand *Rohtgekapter Harpunier.*

Suivant la méthode de M. LINNÆUS on pourroit mettre ces Oiſeaux, ſavoir le premier & le troiſiéme, dans le rang des *Herons*, c'eſt-à-dire dans l'Ordre des *Aves Scolopaces*; & le ſecond dans le rang des *Aves Picæ.* M. KLEIN ne trouve aucune raiſon pour les placer ainſi, & il en fait le vingtiéme & dernier Genre de la quatriéme Famille de ſes Oiſeaux.

# FAMILLE V.

Oiſeaux PALMIPEDES, TETRADACTYLES, dont le doigt de derriere eſt ſimple.

*Plotti, ideſt Palmati, Tetradactyli, digito poſtico ſimplici.*

CES Oiſeaux ont les jambes courtes, les trois doigts de devant entierement joints enſemble par une forte membrane, ce qui fait qu'on les appelle en Latin *Plotti* ou *Palmati*, en François *Palmés*.

Entre ces Oiſeaux, il y en a qui ont le bec plat, *platiroſter*. C'eſt le premier Genre, qui compoſe deux eſpeces, les *Oies* & les *Canards*. Les autres ont le bec en forme de cone, *coniroſter*. Ce Genre d'Oiſeaux ſont les *Lares* ou *Mouettes*.

## GENRE PREMIER.

*OIES* & *CANARDS*, Oiſeaux à bec plat, ou bec large; *Latiroſter*, ou *Platiroſter*, mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Anſeres*.

### I.

*OIE. Anſer.* En Allemand *Die Gans.*

L'*Oie* ſe diſtingue du *Canard* par la grandeur de ſon corps, par ſon dos élevé, ſon col long, ſon bec fort, ſes pieds qui ſont & plus élevés & plus proches du milieu du ventre, au lieu que ceux des *Canards* ſont plus proches du croupion, ce qui fait qu'ils vacillent en marchant. La poitrine des *Oies* eſt élevée. On entend de plus loin leur cri. On peut ſur les grands Oiſeaux *Palmipedes* à large bec, qui eſt le Genre des *Oies*, conſulter le *Catalog. Avi Petropolit. p.* 405.

1. CYGNE. *Anſer Cygnus*; en Grec Κυκνος; en Anglois *The tame Swan*; *The Cygnes*; en Allemand *Schwan*

*Gans.* Willughby, le Comte de Marſilly *pag.* 98. *t.* 47. Albin *Tom. III. n.* 91. & les autres parlent de cet Oiſeau. Il eſt nommé *Anſer maximus.*, parcequ'il eſt plus grand que l'*Oie.* M. KLEIN lui donne depuis l'extremité du bec juſqu'au bout de ſa queue 55 pouces; juſqu'aux ongles 57. les ailes étendues, ſept pieds & huit pouces de large. Willughby met de la différence entre le *Cygne* domeſtique, & le *Cygne* ſauvage; mais cette différence eſt peu de choſe. Dale en parle *pag.* 271. 272. On peut conſulter Wormius ſur le chant du *Cygne.* Voyez ſur le *Cygne Prodrom. Avi. Part. III.* de M. KLEIN. M. LINNÆUS le nomme *Anas roſtro ſemicylindrico, cerâ flavâ, corpore albo.* M. KLEIN dit *cerâ nigrâ.*

2. OIE domeſtique. *Anſer domeſticus, ruſticus*; *The Gooſe* en Anglois; en Allemand *Paver-Hauszahme Gans.* C'eſt le plus grand Oiſeau *Palmipede* après le *Cygne.* Il y a des varietés dans ces Oiſeaux pour le plumage.

3. OIE. ſauvage. *Anſer ferus.* En Anglois *The common Wild Gooſe.* Willughby, le Comte de Marſilly *pag.* 100. *t.* 48. Albin *I.* n. 90. en parlent. Il eſt nommé par M. LINNÆUS *Anas roſtro ſemicylindrico, corpore ſupra cinereo; ſubtus albido, rectricibus margine albis.* On en voit beaucoup ſur les rivages d'Angleterre. En Allemand *Wilde Gans.* Elle eſt plus petite que l'*Oie domeſtique.* Elle a le bec tout noir.

4. OIE d'Eſpagne, ou plutôt *Oie de Guinée*; en Anglois *The ſwaan Gooſe*, Willughby, Albin *Tom. I. n.* 31. C'eſt l'*Anſer Hiſpanicus ſeu Cygnoïdes* du Comte de Marſilly *pag.* 104. *t.* 50. Il ſurpaſſe en grandeur l'*Oie domeſtique*; il a le bec noir. Le Comte de Marſilly en donne un deſcription différente de celle de M. KLEIN. En Allemand *Spanſche Gans.*

5. OIE de Ruſſie ou de Moſcovie. *Anſer Ruſſicus*; en Anglois *The Moſcovian Gander and Gooſe*, Albin *Tom. 2. n.* 31. & 32. Cet Oiſeau eſt plus petit que le précédent, & a le bec d'un rouge tirant ſur le jaune. Il y a quelques varietés dans l'*Oie* de Siberie; en Allemand *Siberiſche Gans.*

6. OIE de Canada. *Anſer Canadenſis*; en Anglois *The Canader Gooſe*, Willughby, Catelby *p.* 92. Celui

dont parle Albin *Tom. I. n.* 92. & qu'il nomme en Anglois *Canade-Gooſe*, eſt différent de celui de Cateſby. Il faut le mettre parmi les Oiſeaux qui ont le bec en forme de cone. La mâchoire ſupérieure eſt plus longue. En Allemand *Canadenſer.*

7. OIE de Chili. *Anſer Chilenſis*, Charleton. Ce peut être celui que Willughby nomme *The Gambo.* Cet Oiſeau a un fort aiguillon au premier article des ailes. Il a le corps blanc, le dos pourpré, luiſant, les pieds & le bec rouges. En Allemand *Gambenſer.*

8. OIE de Brenta ou CRAVAN. *Anſer Brenta*; en Anglois *The Brent Gooſe*, Willughby; en Allemand *Brent-Gans*; *Baum-hans.* Voyez Martens *l.* 4. *c.* 3. Dale *p.* 403. *p.* 404. *Brentus*, ſelon Rai; *Brenta, ſeu Bernicla minor*, ſelon Willughby. *Bernicla.* En Anglois *The Bernacle* ou *Clakis*, ſelon Sibbald. Tous ces différens noms ſont autant de varietés. Aldrovande donne la figure de quatre. Les deux premieres ſont des *Bernacles.* Les deux autres ſont des *Clacides.* On en voit beaucoup pendant l'hiver ſur les côtes Septentrionales de l'Angleterre. Voyez les *Lettres Philoſophiques* de Johnſon *p.* 121. & Caius *Rar.* touchant l'*Oie* de Brenda *p.* 87.

9. TADORNE de Belon. *Tadorna*; *Vulpanſer*; *Bergander* de Willughby; en Anglois *The Shell Drake* ou *Burrough Duck*, ſelon Dale *p.* 405. Albin *Tom. I. n.* 94. Marſilly *p.* 106. *t.* 51. Cet Oiſeau eſt nommé *Vulpanſer*, parceque, comme le *Renard*, il fait ſon nid dans des trous de terre. On voit de ces Oiſeaux en Gotlande & en Pruſſe. En Allemand *Fuchs-Gans.*

10. OIE à plumes très-molles ou EGLEDON. *Anſer plumis molliſſimis.* Cet Oiſeau approche plus de la figure de l'*Oie* que du *Canard.* On en voit dans les Iſles de *Fero*, dit Wormius *p.* 302. Edouard II. *p.* 98. en parle, & le nomme en Anglois *The great black and white Duck.* Ces Oiſeaux font leurs nids ſur la cime & la penchant des rochers. Leurs plumes ſont fort eſtimées. Sibbald en parle, & M. Anderſon. On les nomme en Allemand *Fider Gans.* Meſſieurs LINNÆUS & Anderſon le mettent dans le rang des *Ca-*

*nards.* M. KLEIN dit que pour ſa figure il doit être dans celui des *Oies.*

11. OIE de neige. *Anſer grandinis, nivis, hybernus,* ſelon SCHWENKFELD. C'eſt un autre Genre d'*Oie*, dont parle le Comte de MARSILLY *p.* 102. *t.* 49. Cet Oiſeau eſt tout blanc, excepté les quatre ou cinq dernieres plumes des ailes, qui ſont noires. On en voit l'hiver, & le Comte de Marſilly en donne la deſcription. Les Allemands le nomment *Schnee-Gans; Hagel-Gans.*

12. OIE, nommé *Embergooſe* par SIBBALD. *Anſer, Embergooſe dictus*; en Allemand *Embergans.* Cet Oiſeau ſe trouve en Zetlande. PRESTON, *Tranſact. Philoſ. n.* 473. *p.* 61. dit que cet *Oie* fait éclore ſes œufs en les tenant ſous ſes ailes; & c'eſt une fable que de croire, comme on le rapporte, qu'il conſtruit ſon nid au fond de l'eau, & qu'il y couve ſes œufs. Cet Oiſeau n'eſt pas un Poiſſon, comme le remarque M. KLEIN.

13. OIE nommée *Duntergooſe* par SIBBALD. *Anſer Duntergooſe;* en Allemand *Duntergans.* Cet Oiſeau, dit PRESTON au même endroit des *Tranſactions Philoſophiques*, ſe trouve dans les Iſles Orcades, principalement dans celles de Ketha & de Zetlande.

## II.

### CANARDS.

Nous avons marqué plus haut la différence qu'il y a entre les *Oies* & les *Canards.* Elle provient de la ſituation de leurs pieds. Ils ont les pieds plus proche du croupion, ce qui leur donne le moyen de nâger avec plus de force. Voyez ſur les petits Oiſeaux palmés a large bec, qui ſont le Genre des *Canards*, le *Catalog. Avi. Petropol. p.* 406.

1. CANARD domeſtique. *Anas domeſtica, vulgaris. Anas fuſca* par le Comte de Marſilly *p.* 122. *t.* 59. *Anas cicur* par SCHWENKFELD; en Anglois *The common tame Duck*, ſelon WILLUGHBY. Ils different entr'eux

par la couleur; & on distingue le mâle de la femelle par deux ou trois plumes crepues qu'ils ont sur la queue, proche du croupion.

2. CANARD d'Inde. *Anas Indica*, Gesner; *Anas Turcica*. Peutêtre le même que l'*Anas procerior Hispanæ insulæ Columbi*, dont parle Schwenkfeld; l'*Anas moschato*, & peutêtre le *Caltrina* d'Aldrovande; l'*Anas Libica, Cairina*, d'Aldrovande, de Willughby, & du Comte de Marsilly, qui parle du mâle & de la femelle *t.* 56. 57. ainsi que Sloane *p.* 324. Rai 190. 191. & Belon; en Anglois *The Muscowy Duck*, selon Willughby; en Allemand *Turckische Endte; Frembde Ente; Indianische Endrach*. Voyez le *Canard d'Inde*; & un autre *Canard Turc* dans Caius *Rarior. pag.* 89. & *p.* 31.

3. CANARD sauvage. *Anas sylvestris vera*, selon Albert le Grand; *major*, selon Peucer; *Anas fera prima seu torquata minor* par Schwenkfeld; *Boscas major* par Willughby, qui le nomme en Anglois *The common wild Duck*. Celui d'Albin *Tom. II. n.* 100. est une varieté. Voyez Dale *p.* 404. en Allemand *Gemeine wilde Endte*. C'est un Oiseau assez connu. Schwenkfeld dit qu'il est de passage, & qu'il cherche les lieux chauds. On en voit tout l'hiver en Allemagne. L'*Anas fera secunda, seu torquata major* de Schwenkfeld, en Allemand *Star-Endte, Sterlz Endte*, en est une varieté, ou même l'*Anas fera prima*. Il vole par paires au mois de Mars, dit M. KLEIN. On peut encore rapporter à cette espece de *Canard*, le *Cerra* d'Albin, qu'il nomme en Anglois *The wild Duck*, *Tom. I. n.* 99.

4. Petit CANARD ou CANARD médiocre. *Anas mediocris*. C'est le Βοσκας d'Aristote, & l'*Anas fera quinta seu media* de Schwenkfeld, que Gesner nomme en Allemand *Mittel Endte*.

5. CANARD sauvage à tête brune, de moyenne grandeur. *Anas fera fusca vel media* de Gesner; *Anas fera octova seu Evrythrocephalus I.* de Schwenkfeld; *Penelope* par Aldrovande, qui peut être l'*Anas fistularis*. Willughby le nomme en Anglois *The common Wigeon*,

ou *Whewer*; en Allemand *Braun-Endte*. A cet Oiſeau appartient l'*Anas fera fuſca* de Geſner & d'Aldrovande; la *Penelope* des Anciens, nommée en Allemand *Brand-Endte*, *Rotthals*, *Rottkopf*; la *Cane* à tête rouge de Belon; la *Cane* à tête rouſſe d'Albin *Tom. II. n.* 98. & enfin l'*Anas fera*, *capite ſubrufo*, *major & minor*, de Willughby *p.* 272.

6. Le CANARD dixiéme, ſauvage, ou trembleur, de Schwenkfeld. *Anas fera decima*, *ſeu ſtrepera*, dont parle auſſi Willughby, qui le nomme en Anglois *The Cadwal* ou *Gray*. Ce peut être le *Canard* de moyenne grandeur de Geſner. *Anas mediæ magnitudinis*; en Allemand *Schnarr-Endte*; *Schnatter-Endte*; *Mittel Endte*.

7. CANE de Mer. *Anas fiſtularis* de Fabricius. *Anas fera undecima ſeu canora* de Schwenkfeld. On l'appelle chantante, parcequ'elle forme un ſon aigu, comme celui d'une flute. En Allemand *Pfeiff-Endte*. Albin *Tom. II. n.* 99. dit qu'elle ſe perche ſur les arbres. Rai *pag.* 192. Sloane *p.* 324. *t.* 278. Ils la nomment en Anglois *The Whiſtling Duck*. Ces Oiſeaux volent en troupe.

8. Le CANARD ſauvage treiziéme de Schwenkfeld. *Anas fera undecima tertia*; en Grec Βοσκας; *Boſcas minor*; *Querquedula ſylveſtris minor* de Geſner; en François *petite Cercelle*, dont il y a des varietés; le *Canard ſauvage* quatorzieme, ou le petit de la ſeconde eſpece de Shwenkfeld; l'*Anas Circia* de Fabricius; la *Querquedula fuſca* de Geſner; l'*Anas ſylveſtris minor*; l'*Anas fera decima quinta ſeu minor tertius* de Schwenkfeld; la *Querquedula varia* de Geſner; la *prima* d'Aldrovande; le *Garganey* des Milanois; le *Circia* de Geſner; la *Cercelle* d'été mâle & femelle d'Albin *Tom. II. n.* 103. & 104. Tous ces Oiſeaux ſont des *Canards* de la petite eſpece, & des varietés.

9. CANARD preneur de Mouches. *Anas Muſcaria*, Geſner, Aldrovande & Willughby. *Anas limoſa*; *Anas fera decima ſeptima ſeu minor quinta* de Schwenkfeld; en Allemand *Mor-Endte*.

10.

10. CANARD à large bec ou GARROT. *Anas lati roſtra* de Schwenkfeld ; *Clangula* de Geſner ; *Anas platyrynchа* , *Schellaria*, *Clangula* de Fabricius ; *Anas clypeata mas*, qu'Albin *Tom. I. n.* 97. 98. nomme *Pelican* d'Allemagne ; *Anas platyrynchos* d'Aldrovande ; un autre nommé *Taſchenmaul*, qui eſt l'*Anas latiroſtra major* de Geſner. Vormius *p.* 305. en Allemand *Loeffel-Endte* ; *Breitſchnabel* ; *Schall-Endte* ; *Lepel Gans.*

11. CANE ou CANARD à crête noire, ou la grande FOULQUE. *Anas fuligula prima*, Geſner, Aldrovande. *Mergus cirratus minor* de Geſner ; *Querquedula criſtata ſive Colymbis* de Belon & d'Aldrovande ; *Capo negro* des Vénitiens ; *Anas fuligula* de Willughby ; en Anglois *The Tuffted Duck*, de Willughby. Ce n'eſt, dit M. KLEIN, ni un *Plongeon*, ni un *Colymbe.*

12. CANARD noir. *Anas nigra.* Willughby doit la deſcription qu'il en donne, à Johnſon.

13. SARGON. *Anas clangula* ; en Anglois *The Golden eye*, Albin *Tom. I. n.* 96. en Allemand *Goldein auglein.* On le nomme *petit Plongeon.*

14. CERCELLE de France. *Anas Querquedula Francica* ; en Anglois *The French tail*, Albin *Tom. I. n.* 100. & 102. mâle & femelle.

15. FAISAN de Mer, mâle & femelle, Albin *Tom. II. n.* 94. 95. *Anas fera duodecima ſeu caudata* de Schwenkfeld, d'Aldrovande ; *Coda lancea* à Rome ; *Sea Phaiſant, the Cracker*, en Anglois, ſelon Willughby & Albin. Dale *p.* 404. parle de pluſieurs de ces eſpeces de *Canard* ; en Allemand *Spies-Endte* ; *Spitz Schmantz.*

16. CANARD d'Iſlande, à queue étendue. *Anas Iſlandica, caudâ protenſâ* ; nommé *Havelda*, Wormius & Willughby. C'eſt l'*Anas fera ſeovegel* de Jonſton *t.* 49.

17. CANARD à bec crochu. *Anas adunco roſtro* ; en Anglois *The Hood-bill Duck*, Willughby, Albin *Tom. II. n.* 96. & 97. mâle & femelle ; en Allemand *Krummer Breitſchnabel.*

18. CANARD de Bahama. *Anas Bahamenſis* ; en An-

glois *The Ilatera Duck*, Cateſby *p.* 93. Il eſt plus petit que le *Canard domeſtique*.

19. Petit CANARD à tête purpurine. *Anas minor, capite purpureo ;* en Anglois *The Buffels-head Duck*, Cateſby *pag.* 95. Il a la tête comme celui du numero 27.

20. CANARD au grand bec de l'Amérique. *Anas lati roſtra Americana ;* en Anglois *The blwe-wing Shoveler.*

21. CANARD hupé de l'Amérique. *Anas criſtata Americana*, nommé *Canard d'été* par Cateſby *p.* 97. en Anglois *The ſummer Duck.* Edouard *II. p.* 101. parle du mâle ; & la femelle peut être celle dont il parle *II. p.* 99. en Allemand *Plum-Endte.*

22. Petit CANARD brun, *Anas minor ex albo & fuſco varia ;* en Anglois *The little brown Duck*, Cateſby *p.* 98.

23. CERCELLE brune de l'Amérique. *Anas Quacula ; Querquedula Americana fuſca ;* en Anglois *The blue-wing-tail.*

24. Autre CERCELLE de l'Amérique. *Anas Querquedula Americana variegata ;* en Anglois *The white-tail Teal*, Cateſby *p.* 100.

25. CANARD ſauvage gris, menton couleur de cinnabre. *Anas fera, griſeo colore, mento cinnabarino, undulante pectore*, le Comte de Marſilly *p.* 108. *t.* 52. en Allemand *Rohtbart.*

26. CANARD hupé jaune. *Anas criſtata flaveſcens*, Marſilly *t.* 55. *p.* 110. M. KLEIN dit que c'eſt ou la *Querquedula criſtata*, ou le *Colymbis* de Belon, ou que c'eſt un Oiſeau qui à cauſe de ſa nouveauté doit être appellé le *Canard* du Comte de Marſilly. Il a les pieds longs, & le bec très-rouge ; ſes yeux noirs tirent ſur le rouge.

27. Quatre OCCHI des Italiens. *Anas platyrynchos mas ; Clangula*, ſelon Geſner. Marſilly *t.* 55. en a tiré la deſcription de Willughby. Il a la figure du *Canard* à tête purpurine de Cateſby *n.* XIX. Une tache blanche traverſe ſes joues ; & celui de Cateſby l'a à la racine

du bec. Ces deux espèces de *Canards* sont différents du *Sargon* d'Albin *n.* XIII.

28. CANARD verd. *Anas virescens, seu capite virescente*, Marsilly *t.* 58. Son corps est bien varié.

29. CANARD étoilé, nommé par Albin *Râle d'eau Tom. I. n.* 88. *Anas stellata*; en Anglois *The wezel Coot.* Le haut de la tête audessus des yeux est brun; le bec noir à sa racine. Il a sur le dos une grande étoile blanche.

30. PLONGEON de Mer d'Albin *Tom. I. n.* 89. *Anas Albella, Albellus*; en Anglois *The smew*; *Albellus alter* d'Aldrovande; *Mergus major cirratus* de Gesner & de Willughby, qui peut être le *Plongeon du Rhin*, de Gesner & de Willughby.

31. CANARD, CERCELLE seconde d'Aldrovande. *Anas Querquedula secunda*; en Anglois *The Teal*, Sloane *p.* 324. Ce peut être l'*Anas Circia* de Gesner, Willughby, Rai *p.* 147. & 292.

32. CANARD sauvage à ventre blanc. *Anas fera ventre candido*; en Anglois *The white-bellied Duck*, Rai *p.* 192. Sloane *p.* 324.

33. Petit CANARD, noir & blanc. *Anas parva ex nigro & albo variegata, rostro nigro, pedibus croceis*; en Anglois *The little black and white Duck*, Edouard *II. p.* 100.

34. CANARD de la Chine. *Anas Sinensis*; en Anglois *The Chinense Teal*, Edouard *II. p.* 102. C'est un Oiseau merveilleusement bien varié; ses plumes proche du croupion sont singulieres. Voyez le *Dictionnaire des Animaux* au mot CANARD, leur division, selon Rai.

## GENRE II.

Les Oiseaux de ce second Genre ont le bec allongé, pointu ou obtus en forme de cone, un peu courbé au bout. M. KLEIN les divise en *Lares* ou *Mouettes*, *Lari*; en Oiseaux qui ont le bec dentelé comme une scie, *Serratores*; en Oiseaux qui sont *Anomalopedes*, c'est-à-dire, irréguliers par les pieds, ce sont les *Plongeons*, *Mergi*; & en Oiseaux qui ont le bec irrégulier, *Anomalorostri*. Les trois premieres espèces sont mises

par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Aves Anſeres*, & la quatrieme dans l'Ordre des *Aves Scolopaces.*

## I.

### *LARES* ou *MOUETTES*, mis dans l'Ordre des *Aves Anſeres* par M. LINNÆUS.

Les LARES ou MOUETTES, *Larus* en Latin, du Grec Λαρος, à cauſe des Poiſſons dont ces Oiſeaux ſe nourriſſent, ſelon Schwenkfeld, ſont *Macropteres*, c'eſt-à-dire, que leurs ailes ſont longues; ils ont les pieds courts & palmés. Quelques-uns ont à la mâchoire inférieure une groſſeur ou tumeur; d'autres ont les deux mâchoires droites; d'autres ont la queue égale; d'autres l'ont fourchue. Il n'y a point de *Mouettes* ou *Lares Fiſſipedes*, tous ſont *Tetradactyles & palmés*, mais le doigt de derrière eſt ſimple.

1. Grande MOUETTE. *Larus maximus*, blanche, noire & bleue, qui peut être le *Skua* d'Hojerus; en Anglois *The great black and white Gull*, Willughby, Albin *Tom. III. n.* 94. en Allemand *Groeſte bunte Mewe.* Il y a une grande eſpece de *Mouette* de Groenland, dont parle M. KLEIN *Part. III.* §. XI. *n.* XI. ſous le nom de *Mallemucke*, d'après M. Anderſon.

2. Grande MOUETTE cendrée. *Larus cinereus maximus*; en Anglois *The Herring Gull*, ſelon Rai & Willughby; *Marinarius piſcator* par le Comte de Marſilly *t.* 40. *Mauce* par du Tertre & Labat; *Gavindas* par Oviedo; *Guacaguaca* par Marcgrave; en Anglois *The common Gull* par Sloane *p.* 322. en Allemand *Groeſte grave Mewe.* Elle eſt de la grandeur d'un *Canard*, a le bec & les pieds jaunes, le dos & les ailes gris, les extremités des ailes en partie noires, en partie cendrées & blanches; & une ligne rouge de chaque côté de la mâchoire ſupérieure.

3. HIRONDELLE de Mer. *Larus cinereus piſcator; Gavea* par Schwenkfeld; *Hirundo marina, Vultur piſcarius, Gyrfalco marinus* par quelques-uns. Marſilly *t.* 41.

Belon & Willughby. En Allemand *Weiſſe Mewe ; Fiſchar Mewe.* Cet Oiſeau a la partie antérieure du corps de couleur de neige, au bas du col des taches noires ; la queue blanche, le bout noir ; le dos & les petites plumes qui couvrent les grandes, cendrées.

4. Petite MOUETTE cendrée. *Larus cinereus minor ;* en Anglois *The common ſea Mall*, Willughby ; en Allemand *Gemeine grave Mewe.* Elle a le bec d'un blanc ſale, le bout jaune, la tête & le col tachetés de noir ; le dos juſqu'à la queue, cendrés ; les plumes qui couvrent, blanches ; les ailes variées de noir & de blanc ; le reſte du corps blanc, les pieds verds.

5. MOUETTE à bec noir. *Larus roſtro nigro*, Albin *Tom. II. n.* 84. C'eſt une varieté du précédent, ou l'un eſt mâle & l'autre femelle. Cet Oiſeau a les yeux noirs & l'iris blanche ; la tête, le col, la poitrine, le ventre, d'un blanc jaune ; le dos, les plumes de la queue, par écailles ; les ailes d'un noir blanc au bout.

6. Grande MOUETTE griſe. *Larus griſeus maximus ;* en Anglois *The great gray Gull ; Wagel* dans la Province de Cornouaille ; *Martinazzo* à Veniſe. C'eſt le *Bourguemeſtre* de Groenland ; peut-être le *Larus albocinereus, torque cinereo*, d'Aldrovande & de Willughby ; ou le *Cataracta* d'Aldrovande. M. KLEIN remarque que ce que Martens nomme *Préconſul* & *Bourguemeſtre*, eſt un Oiſeau *Tridactyle*, & que par conſéquent ce n'eſt pas celui-ci. Cette grande *Mouette* a le bec noir, & ſon dos & ſes ailes ſont de la couleur du *Courlieu.*

7. MOUETTE brune. *Larus fuſcus*, Albin *Tom. II. n.* 85. que M. KLEIN nomme *Cataractes*, & qui eſt, à ce qu'il croit, le *Ganner* de la Province de Cornouaille, dont parle Willughby ; en Allemand *Braun-und geſchupte Mewe.* Elle eſt d'un brun ferrugineux ; l'extremité de ſes ailes & de ſa queue ſont noires.

8. MOUETTE à tête rouge. *Larus major, capite rubro ; Larus albus erythrocephalus*, Albin *II. n.* 86. en Anglois *The brown head Gull ;* en Allemand *Braunkopff.*

9. Petite MOUETTE d'Irlande. *Larus Hybernus ;* en

Anglois *The Coddy Maddy*, Albin *Tom. II. n.* 87. en Allemand *Ringel Mewe.* Elle a la moitié de la tête & le ventre blancs, le deſſus du corps juſqu'au bout de la queue, cendré; le bec noir; les yeux entre un cercle blanc. Ses ailes ſont variées de brun & frangées de blanc.

10. MOUETTE blanche du Comte de Marſilly *p.* 88. *t.* 42. à queue fourchue, *caudâ forcipatâ.* L'*Hirundo marina major* d'Albin *Tom. II. n.* 88. en Anglois *The greater ſea-Swallow*, en eſt une varieté. Willughby en parle; Turner, ſous le nom de *Sterna*; Baltern, ſous le nom de *Speuter.*

11. Petite MOUETTE cendrée. *Larus minor cinereus*; *Gavia minor* de Schwenkfeld, & de Marſilly *t.* 43. Son bec eſt rouge, noir au bout; les pieds rouges; le haut de la tête noir; le dos & les ailes cendrées; le ventre & la queue, qui eſt fourchue, blancs.

12. Petite MOUETTE noire. *Larus minor niger*; *Meva nigra* de Schwenkfeld; *Larus niger* de Geſner; *petite Hirondelle* de Mer, *Hirundo marina minor* d'Albin *Tom. II. n.* 89. en Anglois *The leſſer ſea* COCK *Swallow.* L'*Hirondelle* ou la *petite Hirondelle* du Perou, à queue fourchue de Feuillée 3. *p.* 33. appartient à cette eſpece.

13. MOUETTE pêcheur. *Larus piſcator*, Aldrovande, Geſner, Baltner, & Willughby; en Anglois *The leſſer ſea Swallow*, Albin *Tom. II. n.* 98. qui dit que c'eſt la femelle du précédent. Jonſton, Geſner, & Baltner, ont décrit cet Oiſeau différemment les uns des autres. M. KLEIN en a tué deux le 16 Août 1746. & il n'y a trouvé aucune différence. L'un & l'autre étoit une petite *Mouette.*

14. MOUETTE tachetée du Comte de Marſilly. *Larus maculatus, pag.* 94. *t.* 45. en Allemand *Geffeckte Mewe.* Son bec n'a qu'un pouce & deux lignes de long. Elle a derriere la tête une eſpece de coeffe compoſée de plumes noirâtres. Le reſte de la tête & le menton eſt blanc, le goſier & la poitrine marqués de taches vertes, le reſte de taches noires & blanches, les ailes d'un noir brun, les pointes blanches, les yeux noirs,

l'iris blanche, les pieds jaunes en quelques endroits.

15. MOUETTE ou HIRONDELLE de Mer à tête blanche de Sloane *I. p.* 31. *t.* 6. *f.* 2. & de Cateſby *p.* 58. *Larus, Hirundo Marina minor capite albo*; en Anglois *The Noddy*; en Allemand *Weiskopff*. Elle a le front blanc; cette couleur diminue peu à peu, & diſparoît derriere ſa tête. Le bec eſt noir; le reſte du corps & les pieds noirâtres.

16. MOUETTE rieuſe de Cateſby p. 89. *Larus minor, capite nigro, roſtro rubro*; en Anglois *The Laughing Gull*; en Allemand *Roht ſchnabel mit ſchwartzem kopff*. La tête eſt brune; les yeux ſont dans un cercle blanc; la moitié des ailes eſt d'un noir brun; les pieds noirs, le reſte blanc, la queue égale, & de deux pouces de long.

17. GOSLANT de Feuillée *III. p.* 12. *Larus chlamyde leucophæa, alis brevioribus.* Le bec eſt jaune à ſa racine, noir du reſte; le derriere de la tête & les joues d'un blanc cendré, le devant du col & le ventre cendrés; les premieres plumes des ailes de couleur ferrugineuſe, frangées d'un jaune obſcur, ainſi que les plumes de la queue; & les pieds fauves. Le *Larus torquatus chlamyde nigra & pedibus cinereis* de Feuillée *III. p.* 14. eſt une varieté, ou le mâle, ou la femelle.

On peut conferer avec les précédentes, les *Mouettes* de Feuillée, ſçavoir la *Mouette* blanche & noire à queue d'*Hirondelle*, *Larus albo-niger*, *Hirundinis caudâ pag.* 268. & le *Larus minor melanocephalos p.* 410. *&c.*

18. MOUETTE pareſſeuſe. *Larus piger cunicularis*; *Puffinus, Puphinus* ou *Pupinus*, des Anglois; en Anglois *The Puffin of the iſle of Man*, Willughby, Cajus. Cet Oiſeau eſt nommé *Pupin*, parcequ'il prononce ce mot; en Allemand *Pupen.* Il a les pieds palmés & rouges; le bec a un doigt & demi ou deux de long; il eſt étroit, noir, un peu ſemblable à celui du *Vanneau*; le doigt de derriere petit & pointu. Il ſe cache dans les trous de *Lapins*, où il ſuce le ſang des *Lapereaux.* Il a, comme le *Coucou* & l'*Hirondelle*, ſon tems où il ne

paroît point. Sa queue & ſes ailes ſont aſſez longues. Il vole avec viteſſe; & il n'a point, comme le prétend Aldrovande, une eſpece de laine ſur le corps. Voyez ſur les *Lares le Dictionnaire des Animaux.*

## II.

Oiſeaux *Palmipedes*, qui ont le bec dentelé comme une ſcie, & que M. KLEIN nomme *Plotti ſerratores.* Ils ont les mâchoires allongées, & les bords faits comme une ſcie. Le bout de la mâchoire ſupérieure eſt comme crochu. Les ongles des pieds ſont aigus. Dans l'Odre des *Aves Anſeres* par M. LINNÆUS.

1. KNYPER de Schwenkfeld. *Serrator ſimpliciter.* C'eſt un Oiſeau très-rare, ſelon l'Auteur *c.* 30. en Allemand *Kneiffer.* Il a la tête, le col & le dos noir; la moitié des ailes blanche; l'autre variée de noir & de blanc; la poitrine & le ventre gris, le bec rouge, les mâchoires dentelées, les pieds bas & rouges.

2. HARLE de Belon. *Serrator criſtatus; Merganſer*, ſelon Aldrovande, Willughby, le Comte de Marſilly *p.* 18. *t.* 37. en Anglois *The Cock Gooſander*, ſelon Albin *Tom. II. n.* 101. *Mergus longi roſter* de Willughby *Tab.* 64. Il ne donne que la figure de la tête de cet Oiſeau. *Bergander* ſelon Dale *p.* 403. *The red breaſted Gooſander*, ſelon Edouard *II. p.* 95. nommé par M. LINNÆUS *Mergus criſtâ dependente, capite nigro cæruleſcente, collari albo.* Cet Oiſeau a le goſier noir, crepu; un collier blanc, large d'un pouce; la poitrine par écailles, de couleur châtain; le dos noir, le ventre blanc; les ailes noires, avec trois lignes blanches tranſverſales, & les pieds & le bec rouges.

3. CANARD huppé de Cateſby *pag.* 94. *Anas cucullatus*; *Anas criſtatus, Mergus*; en Anglois *The round creſted Duck*; en Allemand *Mohren-mutz.* Il a les deux mâchoires finement dentelées; la tête & le col noirs, le capuchon de la tête blanc par deſſus, la poitrine & le ventre blancs, un peu de blanc à ſes ailes courtes, les grandes plumes des ailes, la moitié ſeulement, & la queue, brunes.

4. Autre Oiſeau, nommé *Serrator minimus.* Il a la tête blanche, le derriere & les joues noires, un peu d'un verd luiſant. On peut l'appeller *Oiſeau à bec de ſcie.* M. KLEIN le nomme en Allemand *Kleiner weiskae pffiger ſaeger.* Il dit en avoir tué un le 18 Mars 1747. qui avoit depuis l'extremité du bec juſqu'au bout de la queue, dix-ſept pouces de France. Tout le bas du corps, depuis le bec, qui étoit noir, étoit argenté; le dos noir; les ailes noirâtres; les plumes les plus courtes, & les plumes des ailes qui couvrent les grandes, variées d'un beau blanc & d'un beau noir; le dedans des ailes & le deſſous de la queue cendrés; les pieds plombés; ſous le doigt de derriere une peau, & ſes ongles pointus.

## III.

### *PLONGEONS, Mergi*, dans l'Ordre des *Aves Anſeres* par M. LINNÆUS.

Oiſeaux *Anomalopedes* ou à pieds irréguliers; ce ſont les *Plongeons, Mergi*; en Allemand *Halbe-Endte, demi-Canards.* Les *Plongeons* ſont des Oiſeaux *Tetradactyles.* Ils ont les pieds palmés, c'eſt-à-dire, les doigts joints enſemble par une membrane. Celui de derriere eſt ſimple. Les pieds ſont placés proche de l'anus, ce qui fait que leur corps vacille en marchant, comme celui des *Canards.* Ils ont le bec long, ou en forme de cone. Ils ne reſtent pas ſi longtems ſous l'eau que les *Colymbes*, dont nous donnerons la notice plus bas. C'eſt ce qui fait que les *Plongeons* ſont des *demi-Canards.* Ces Oiſeaux ne nagent pas ſous l'eau comme les *Colymbes.* Ils ont la tête, le bec, le col, & la poſition des pieds, tout à fait différents de ceux des *Canards.*

1. Grand PLONGEON, *Mergus maximus*; *Colymbus maximus Farrenſis*, ſeu *Arcticus*; *Colymbus maximus caudatus*, ſelon Albin *Tom. I. n.* 82. en Anglois *The greater Diver or Loom*, ſelon Willughby. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt le *Colymbus maximus ſtellatus*, que Willughby

nomme en Anglois *The greateſt ſpeckle Diver or Loom*; *t.* LXII. par ce qu'il a ſur le dos & ſur les aîles des figures d'étoiles blanches.

*Loom*, ou *lumme*, ſignifie *boiter* en marchant, inhabile à marcher, ſelon Scheffer *c.* 30; en François *Boiteux*. Il y a une ſi grande multitude de ces Oiſeaux, & tant de diverſes eſpeces, qu'on ne peut pas en faire mention en peu de mots, dit M. KLEIN. Wormius parle du *Lumma.* & ſous ce nom, il entend tous les Plongeons, *Mergos* (en Allemand *Halb Endten*) ou demi *Canards*, & il paroît comprendre tous les Oiſeaux *Podicipedes*. Cependant, dit M. KLEIN, des Auteurs nous repréſentent des *Podicipedes* debout & droits comme des hommes, leſquelles figures, ajoute-t-il, embaraſſent ceux qui ſont peu verſés dans l'étude du Regne Animal. On peut conſulter l'Hiſtoire Naturelle d'Iſlande & de Groenland de M. Anderſon ſur les *Lommes*.

2. PLONGEON Arctique, *Mergus Arcticus*; *Colymbus Arcticus*, nommé *Lemme* par Wormius & Willughby, eſpece ſinguliére d'*Hirondelle aquatique* & étrangere, ſelon Beſlerus *t.* 16. Lochn *t.* 8. nommé M. par LINNÆUS, *Colymbus pedibus palmatis indiviſis*. C'eſt le grand *Plongeon* de Terre Neuve d'Albin *Tom. III. n.* 93. qu'il nomme en Anglois *The great Sea-loon from Newt Found-Hand*. On voit beaucoup de ces Oiſeaux en Norwege, Iſlande, & Lapponie. Les Lappons font de la peau de cet Oiſeau des eſpeces d'écharpes, dont ils ſe ſervent pendant l'Eté. Ils l'employent auſſi a d'autres uſages. Voyez la *Fauna Suecica* de M. LINNÆUS *n.* 121.

3. PLONGEON de Groenland à bec noir, qu'Edouard nomme en Anglois *The red throaded Ducker or Loon. II. p.* 97. Cet Oiſeau a la tête & les côtés du col couleur de plomb. Le derriére de la tête, & les côtés de la poitrine, marqués de lignes noires, le bas du goſier & le bas du col rouges.

## IV.

Oiſeaux a bec irrégulier, *Anomal-roſtri*, *Tetradactyles*, palmés, les pieds élevés, & le doigt de derriere ſimple.

1. AVOSETTA des Italiens; *Plotus recurviroſter*, *Recurviroſtra*; *Avoſetta*, ſelon Geſner, Aldrovande, Willughby, Dale, Marſilly *p.* 72. *t.* 34. Albin 1. *n.* 101. *Spinzago d'Acgua*; *Bevoſtocta* de Jonſton: en Allemand *Schabbel Schnabbel*. Cet Oiſeau, comme les *Râles*, prononce *Crek*, *Crek*. Le doigt de derriére eſt ſimple & court; les trois de devant unis par une membrane.

2. COUPEUR D'EAU de Cateſby *p.* 90. *Plotus roſtro conico inæquali*; *Larus major*, *roſtro inæquali*: en Anglois *The Cur-Water*: en Allemand *Berkhenter Schnaebler*. Du milieu de la tête, le long du col, du dos, des aîles juſqu'à la queue, il eſt noir; il a les pieds, & la moitié du bec rouges; le devant eſt noir. Le bec eſt ſingulier, & irrégulier: car contre l'ordinaire des autres Oiſeaux, la machoire inférieure eſt plus longue que la ſuperieure; celle-ci eſt plus courte de deux pouces. Ce bec eſt tranchant comme un couteau.

---

# FAMILLE VI.

Oiſeaux TETRADACTYLES, PALMIPEDES, dont tous les doigts tiennent à une membrane, nommés en Latin *Planci*. Dans l'Ordre des *Aves Anſeres* par M. LINNÆUS.

1. ONOCROSTALE, ou Grand goſier, ou Pelican. *Plancus*, *Gulo*; Ονοκροταλος en Grec; *Truo*, ſelon Schwenkfeld; *Pelicanus*, ſelon Belon, Aldrovande, Willughby; nommé *Onocrotale*, du Grec Ονος *Aſinus*, & Κροταλον *crepitaculum*, parcequ'en plongeant ſon col

dans l'eau, il fait avec ſon bec en reſpirant le même bruit qu'une Ane. Il eſt encore nommé *Avis gutturoſa ſtrumoſa*; *Alhautel* en Arabe, c'eſt-à-dire Jabot, *Ingluvies*; *Truo* à Rome. Bochart *II. l. II. c.* 20. en parle, le Comte de Marſilly *t.* 35. ſous le nom d'*Onocrotalus, ſeu Pelicanus*; & Rai ſous celui de *Pelicanus fuſcus.* Par Oviedo *XIV. c. 6. Grandes Alcatrates* des Iſles Eſpagnoles. Grand goſier par Rochefort, du Tertre & Labat. En Anglois par Sloane *pag.* 322. *This ſeem'd to be the ſame with the white Pelican, only of a dark colour.* Par Feuillée *Onocrotale* à pieds bleux & courts, le bec en forme de cuillere. *Onocrotalus pedibus cæruleis & brevioribus, roſtro cochleato III. p.* 257. en Allemand, ſelon Schwenkfeld *Krop Gans*; *Schnee Gans, Biel fratz*; *Ohn-Bogel.* Edouard 2. *p.* 92. parle de l'*Onocrotale* blanc du Cap de Bonne Eſperance; & ibid. *pag.* 93. de celui de l'Amérique. Le blanc & le brun ſont des varietés. Le blanc, dit M. KLEIN, à depuis le bout du bec juſqu'aux ongles 60. pouces de long; ſon bec 14. le Comte de Marſilly *Tom. VI. Tab. VI. VII. VIII.* repréſente la tête de cet Oiſeau dans ſa grandeur naturelle, avec ſon ſac ou ſa poche, la trachée-artère, l'œſophage, l'eſtomac, & les inteſtins, qui ont trois cents pouces de long, avec le double inteſtin *Cæcum*, & les os des jambes, qui ſont très forts. Geſner a eu un *Onocrotale* qui peſoit plus de 24. livres, Aldrovande un qui en peſoit 18., & une autre qui en peſoit 25. Faber eſt étonné que le ſac & le jabot de cet Oiſeau ſoit ſi grand ou ſi large, qu'il paroît que la tête d'un homme pourroit y être cachée. Il n'a point de langue; c'eſt ce qui fait que par l'organe du larynx il fait le même bruit qu'un *Ane.* On dit qu'il vit 40. ou 50. ans. On peut ſur cet Oiſeau conſulter les *Mémoires de l'Acad. Roy. de Sciences Tom. III. Part. III. p.* 186. & *le Dictionnaire des Animaux.*

2. OIE de Solan; *Plancus Anſer Baſſanus*; en Anglois *The Soland Gooſe.* Willughby, Sibbald, Albin *Tom. I. n.* 86. En Allemand *Baſſaner; Schottſche Gans: Sula*, ſelon Hojerus. Cluſius, Cajus *Rar. p.* 89. en parlent. On nomme auſſi cet Oiſeau *Oie d'Ecoſſe*, parce qu'il y en a

en grand nombre. Les aîles étendues il a 72. pouces. Il ne lui eſt pas poſſible de s'élever de terre, à cauſe de ſes longues aîles. Ces Oiſeaux arrivent au Printems dans l'Iſle de *Baſſa* en Ecoſſe, & dans d'autres circonvoiſines, & ne s'en vont pas avant l'Automne, dit Seba.

3. Grand Fou, *Plancus congener Anſeri Baſſano; Avis fluviatilis;* en Anglois par Cateſby *p.* 86. *The Great Baby.* Sloane *p.* 322. *t.* 271. le nomme *Anſeri Baſſano congener fuſca avis.* En Allemand *Groſſer Doelpel.* Oviedo *XIV. c.* 1. parle de cet Oiſeau. Il eſt de la grandeur d'une *Oie.* Il a la tête & le col gros; le bec fort, brun, & fait en angle, il eſt de ſix pouces de long; & l'Oiſeau, les aîles étenduës, a ſix pieds de large.

4. Petit Fou, *Plancus Morus ſimpliciter*; en Anglois *The Boby*, ſelon Cateſby *p.* 87. & Sloane *t. 6. f.* 1. en Allemand *Doelpel.* Cet Oiſeau eſt plus petit qu'une *Oie.* M. KLEIN penſe que ce n'eſt qu'une varieté du précedent; car la grandeur ne conſtitue pas toujours les eſpeces. On peut ſur cet Oiſeau conſulter Cateſby, & voir de quelle maniere l'Oiſeau nommé *Pirate*, qui ſe nourrit de Poiſſon, fait dégorger à celui-ci les Poiſſons qu'il a pris.

5. CORMORANT: *Plancus Corvus, lacuſtris, aquaticus*; Geſner: *Mergus magnus niger: Gulo*, ſelon Schwenkfeld: *Corvus vorans*, ſelon Willughby; *Corvus aquaticus* par le Comte de Marſilly *t.* 36. *Phalacrocorax*, du Grec φαλακρος *calvus*, & Κοραξ *Corvus*: en Anglois *The Cormant.* Charleton, Albin *Tom. III. n.* 81. en parlent. Voyez ſur les Oiſeaux Palmipedes Tetradactiles, dont tous les doigts ſe tiennent par une membrane, le *Catalog. Avi Petropol. p.* 403. On dreſſe cet Oiſeau à la Pêche du Poiſſon. On le nomme en Allemand *See Waſſer Rabe Feucht Ars; Schlucker.*

6. Petit CORBEAU Aquatique, *Plancus Corvus minor Aquaticus: Graculus Palmipes*; en Anglois *The Cocot*; *The ſea Crovv; The Shag; The Crane*; ſelon Willughby, Charleton & Sibbald. En Allemand *Seeheher.* Cet Oiſeau n'eſt pas plus grand que le *Canard* vulgaire. Son bec eſt droit, rond, courbé au bout. Il fait, com-

me le précédent, ſon nid dans les arbres. On en voit en Pruſſe.

7. Oiſeau du TROPIQUE. *Plancus Tropicus; Avis Tropicorum:* en Anglois *The Tropick Bird*; ſelon Willughby & Rai. En Allemand *Tropic-Bogel.* Cet Oiſeau ſelon Cateſby *Append. p.* 14. a le bec & les pieds rouges. Le bec a deux pouces de long, il eſt pointu & courbé. Rai dans une Lettre Philoſophique à Liſter en parle p. 129.

8. ANHINGA du Breſil, *Plancus Braſilienſis*, nommé *Tupinambu* par Marcgrave. Cet Oiſeau eſt de la grandeur du précédent; ſon bec eſt pointu, droit, fort, & long de trois pouces.

## FAMILLE VII.

Oiſeaux TRIDACTYLES, PALMIPEDES, qui n'ont que trois doigts, & point derriere. Les Oiſeaux de la troiſiéme Famille ſont auſſi *Tridactyles*, mais leurs doigts ſont diviſés; & les doigts des Oiſeaux de cette ſeptieme Famille les ont joints enſemble par une forte membrane. Leur corps eſt de figure d'ovale. Mis dans l'Ordre des *Aves Anſeres* par M. LINNÆUS.

1. COLOMBE ou PIGEON de Groenland, TOURTERELLE de Mer: *Plautus columbarius; Columbus Groenlandicus*: en Anglois par Albin *Tom. II. n.* 80. *The Cock Grocland Dove.* & *Tome I. n.* 85. mâle & femelle: par Sibbald *The Groenland Dove or ſea Turtle.* On en voit dans l'Iſle de *Baſſa.* Willughby en parle *p.* 245. Martens nomme cet Oiſeau *Duyf.* Edouard 1. *p.* 50. en Anglois *The ſpotted Groenlands Dove.* Le mâle eſt noir, & il a le bec noir & bleu, & les yeux noirs placés dans un cercle jaune. Le male a les pieds rouges, & la femelle gris. On dit qu'ils changent de couleur l'hyver. Ils ne couvent que deux œufs, comme les Pigeons. On en voit ſur les rivages d'Ecoſſe & de la Province de Galle. Voyez Edouard 2. *p.* 91. ſur un Oiſeau

qu'il appelle en Anglois *small black and white Divers.*

2. GUILLEMOT, ou LOMVIA de Cluſius : *Plautus roſtro larino : Mevven Schnabel* en Allemand ; *The Guillemot* ou *Seatten* en Anglois, ſelon Albin *Tom. I. n.* 84. en Anglois ſelon Willughby *a Skout*, a *Kiddovv*. Cet Oiſeau a le bec d'un *Lare* ou *Mouette*, & de couleur noire. Tous les Oiſeaux de cette Famille ſont ſtupides.

3. PLONGEON, ou PIE de Mer à long bec : *Plautus arcticus ; Anas arctica* de Cluſius ; *Pica marina* ou *Fratercula* de Geſner, & d'Aldrovande : *Landa* par Wormius : *Freſtholm*, *Guldenhead* ; *Bottlenoſe*, *Helegua*, *Coulterneb*, Albin *Tom. II. n.* 78. 79. Martens le nomme *Paſſagey-Duycher*. Albin, dit M. KLEIN, donne mal à propos un doigt de derriére à cet Oiſeau. Il eſt de la grandeur d'un *Canard*, & Paſſager. On peut voir dans Wormius, Cluſius & Willughby, que cet Oiſeau n'a que trois doigts.

4. PINGUIN, ou PONGUIN, ou OIE de Magellan : *Plautus Pinguis ; Anſer Magellanias*, Cluſius, Wormius, Zorgdrag *p.* 459. Pyrand *l. II.* Wormius *p.* 301. en donne une fort bonne figure. En Allemand *Fettgans*. Il eſt nommé *Pinguin*, parceque c'eſt un Oiſeau très-gras. Il a le bec long & l'ouverture grande. Pyrard, peu loin d'une Iſle nommée *Anubone*, & dans une autre Iſle déſerte, trouva une ſi grande quantité de ces Oiſeaux, qu'il ne pouvoit remuer le pied ou faire un pas, ſans renverſer des nids de ces Oiſeaux. Laet en a auſſi trouvé dans la Nouvelle France, & Candish en 1586. dans l'Iſle *Deſirée*. C'eſt Laet qui leur a donné le premier nom de *Pinguin*. Il y a de ces Oiſeaux en Amérique. Brocok *p.* 73. en parle. Frezier *I. p.* 141. dit que dans l'Iſle Quriquine ils ſont plus gros qu'un *Oie*. Edouard *I. p.* 48. en donne d'autres eſpeces, qui ont le bec & les pieds rouges, & une eſpece qui a un quatriéme doigt à côté du dernier ; & *Tom. II. p.* 94, il y en a un autre dont il donne la figure naturelle. Il a les pieds noirs, un faux doigt derriére ; il différe des autres par le bec.

5. ALKA, ou Oiſeau à bec tranchant d'Albin *Tom.*

*III. n.* 95. *Plautus tonsor : Alka* de Clusius & de Wormius ; en Anglois *The Razor Bill ; The Ruck ; The murre :* en Allemand *Scheermesser Schnaebler.* Ce peut être le *Mergus* de Belon. Aldrovande *p.* 240. en parle. Sibbald le nomme en Anglois *The Auck Scout.* On en voit dans l'Isle de *Bassa.* Il est de la moitié plus petit que le *Pinguin.* Il convient avec le *Plongeon* de Candie de Belon, qui s'est trompé, dit M. KLEIN, quand il dit que cet Oiseau est le seul parmi les Palmipedes, qui manque de doigt de derriére. C'est que Belon n'avoit vû que celui-là.

6. SENATEUR de Martens, *Plautus Senator : Raedshaer.* Voyez *Prodr. Avi.* de M. KLEIN sur cet Oiseau.

7. PRÉCONSUL, ou BOURGUEMESTRE de Martens ; *Plautus Præconsul, Bourguemester.* Martens *Ord. V.*

8. LOMBES, Martens. *Ord. III.*

9. KWTGE-GEF, espece de *Mouette*, ainsi nommée par Martens *Ord. IV.*

10. STRONT-JAGER ; *Scyt Valck ; Plautus stercorarius* du même *Ord. VII.*

11. ROTTGE, ou ROTT-ETT-EZJE, du même *Ord. VI.*

12. PINÇON de Mer, ou de Tempête : *Plautus minimus, procellarius : storm Waeders Vogel.* M. LINNÆUS *Faun. Suec.* en donne la figure *Tab. II. n.* 249. Albin *Tom. III. n.* 92. le nomme en Anglois *Stormfinck, The Petrell.* Feuillée en parle sous le nom de *Pinçon de mer* ou de *tempête.* En Allemand *Kleiner Schwartzer Sturm-Bogel.* Cet Oiseau, au lieu de doigt de derriére, n'a qu'un petit ongle. Il est tout noir sinon qu'il a le croupion blanc.

13. ALBATROSS Edouard *II. p.* 88. *Plautus Albatross.* Albin *Tom.* 3. *n.* 76. confond cet Oiseau avec un autre, nommé en Anglois *Man-of war.* C'est un Oiseau du Cap de Bonne Esperance. La *Fregate* d'Albin paroît être l'Oiseau qu'Edouard nomme en Anglois *The Man of war.*

14 Autre ALBATROSS, plus grand que le précédent ; *Plautus Albatross spurius major.* Il a le plumage tout noir, le bec jaune, un faux doigt de derriére, Edouard *II. p.* 89. & *p.* 90.

FAMILLE

# FAMILLE VIII.

Oiſeaux DACTYLOBES, TETRADACTYLES, nommés en Latin par M. KLEIN, *Dactylobi Tetradactyli, digitis lobatis, ſive dicroati; digitis utrinque fimbriatis, plerumque & poſtico.*

TOUS ces Oiſeaux ont le bec droit; ce ſont les *Colymbes* & les *Foulques* qui compoſent cette Famille. Les *Colymbes*, nommés en Latin *Colymbi*, *Urinatores*, ſont *Podicipedes*; car κολυμβαν en Grec eſt la même choſe qu'*urinari* en Latin; en François plonger, nager un aſſez long eſpace de tems avant que de revenir ſur l'eau: *mergere* ne ſignifie que plonger, & revenir auſſi-tôt ſur l'eau. Voilà la différence que M. KLEIN met entre ces deux verbes *urinari* & *mergere*. Les Oiſeaux qu'il nomme *Urinatores*, *Colymbes* en François, du nom Grec, plongent & nagent longtems ſous l'eau. C'eſt pour la même raiſon que les *Grenouilles* & les *Phocas* ſont nommés par Pline *l.* XI. *c.* 37. *Urinatores*. Ainſi les *Colymbes* & les *Plongeons* doivent être diſtingués les uns des autres. Le propre des *Colymbes* eſt non ſeulement de ſe plonger, mais encore de nager aſſez longtems ſous l'eau; & celui des *Plongeons*, nommés en Latin ſimplement *Mergi*, eſt de ſe plonger dans l'eau quand ils apperçoivent leur proie, & de revenir ſur l'eau dez qu'ils s'en ſont ſaiſis. Les Naturaliſtes ont preſque tous confondu ces deux Genres d'Oiſeaux, & M. KLEIN nous en fait voir la différence. Les *Foulques* ou *Poules d'eau*, qui ont de chaque côté les doigts lobés en demi cercle, c'eſt-à-dire bordés d'une membrane, nagent ſous l'eau comme les *Colymbes*; & peuvent auſſi la raſer.

## *COLYMBES.*

Oiſeaux mis par M. LINNÆUS dans l'ordre des *Aves Anſeres.*

1. Grand COLYMBE blanc hupé. *Colymbus albus, major criſtatus*, Aldrovande. M. KLEIN ne ſait ſi c'eſt le *Plongeon* hupé, *Colymbus criſtatus* d'Albin *Tom. I. n.* 81. qu'il nomme en Anglois *The creſted Loon* ou *Diver.* C'eſt un admirable Oiſeau aquatique, à cauſe de ſa hupe. *Admiranda avis, Cucullatæ aquaticæ ſpecies.* Beſler *t.* 17. Lochn *t.* 8. en Allemand *Bekapter und Gehornter Taucher;* en Anglois par Edouard *II. p.* 96. *The Eared Dobchick.* La deſcription qu'en donne Aldrovande, ſe rapporte aſſez avec celle de Beſler. Voyez la deſcription qu'en donne Edouard.

2. Grand COLYMBE hupé du Comte de Marſilly *t.* 38. *Colymbus major criſtatus; Mergus major; Urinatrix major.* Marſilly a donné à ſon Oiſeau la deſcription du grand *Colymbe hupé*, ſuivant Aldrovande, que Willughby ſoutient être le *Lievre aquatique* ou le *Colymbe hupé* du Mexique de Nieremberg. On voit à ce *Colymbe* du Comte de Marſilly une eſpece de cucule, qu'on ne peut pas dire être une hupe. Si la figure eſt exacte, cet Oiſeau eſt différent du premier *Colymbe* de Schwenkfeld, qui en parle en ces termes: Ses plumes hupées derriere la tête paroiſſent flotantes ſur le haut du col; ſes jambes, qui s'allongent proche du bas ventre preſque en arriere, ſont plus propres à nager qu'à marcher; ſes cuiſſes ſont cachées dans ſon ventre. M. KLEIN ne peut pas ſouffrir qu'Aldrovande repréſente ces Oiſeaux *Podicipedes*, droits, marchant droits comme l'*Homme.* La ſcience des Oiſeaux aquatiques eſt remplie d'obſcurités. Wormius a mieux dépeint l'Oiſeau nommé *Lumma.* Il n'eſt pas vrai, dit encore M. KLEIN, que le ſecond *Colymbe*, dont nous venons de parler ici, ait les ongles longs & amples, comme il paroît dans la figure du Comte de Marſilly.

3. Grand COLYMBE d'Aldrovande. *Colymbus major.*

C'eſt le *Fiſonelle* des Italiens, que Willughby nomme en Anglois *The greater Loon or arsfoot Diver*; les Allemands *Schlicht Koepffiger groſſer Taucher*. Il a le bec noir, plat de chaque côté; ſes pieds paſſent ſa queue, augmentés de chaque côté d'une membrane, à laquelle cependant ils ne ſont pas attachés.

4. Petit COLYMBE. *Colymbus minor*; *Mergulus*; *Mergus minor niger*; *Mergulus niger major*; *Colymbus minor* de Schwenkfeld. Willughby, Albin *Tom. II. n. 76.* parlent de cet Oiſeau. Le dernier le nomme *petit Plongeon de Mer*. Voyez Marſilly *t. 39.* Sloane *p. 322.* Edouard *II. p. 96.* Le *Colymbus minor* de Belon eſt du moins un Oiſeau qui lui eſt très-ſemblable. Il a le bec pointu. Cet Oiſeau a la tête, le col, le dos, noirs; le ventre blanc; les côtés de la tête, du col, & les pieds, de couleur ferrugineuſe; le bec noir. Il y a chez Aldrovande une autre eſpece de petit *Colymbe*, dont le bec eſt un peu courbé.

5. COLYMBE brun, *Foulque* à bec varié de Cateſby *p. 91.* *Colymbus fuſcus*; *Podicipes minor roſtro vario*; en Allemand *Braum Teucherlein*. Il a de grands yeux dans un cercle blanc, une tache noire au haut du goſier; une bande noire au milieu du bec, où ſont les narines; à la racine de la mâchoire inférieure une pareille tache. Le tronc & le reſte du corps eſt brun.

6. Grand COLYMBE, qui a le bec rouge & le bout blanc. *Colymbus maximus*; en Anglois *The great ſea Loon or Diver* par Willughby; en Allemand *Bunt Flugel*. Il a le bec rouge, le bout blanc; le deſſus du col de couleur châtain; les ailes brunes, avec deux lignes blanches; les joues & la partie inferieure du corps, de couleur d'argent.

On peut encore mettre, dit M. KLEIN, dans le rang des *Colymbes*, un *Canard* de Charleton, beaucoup plus grand que le *Canard* qui cherche ſa nourriture en ſe plongeant dans l'eau, & un *Plongeon* de l'Amérique, nommé par Seba *II. p. 15. t. 12. n. 6. Mergus Americanus albus*.

## *FOULQUES.*

Oiſeaux mis par M. LINNÆUS dans l'Ordre des *Ave Gallinæ.*

1. FOULQUE des Modernes. *Fulica Recentiorum ; Gallina aquatica ; Gallina arundinum ; Follega ; Follata ; Mergus niger ; Mergi genus ; Fulida ;* en Anglois par Willughby *The Coot ;* par Albin *Tom. I. n.* 83. *The bald Coot ;* il la nomme en François *Foulque chauve* ou *Poule d'eau.* Les Latins lui ont donné le nom de *Fulica* à cauſe de ſa couleur de ſuye. Charleton & le Comte de Marſilly *t.* 33. parlent de cet Oiſeau. En Grec Φαλαροκοραξ, *Corbeau luiſant.* Roberg en faiſant l'Anatomie d'un de ces Oiſeaux, a trouvé aux côtes, des os doubles en forme de croix. En Allemand *Rohrhan ; Rohr-henne ; Waſſer-hun ; Pfaſſe.* Cet Oiſeau a le bec fort, pointu & gros ; le doigt de derriere bordé d'une ſimple membrane. Il n'a point de plumes proche du bec.

2. Grande FOULQUE de Belon, *Macreuſe* ou *Diable de Mer*, ainſi nommé à cauſe de ſa couleur noire. *Anas minor niger* de Rai ; en Anglois *The Scoter* ou *Macrele*, Dale. Cet Oiſeau eſt plus grand que le précédent. M. KLEIN penſe que l'un & l'autre ne ſont que des varietés. En Allemand *Meer-Waſſer-Teuſſel.*

3. FOULQUE brune à bec menu, d'Edouard *p.* 46. *Fulica fuſca, roſtro-tenui.* C'eſt un Oiſeau de la Baye de Hudſon. En Allemand *Braunes Dunſchnaeblich Waſſer-hun.* La machoire ſupérieure eſt un peu courbe au bout ; le col en quelque façon couleur de chair ; le deſſus de la tête cendré ; le bas du corps blanc ; le deſſus brun ; aux ailes un tache blanche ; & les pieds bleus.

Voilà les différentes Familles des Oiſeaux, de M. KLEIN, & les Ordres où M. LINNÆUS les a placés. Nous avons pluſieurs autres Genres qui ne ſont pas encore aſſez connus pour en parler avec aſſurance, & les placer dans le rang qui leur convient. Cela ne

nous empêche pas d'en donner les deſcriptions qu'en ont fait ou les Naturaliſtes ou les Voyageurs. *

Mais que d'erreurs commiſes dans l'ornithologie par une infinité d'Auteurs ? dit M. KLEIN. Combien de choſes qu'on deſireroit ſavoir, & que ces Auteurs ont laiſſé à débrouiller à d'autres. Les Anciens & les Modernes ont rangé, comme ils ont pu, ou comme ils ont voulu, la *Claſſe des Oiſeaux.* La plûpart ont donné des Ordres ſans ordre, ſur leſquels ils ont conſtruit leur Hiſtoire. D'autres, ſentant la difficulté de ce travail, ont mieux aimé choiſir l'ordre alphabétique : ce ne ſont peutêtre pas les moins ſages.

Entre les meilleurs *Ornithologues*, ajoute M. KLEIN, ſont Willughby & Rai, qui tous les deux ne ſe ſont pas rebutés des difficultés qu'ils ont rencontrées, pour donner dans un ordre méthodique l'Hiſtoire Naturelle des Oiſeaux. Mais ces deux Savans ſe ſont trouvés embarraſſés dans la route qu'ils avoient à prendre. Dabord ils ont voulu ranger les Oiſeaux ſuivant la figure de leur bec & de leurs ongles. Mais cette méthode n'a pas conduit loin Willughby & Rai. ** Ils s'en ſont écartés pour parler des *Oiſeaux* ſuivant les lieux qu'ils habitent, leur maniere de vivre, leur grandeur, leurs bonnes ou mauvaiſes qualités. Ils les ont diviſés en Oiſeaux terreſtres & aquatiques, en mangeurs de chair, & en mangeurs d'inſectes ; en *très-grands*, *moyens*, *petits*, & *très-petits* ; en *généreux* & en *lâches.* Ce ſyſtême, continue M. KLEIN, pour ce qui regarde l'Hiſtoire entiere, Phyſique ou Morale des Oiſeaux, n'en préſentera jamais aux yeux du Lecteur l'ordre naturel, cet ordre établi par la nature même, le plus ſimple, le plus certain, le plus naturel, & conſéquemment le plus à portée de tout le monde.

Qu'on s'imagine, continue-t'il, un aſſez vaſte cabinet transformé en voliere, peuplée d'Oiſeaux de toutes les Familles, de tous les Genres, de toutes les Eſpeces, & de différentes varietés. Pour en ſavoir

* Dans le *Dictionnaire des Aulmaux.*

** M. LINNÆUS a ſuivi la même méthode, mais avec plus de ſuccès.

faire la distinction, pour les ranger méthodiquement ; & pour les bien connoître, les mettra-t'on en pieces & les plumera-t'on ? Etudiera-t'on leur peau, leurs boyaux, leurs crânes, leurs intestins, leurs ovaires, &c ? non, sans doute. Ou, sans vouloir faire des Observations anatomiques, se contentera-t'on pour les distinguer, du simple amusement de les entendre chanter tous ensemble ? Quelle confusion seroit-ce d'ouir les *Milans* avec les *Hérons* & les *Colymbes*, les *Moineaux* avec les *Faucons*, les *Perdrix* avec les *Hupes*, les *Bécasses* avec les *Corbeaux*, & ainsi des autres ?

Mais en examinant la figure extérieure de ces Oiseaux, on saura distinguer l'ordre dans lequel ils doivent être mis. Tel est à peu près le raisonnement de M. KLEIN. Catesby, Edouard, Albin, & plusieurs entre les Modernes, ont bien peint & décrit presque tous les Oiseaux qu'ils ont eus entre les mains, sans beaucoup s'inquieter du rang qu'ils doivent avoir. Peutêtre qu'ils attendent que leur collection soit plus complette.

Une parfaite Ornithologie, une Histoire naturelle des Oiseaux n'est pas l'ouvrage de la vie d'un seul Savant. Ebauchée, ainsi que celle des autres Animaux, par Aristote & par Pline, débrouillée de siecle en siecle jusqu'à nos jours par les nouvelles découvertes, elle se perfectionne en s'enrichissant de plus en plus par les Observations des Savans Modernes.

Nous avons marié ensemble la Méthode de M. KLEIN & celle de M. LINNÆUS ; ou plutôt en expliquant celle du premier nous faisons connoître l'autre. La *Fauna Suecica* de M. LINNÆUS ne contient que la notice des Animaux connus en Suede, & qui presque tous sont connus ailleurs, & bien peu de particuliers à la Suede. M. KLEIN dans son *Ornithologie* embrasse tous les Oiseaux connus dans les quatre parties du Monde.

Ce Savant a eû des raisons pour ne pas assigner une Famille, un Genre & une espece, à plusieurs. Incertain du rang qu'il leur devoit donner, il les a même

passé sous silence, parcequ'il leur a trouvé des noms & des surnoms impropres, & que les descriptions en sont défectueuses. Il y a des Auteurs qui parlent d'Oiseaux aquatiques merveilleux, mais il laisse à d'autres Savans à en examiner l'existance.

Il a trouvé dans Feuillée (*Tom. III.*) des noms & des surnoms impropres, & des descriptions défectueuses. En voici la notice.

1. *pag.* 20. le Peroquet couleur de feu, & cendré à bec dentelé. ; *Psittacus flammeus, viridis & cinereus, rostro ferrato.*

2. *pag.* 98. Le Fou ; *Fiber marinus rostro, acutissimo adunco ferrato.*

3. *pag.* 116. La Frégate, ou le Vautour marin ; *Vultur marinus leucocephalus.* Albin *Tom. III. n.* 42. en parle, & il le nomme en Anglois *The Fregatte Bird.* M. KLEIN ne sait pas pourquoi on donne à cet Oiseau les pieds d'un *Pic*, ou d'un *Perroquet.* Labat, *Tom. VI.* Voyages de l'Amérique, en fait aussi mention.

4. *pag.* 125. Petite Corneille de l'Amérique noire ou brune ; *Cornicula Americana nigra aut fusca.*

5. *pag.* 240. Musicien, ou *Erithacum*, cendré noir.

6. *pag.* 205. Poule de Bois à queue longue ; *Gallinula sylvestris caudâ longiori.*

7. *pag.* 287. Heron, ou *Calydris leucophæa.*

8. *pag.* 288. Poule de Marais, *Gallinula palustris.*

9. *pag.* 289. Pie de Mer, *Hæmantopus marinus.*

10. *pag.* 386. Moineau tacheté, *Passer maculosus.*

11. *pag.* 391. Le Grand Plongeon bleu, *Mergus major leucophæus.*

12. *pag.* 392. La Foulque variée, *Fulica varia calyptrata.*

13. *pag.* 393. Canard varié Hupé, *Anas varia crissata.*

14. *pag.* 408. La Pie nommée *Pica artillana.*

15. *pag.* 410. Pluvier qui a les jambes couleur de vermillon, *Pluvialis miniatis cruribus.*

16. *pag.* 408. Perdrix ou Tourterelle rouge dont les yeux & les jambes sont de couleur coralline. *Perdrix*, ou *Turtur rubeus cruribus & oculis Corallinis.*

17. *pag.* 413. Loriot, ou *Chloris Erithacoïs.*

*L'Hiſtoriæ Avium Prodromus* de M. KLEIN, imprimé à Lubec en 1750. commence par une courte Préface ſur l'Ordre des Animaux en général. Cet Ouvrage eſt diviſé en trois parties. La premiere traite de l'origine des Oiſeaux. La ſeconde eſt ſon *Ordo Avium.* La troiſiéme parle des Oiſeaux Paſſagers. On trouve enſuite l'Hiſtoire du Rat des Alpes, ou de la Marmote, & une Nomenclature Latine & Allemande de tout le Regne Animal. *L'Ordo Avium* eſt la partie ſeule dont nous avons eu beſoin. Paſſons à la Claſſe des Amphibies.

Tab. III.
pag. 201. Tom. I.

1.

2.

3.

4.

5.

Blaisonneuve Sculp.

# A SYSTÈME NATUREL DU *REGNE ANIMAL*,

## PARTIE TROISIEME.

## *CLASSE DES AMPHIBIES ET DES REPTILES.*

ON entend par *Amphibies*, des Animaux qui fréquentent l'Eau & la Terre, *Animalia aquas & ſiccum frequentantia*, dit M. KLEIN dans ſes remarques abregées ſur les Animaux douteux des Claſſes des *Quadrupedes* & des *Amphibies*, faites à l'occaſion du *Syſtema Naturæ* de M. LINNÆUS *pag.* 25. §. XVII. *Not. A.* *

M. LINNÆUS diſtribue ſes *Amphibies* en deux Ordres, qui ſont les *Reptiles* & les *Serpens*. Les *Reptiles* comprenent trois Genres d'Animaux qui ont quatre pieds. Le premier eſt la *Tortue*, qui a une queue & a le corps couvert d'une écaille : *Teſtudo corpus cauda-*

* Voyez la Traduction que nous en avons donnée.

*tum, testâ munitum.* Le second la *Grenouille*, qui n'a point de queue, ni d'écailles, & dont le corps est nud : *Rana, corpus nudum, caudâ squammisque destitutum.* Le troisiéme le *Lézard*, qui a une queue, dont les uns ont le corps nud & les autres écailleux. Le second Ordre des *Amphibies* comprend les *Serpens*, Animaux qui n'ont point des pieds : le Célébre Naturaliste Suédois en explique les différens Genres, sous le nom *Anguis.* Ils ont le corps rond & couvert d'écailles : *Serpentia, pedes nulli, corpus squammosum, teres.*

# ORDRE PREMIER.

## *REPTILES.*

## GENRE PREMIER.

### *TORTUES.*

LA *Tortuë*, en Latin *Testudo*, en Allemand *Schildkroete*, en Anglois *Tortoise*, se divise en *Tortue terrestre*, d'*Eau douce*, & *de Mer.* Il suffiroit de faire deux distinctions de *Tortues.* Savoir celle de terre & celle de mer. Mais on tire leur différence des lieux qu'elles habitent, & cet arrangement ne laisse pas d'avoir son incommodité & de causer de l'amphibologie, dit M. KLEIN. Il est plus sûr, ajoute-t-il, de les distinguer en *Tortues* qui ont les doigts séparés, *digitis discretis*; & en *Tortues* qui ont les doigts irréguliers, *pedibus digitisve Anomalis.* Suivons la distinction de ce Naturaliste.

I.

*TORTUES* de terre, de bourbe ou d'eau douce, à doigts séparés, *digitis discretis.*

1. TORTUE vulgaire, *Testudo vulgaris*, en Anglois *The common land Tortoise.* Cette espece & les autres

ont leur écaille ſupérieure convexe, & l'inférieure platte.

2. Très-grande TORTUE Terreſtre des Indes, *Teſtudo terreſtris Indica maxima*, décrite dans les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences.*

3. TORTUE, JABOTI de Marcgrave, CAGADO DE TERRA des Portugais, dont l'écaille eſt noire, & marquée de pluſieurs figures hexagones. Seba *pag.* 129. *Tab.* 8. *n.* 2.

4. TORTUE de Curaſſo, nommée *Mydas.* Celle dont Seba *pag.* 129. *t.* 80. *n.* 1. donne la deſcription, étoit de moyenne grandeur, & n'avoit pas plus de trois ans. C'eſt le *Jurucua* du Breſil. M. LINNÆUS, *Amæn. Tom. I. Amph. Gill. p.* 137. *n.* 21. en donne la deſcription.

5. TORTUE du Breſil, nommée JUBETI. Seba *p.* 129. *t.* 80. *n.* 3. & 8.

6. TORTUE de l'Iſle de Ceylan, petite *Tortue* de terre, nommée *Jurukua*, dont tout le corps eſt d'un roux clair. Seba *ibid n.* 4; varieté de celle du *n.* 4.

7. TORTUE de la Nouvelle Eſpagne, nommée *Kagado d'Agao*, dont l'écaille eſt d'un grand poli, & les pieds & la queue d'une couleur d'or embruni. Seba. *ibid. n.* 5.

8. Petite TORTUE d'Amboïne, *Teſtudo Amboïnenſis minor*, dont l'écaille eſt d'un rouge clair éclatant. Seba *p.* 130. *t.* 80. *n.* 7. *figur.* 8. M. LINNÆUS *Amæn. Tom. I. p.* 137. *Amph. Gyll. n.* 24. joint à cette eſpece eſpece de *Tortue* la *Teſtudo picta vel ſtellata* de Wormius, *Mus. p.* 317. la *Teſtudo teſta teſſellata major* de Madagaſcar, dont parle Grew, *Mus. pag.* 36. *Tab.* 3. *fig.* 1. 2. La *Teſtudo teſſellata* de Rai, *Quad. p.* 259. & le *Jaboti* de Piſon *p.* 106. *fig.* 105.

9. Autre petite TORTUE d'Amboïne, dont la couleur eſt d'un roux clair Seba *p.* 126. *t.* 79. *n.* 1.

10. TORTUE de l'Iſle de Ceylan, dont les pieds & la tête ſont couverts de petites écailles. Seba *ibid. n.* 3.

11. Petite TORTUE des Indes Orientales. *Teſtudo terreſtris puſilla ex Indiâ Orientali.* Wormius *Mus: p.* 313. Rai *Quad. p.* 259. La *Tortue* de la Virginie *Teſtudo*

*Virginiana*, dont parle *Grew*, *Mus. p.* 38. *Tab.* 3. *fig.* 3. eſt la même. M. LINNÆUS (*Syſt. Nat. Edit* 6. *p.* 37. *n.* 95.-2. & *Amænit. Tom. I. Amph. Gyll. pag.* 139. *n.* 23, où il en donne la deſcription), la nomme *Teſtudo unguibus acuminatis palmarum plantarumque quaternis*: Tortue, qui a quatre ongles pointus aux pieds de devant & de derriere.

## II.

### *TORTUES* de Mer, dont les pieds ſont irréguliers; *pedibus anomalis.*

Les pieds de ces *Tortues* leur ſervent & à nager & à venir ſur les rivages afin d'y dépoſer leurs œufs, & même y dormir. Il y en a de ſi grandes dans la mer des Indes, que quatorze hommes peuvent ſe tenir debout a côté les uns des autres ſur une écaille de ces *Tortues*. Voyez Rai *Synop. Quad. pag.* 235. Edouard *pag.* 206. ſur des *Tortues monſtrueuſes* à deux têtes. Elles dépoſent leurs œufs dans le ſable, qui éclofent à l'ardeur du ſoleil: ce qui eſt commun à toutes les *Tortues*; car elles ne couvent point; & leurs œufs ſont quelquefois au nombre de cent.

1. TORTUE de mer vulgaire, *Teſtudo vulgaris*. Elle eſt commune au Breſil, & dans les Iſles Caribes. La chair d'une de ces *Tortues* ſuffit pour nourrir dans un repas quatre vingt à cent hommes; ſi c'eſt la même que la *Tortue de mer* de l'Amérique, dont parle Seba *I. pag.* 130. *Tab.* 80. *fig.* 9; & celle de Geſner. *Quad. p.* 78. Aldrovande *Quad. p.* 712. *Tab.* 714. Grew *Mus. p.* 38. *Tab.* 3. *fig.* 4. Olearius *Mus p.* 27. *Tab.* 17. *fig.* M. LINNÆUS la nomme dans ſes *Amænit. Tom. I. p.* 138. *Amph. Gyll. n.* 22. *Teſtudo unguibus acuminatis palmarum duobus, plantarum unico.*

2. TORTUE de mer du Bréſil, nommée *Jurucua* & par les Portugais *Nartaruga*. Elle a des figures géometriques ſur ſon écaille. C'eſt la *Tortue franche* de Rochefort, de la même figure que la *Tortue* de Caëmann du même. La chair en eſt noire.

3. TORTUE de mer, nommée CARET, plus petite que les précédentes, dont parle Rochefort. Les Pêcheurs de Dieppe en prirent une l'année dernière (1752.) qui fut portée à Fontainebleau parmi le Poisson destiné pour la Table de la Reine.

4. Catesby *II. p.* 38. donne quatre especes de *Tortues de mer*, dont la *Tortue* verte, ou la *Tortue* franche de Rochefort, est du nombre.

5. TORTUE, nommée le Coffre, *Testudo Arcuata.* Elle n'est pas commune, & son écaille de dessus est plus convexe que dans les autres especes.

6. Seba *p.* 127. *t.* 79. *n.* 4. 5. 6. 7. donne la figure de trois petites *Tortues* de mer.

7. Autre TORTUE de mer de l'Amérique, dont parle Seba, *Thes. I. p.* 127. *t.* 79. *f.* 4. 5. 6. qui n'a qu'un grand ongle, qui lui couvre les pieds, & un autre, qui est à peine visible. M. LINNÆUS *Amæn. Tom. I. p.* 284. *Mus. Princ. n.* 7. la nomme *Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque solitariis.*

* Les *Tortues*, c'est la remarque de M. KLEIN, *Summ. Dubi. p.* 27. *Not.* (*n*), n'ont ni dents molaires ni autres; mais, comme le dit M. PETIT *Mém. de l'Acad. Roy. des Sc.* 1737. *p.* 150. des mâchoires revêtues d'un cartilage, qui forme plusieurs rangs de dents, ou pour mieux dire de dentelures découpées, ou entaillées en forme de scie.

## GENRE II.

## *GRENOUILLES ET CRAPAUTS.*

M. KLEIN se sert du nom Grec Βατραχος pour dénommer le genre des *Grenouilles*, & des *Crapauts.* Les Grecs nomment la *Grenouille* venimeuse, qui est le *Crapaut*, Φρυνος; en Latin *Bufo*, *Rubeta*, parcequ'il se retire dans les buissons. Voyez dans notre *Dictionnaire des Animaux*, la différence qu'il y a entre les *Grenouilles* & les *Crapauts.* Voici la notice des différentes especes des uns & des autres.

## I.

### GRENOUILLES.

1. GRENOUILLE vulgaire ; *Rana vulgaris, herbacea, arborea, viridis ;* en Allemand *Froſch*, en Anglois *a Frog.* Voyez *Sur la génération des Grénouilles* Swammerdam, Waller *Tranſ. Philoſ. n.* 193. Needam, Entius, Roeſelius, M. Gautier dans *ſes Obſerv. Phyſ.* ſur *l'Hiſt. Nat.*

2. GRENOUILLE de l'Amérique, qui porte une veſſie de chaque côté de la mâchoire inférieure. Seba 113. *t.* 71. *n.* 1. & 2. parle du mâle & de la femelle. En Latin *Rana Americana veſicaria.*

3. GRENOUILLE de Surinam, *Rana Surinamenſis*, Seba *p.* 114. *t.* 71. *n.* 3. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. edit.* 6. *p.* 37. *n.* 94.-1. & *Amœnit. Tom. I. Mus Princ. p.* 285. *n.* 8. La nomme *Rana palmis tetradactylis fiſſis, plantis pentadactylis palmatis, apicibus digitorum ſubrotundis.*

4. Petite GRENOUILLE du Surinam marbrée, *Surinamenſis, marmorata minor*, Seba *ibid. n.* 4. Seba *II. p.* 73. *t.* 70. *n.* 4. parle d'une autre de Surinam marquée de taches éparſes çà & là.

5. Très-belle GRENOUILLE de la Virginie, *Rana Virginiana exquiſitiſſima*, rouſſe & admirablement bien variée de pluſieurs autres couleurs. Seba *pag.* 115. *t.* 72. *n.* 3.

6. Autre GRENOUILLE de la Virgnie, *Virginiana altera*, dont les ongles ſont dégagés. Seba *ibid. n.* 4.

7. GRÉNOUILLE du Bréſil de figure ronde, *Rana Braſilienſis orbicularis.* Eſpece de *Pipa* ou de *Crapaut* du Pays, ou qui en a la figure. Seba *p.* 117. *t.* 74. *n.* 1.

8. Très-grande GRENOUILLE de la Virgnie, belle & rare. *Rana Virginiana maxima.* Seba parle de la femelle. p. 117. *t.* 74. *n.* 1.

9. GRENOUILLE griſe de la Virgnie. *Rana Virginiana, ſubgriſea.* Seba *p.* 120. *t.* 75. *n.* 4.

10. GRÉNOUILLE de mer de l'Amérique, *Rana ma-*

*rina Americana.* Seba *p.* 120. *t.* 76. *n.* 1. parle du mâle, qui eſt d'une prodigieuſe grandeur.

11. GRENOUILLE terreſtre de la Virginie & de la Caroline. *Rana terreſtris Virginiana & Carolinenſis.* Cateſby *pag.* 69.

12. GRENOUILLE d'eau, *Rana aquatica*; en Anglois *The watter Frog*, Cateſby *p.* 70.

13. GRENOUILLE d'arbre du même Auteur *pag.* 71. *Rana arborea viridis*; en Anglois *The green tree Frog.* Elle croaſſe toute la nuit. Sloane *Voyag. de la Jam. II. p.* 331. parle d'une très-grande *Grenouille* de la Jamaïque, de couleur brune.

14. Petite GRENOUILLE du Bréſil. *Rana Braſilienſis gracilis*, Seba *p.* 117. *t.* 73. *n.* 3. M. LINNÆUS ſous le nom de *Rana pedibus fiſſis, unguibus ſubrotundis, corpore lævi, pone anguſtato, Amœnit. Tom. I. p.* 135. *n.* 20. comprend cette eſpece de *Grénouille*; une autre que Seba *Theſ. II. p.* 76. *Tab.* 68. *fig.* 5. nomme *Ranula Americana rubra*; une dont il parlé eſt dans le *Mus Petrop. I. p.* 427. *n.* 47. ſous le nom de *Rana Surinamenſis, pronè cæruleſcentis, ſupinè albi coloris, ad latera utrinque maculis nigris notata*; & une autre, dont il eſt parlé dans le même Ouvrage *Mus Petrop. I. p.* 428. *n.* 55. ſous le nom de *Rana Americana parva, ventre albido, dorſo plombei coloris, lateribus ex albo & nigro variegatis*: ce ne ſont que des varietés. C'eſt auſſi la même *Grenouille*, dont parle M. LINNÆUS *Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 94.-4.

15. GRENOUILLE, nommée *Lemnia*, parce qu'elle devient la nourriture d'un *Serpent* nommé *Lemnia.* Seba *II. pag.* 16. *t.* 13. *n.* 2.

16. GRENOUILLE tachetée d'Afrique, *Rana maculoſa Africana.* Seba *p.* 37. *t.* 37. *n.* 4.

17. Grande GRÉNOUILLE d'eau de l'Amérique, *Rana maxima Americana aquatica*, nommée *Grénouille* mugiſſante par Cateſby *p.* 72. en Anglois *The Bull Frog.*

18. GRENOUILLE de l'Amérique marbrée de brun, *Rana Americana ex fuſco marmorata.* Vincent. *In Deſcript. Buſon. p.* 53. *n.* 22.

19. GRENOUILLE, nommée par M. LINNÆUS *Amœn.*

*Tom. I. Mus. Princ. p.* 285. *n.* 9. *Rana pedibus fissis; palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, geniculis tuberosis.* Cette *Grenouille* convient, dit ce Naturaliste, avec la grande *Grenouille* de la Virginie, belle & rare, de Seba, par les tubercules quelle a sous chaque doigts des pieds. Nous en avons donné la Notice *n.* 9.

20. GRENOUILLE dont il est parlé dans le *Voyage de W-gothie p.* 261. nommée par M. LINNÆUS *Syst. Nat. édit.* 6. *n.* 94.-5. *Rana palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis, subpalmatis, ano obtuso, subtus punctato.*

21. GRENOUILLE Aquatique, d'Aldrovande *Ovip.* 89, de Rai *Quad.* 247. de Bellon. *Aquat.* 54. de Charleton *Onom.* 24. de Schonefeld. *Ichth.* 59. de Bradelet *Nat.* 21. *f.* 1. de Gesner *Ovip.* 46. de Jonston *Quad.* 130. Elle est nommée *Rana temporaria* dans le *Voyage d'Oelande*; en Suedois *Groda*; en Smolandois *Freo*; en Ostrobothnie *Kloassa*. Dans la *Faunâ Succicâ* de M. LINNÆUS *n.* 250. & dans son *Systema Naturæ édit.* 6. *n.* 94.-6. *Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiore.*

On lit dans Mᵉ. Merian, qu'il y a des *Grenouilles* qui deviennent Poissons. M. LINNÆUS met la *Grenouille* poisson au rang des *Lezards*. Il la nomme *Syst. Nat. édit.* 6. *n.* 93.-2. *Lacerta caudâ ancipiti, palmis tetradactylis fissis, plantis pentadactylis palmatis, abdomine ventricoso.*

## II.

## CRAPAUTS. *Bufones.*

1. CRAPAUT, nommé par les Naturalistes *Bufo* & *Rubeta*, par les Suedois *Padda*, par les Smolandois *Toassa*. Animal qui a les pieds de devant divisés en quatre doigts, ceux de derriére palmés & composés de six doigts. Le pouce est plus court que les autres. Il est nommé dans le *Faunâ Suecicâ* de M. LINNÆUS *n.* 253. & dans son *Syst. Nat. édit.* 6. *n.* 94.-7. *Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice breviore.* Rai *Quad.* 252. Rondelet *Aquat.* 2. *p.* 221.

221. Charleton *Onom.* 24. Bradley *Nat.* 1. *t.* 21. *f.* 2. Jonſton *Quad.* 131. &c. parlent du *Crapaut*. Voici la Notice des *Crapauts étrangers*, ſuivant M. KLEIN; d'après Seba.

2. CRAPAUT du Bréſil, nommé *Aquaqua*, peu commun, & ſingulier par ſes couleurs & ſa figure. *Bufo Braſilienſis.* Seba *p.* 114. *t.* 71. *n.* 6. & 7.

3. CRAPAUT du Bréſil, de la même eſpece que le précédent. Seba *p.* 114. *t.* 71. *n.* 8.

4. Petit CRAPAUT de l'Amérique tacheté. Seba *p.* 115. *n.* 9. *Bufo Americanus minor, maculatus.*

5. CRAPAUT cornu & épineux de la Virginie. *Bufo cornutus & ſpinoſus Virginianus.* C'eſt un Animal prodigieux. Seba *pag.* 115. *t.* 72. *n.* 1. & 2.

6. CRAPAUT très-rare de l'Amérique, *Bufo Americanus rariſſimus*, décrit par Vincent *pag.* 6.

7. CRAPAUT ſans tête d'Afrique. *Bufo acephalus*, *Rana*, *Rubeta Africana.* Il y en a trois varietés, & qui ſont toutes venimeuſes. Seba *II. p.* 37. *t.* 37. *n.* 3.

8. CRAPAUT du Bréſil, nommé *Aguaquaquan*, de figure ronde, *Bufo Braſilienſis orbiculatus.* Seba *p.* 116. *t.* 73. *n.* 1.

9. CRAPAUT de l'Amérique, nommé PIPAL. *Bufo Americanus Pipal*, Seba *p.* 122. *t.* 77. *n.* 4. *ibid. p.* 121. *n.* 1. 2. & 3. nommé par M. LINNÆUS *Syſt. Nat. edit.* 6. *n.* 94. -8. *Rana dorſo pullifero.* C'eſt un Animal dont le poiſon eſt très-ſubtil.

10. Petit CRAPAUT de l'Amérique, *Bufo minor Americanus.* Sa couleur eſt cendrée, & il eſt très-rare. Vincent *de Ran. & Buf.* p. 50.

11. CRAPAUTS qui ſe trouvent en Pruſſe, & qui ſont tous venimeux. M. KLEIN *Diſpoſ. Quad. p.* 122. dit y en avoir vû de huit eſpeces différentes par la grandeur, la couleur, le regard affreux, les pieds, & les puſtules qu'ils ont ſur le corps.

Voyez pour les Deſcriptions des *Grenouilles* & des *Crapauts*, notre *Dictionnaire des Animaux.*

* Selon la remarque de M. KLEIN, *Summ. Dub. ad Claſſ. de Amph. not.* 7. *p.* 27. On met dans la Claſſe des *Amphibies*, les *Crapauts* & les *Grenouilles.* Mais

il y a peu de *Crapauts* qui fréquentent l'eau, à moins que ce ne ſoient ceux des Indes. Les *Crapauts* qu'on voit en Europe, ſe trouvent dans les mazures, les vieux murs, les fentes de rochers (la Fable dit même dans les pierres), dans les caves, le fumier, en terre, où ils font leurs nids, & ils ne peuvent ſupporter l'eau. Ainſi ils ne ſont pas à proprement parler des *Amphibies*. Voyez Aldrovande de *Quad. Digit. Ovip. p.* 613. La *Grenouille d'arbre* ne peut pas auſſi être nommée un *Amphibie*, car elle ne va jamais dans l'eau; elle ſe contente de ſucer la roſée qui ſe trouve ſur les fruits & les feuilles, & elle paſſe la nuit dans les arbres. Ses pieds ſont faits plûtôt pour grimper, que pour nager.

La *Grenouille* rampe-t-elle, ou eſt-elle un Animal *Reptile*? Ceci eſt un Paradoxe; & nous penſons avec M. KLEIN que perſonne n'en a vû ramper. Elles ſautent, & elles n'ont que des pieds faits pour ſauter.

## GENRE III.

### *LÉZARDS.*

Sous le nom de *Lézards* ſont compris, le *Crocodile* & le *Caïman*, que M. KLEIN nomme *Cataphracta*, cuiraſſés; il les diſtingue des *Lezards* proprement dits, parcequ'ils ont la peau du dos ſi dure, qu'elle eſt impénétrable aux traits, & de plus ils n'ont point de langue. Ce Naturaliſte appelle les *Lezards*, nuds, *nuda*. Les uns ont la peau unie, *dorſo lævi*; les autres la peau couverte d'écailles comme les *Serpents*, *dorſo pectinato*; les autres le corps fait comme les *Salamandres*, & ſont nommés *Salamandrina*; les autres ſont les *Salamandres*, parmi leſquelles on comprend le *Gerko*, le *Cordyle*, le *Scinque*, le *Seps*, eſpece de *Scolopendre*, & le *Cameleon*.

I.

## *CROCODILE.*

1. CROCODILE, *Amphibie* qui fait des œufs de la groſſeur de ceux des *Oies*, & qui éclofent à l'ardeur du Soleil. Le Nil dans l'Egypte, le Niger en Afrique, le Gange dans les Indes, ſont des fleuves où il y a des *Crocodiles*. On met quelque différence entre les *Crocodiles* de ces Païs, & ceux de l'Amérique nommés *Caïmans*. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. édit. 6. n. 93. 1.* & *Amœnit. Tom. I. Amph. Gyll. p. 121. n. 10.* nomme le CROCODILE, *Lacerta, caudâ ancipiti, pedibus triungulatis, palmis pentadactylis, plantis palmatis tetradactylis.* Seba *Theſ. Tom. I. p. 160. Tab. 103.* & 104. Jonſton *Quad. pag. 200. Tab. 73. fig. 3.* Schwenkfeld *Rept. p. 145.* Aldrovande *Quad. p. 667.* Charleton *Exercit. p. 29.* Geſner *Quad. p. 3.* Rondelet *Piſc. p. 232.* Belon *Aquat. p. 41.* Sloane *Hiſt. II. pag. 332.* Olearius *Mus. p. 8. Tab. 7. fig. 3.* Mathiole ſur Dioſcoride *pag. 278. Tab. 278.* Bontius *Hiſt. de Java. p. 55. Tab. 55.* ſur le *Caïman*; Bochart *Hieroz. L. I. c. 7.* qui dit que le *Crocodile* eſt le *Leviathan* de Job. Piſon *Americ. pag. & Tab. 288.* Rai *Quad. pag. 261.* ſur le plus grand *Crocodile*; le *Muſæum Petropolitanum I. pag. 433. n. 1.* ſur un *Crocodile d'Afrique*. Voilà les Auteurs qu'on peut conſulter, & notre *Dictionnaire des Animaux*, où nous en donnons la deſcription & l'Hiſtoire. N'oublions pas Wormius, Feuillée *III. p. 571.* les *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, Hernandez & Labat.

2. CROCODILE de l'Amérique. *Crocodilus Americanus.* Il y en a pluſieurs varietés, qui different entr'eux, non ſeulement par la grandeur, mais auſſi par la figure & par la couleur. Seba *p. 167. t. 106. n. 1.*

3. CROCODILE des Indes Occidentales. C'eſt l'*Alligator*. Cateſby *p. 63.*

4. CROCODILES nommés *Caïmans*, de l'Iſle de Ceylan, d'Afrique & d'Amérique. Seba *I. t. 103. 104. t.*

105. *n.* 3. Il y a des varietés parmi ces *Caïmans.* Voyez Bruyn dans ſes Voyages *p.* 355.

* Le *Crocodile* eſt un Animal pareſſeux, qui ne ſe tourne pas aiſément. Boſman dans ſon Hiſtoire de la Côte d'or en Guinée *Tom. II. p.* 29. dit qu'il en a vû plus de cinquante en un jour, qui avoient au moins vingt pieds de long. Le *Crocodile* eſt un Animal Amphibie ; il fréquente la terre comme l'eau. Il a 68 dents en tout, pointues comme des alênes, rangées & ſerrées comme les dents d'un peigne, 38 à la mâchoire ſupérieure, & 30 à l'inférieure. KLEIN *Summ. Dub. in Claſſ. de Amph. pag. Not.* 1.

## II.

## *LÉZARDS.*

On entend par *Lézards*, en le prenant dans un ſens ſtricte, des *Reptiles* qui ont la tête & le bout des mâchoires faits comme les *Serpens*, & la queue fourchue.

*LÉZARDS* à dos uni, *dorſo lævi.*

1. LÉZARD vulgaire, *Lacerta vulgaris*, dont parle Rai *Quadrup. p.* 264. Petivert *Mus.* 19. *n.* 116. Il ſe trouve dans les bois. M. LINNÆUS le nomme *Faun. Succ. n.* 254. *Lacerta pedibus inermibus, manibus tetradactylis, palmis pentadactylis, corpore livido, lineâ dorſali fuſcâ duplici.*

2. LÉZARD verd. *Lacerta viridis.* Rai *Quad. p.* 264. On en trouve dans les Prés.

3. LÉZARD vulgaire, à ventre noir, tacheté, qui ſe trouve dans les pierres. *Lacertus vulgaris, ventre nigro maculato* ; nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 1352. *Lacerta caudâ tereti, verticillatâ longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis* ; & *Syſt. Nat. édit. 6. n.* 93-6.

4. Très-grand LÉZARD de l'Amérique. *Lacertus* ou *Lacerta Americana maxima.* Seba *p.* 158. *t.* 101. nommé

*Caudiverbera*, parcequ'il remue continuellement la queue, & qu'il la tortille.

5. TEJUGUACU, très-grand *Lezard* de l'Amérique, nommé *Sauvegarde* en François. Il eſt marbré. C'eſt un Amphibie. Seba *p.* 154. *t.* 99. *n.* 1.

6. Grand LÉZARD de la nouvelle Eſpagne, nommé *Tilcuetzpallin* par Hernandez. Seba *p.* 152. *t.* 97. *n.* 2.

7. LÉZARD nommé *Tegujuacu*, *Texixincoyotl*, & *Tecuixim*. Seba *p.* 152. *t.* 96. *n.* 3. Les petits *n.* 1. & 2. M. LINNÆUS *Amœnit. Tom. II. Amphib. Gyllenb. p.* 128. *n.* 14. *Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 93.-19. le nomme *Lacerta caudâ tereti, corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, criſtâ nullâ, hypocondriis plicatis.*

8. LÉZARD de l'Amérique tacheté. *Lacerta Americana maculata.* Seba *p.* 136. *t.* 85. *n.* 2.

9. Petit LÉZARD bleu de l'Amérique, nommé *Argus.* Seba *ibid. n.* 3. M. LINNÆUS *Amœnit. Tom. I. Amph. Gyllenb. p.* 127. ſous le nom de *Lacerta caudâ tereti, corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, criſta nulla, ſcutis abdominalibus* XXX. comprend le *Lezard* tacheté de l'Amérique. Seba *I. p.* 136. *Tab.* 85. *fig.* 2. l'*Argus*, le grand *Lezard* de Surinam, nommé *Ameira*, & dont parle Seba *I. p.* 140. *Tab.* 88. *fig.* 2. le *Lezard* des Indes de Cluſius *Exot. p.* 115. *Tab.* 115. de Rai *Quad. p.* 270. de Wormius *Mus. p.* 313. *Tab.* 313. & enfin le *Lezard* de Ceylan, qui a la tête d'un *Crocodile*; nommé dans le *Mus. Petrop. I. p.* 456. *Lacerta Ceilonica Crocodili capite, maxima, & ex griſeo, & nigro varia, ſtelluliſque albis tranſverſim ſitis notata, caudâ longâ.* Tous ces *Lezards* ne ſont que des variétés.

10. LÉZARD de l'Amérique, dont les écailles ſont tranſparentes. *Lacerta Americana.* Seba *ibid. n.* 4.

11. LÉZARD étoilé. *Lacertus ſtellatus Mauritanus.* Seba *p.* 138. *t.* 86. *n.* 4. 5.

12. LÉZARD marbré. Seba *ibid. n.* 6.

13. LÉZARD de l'Iſle de S. Euſtache. C'eſt un très-beau *Lezard.* Seba *p.* 139. *t.* 87. *n.* 4. 5.

14. LÉZARD de Surinam, dont le dos eſt d'un bleu clair, & la queue menue. Seba *p.* 139. *t.* 88. *n.* 1.

15. Autre LÉZARD plus grand de Surinam, nommé *Ameira*. Seba *p.* 140. *t.* 88. *n.* 2. C'eſt une varieté du *Lezard n.* 3.

16. LÉZARD de l'Amérique, à queue très-longue, nommé *Temapara*. Seba *ibid. n.* 4. Il eſt nommé par M. LINNÆUS *Amœnit. Tom. I. p.* 129. *Amph. Gyll. p.* 15. *Lacerta caudâ tereti, corpore triplo longiore, pedibus pentadactylis, gulâ ſubcriſtatâ.* Le *Lacerta Chalcitica ex Gallœcia* de Seba *II. p.* 79. *Tab.* 76. *fig.* 4. en eſt une varieté, ainſi qu'un autre nommé par M. LINNÆUS *ibid. Mus. Princ. pag.* 288. *n.* 13. *Lacerta caudâ tereti, corpore longiore, pedibus pentadactylis, gulâ ſubcriſtatâ, anticè dentatâ, dorſo lævi.*

17. LÉZARD de l'Amérique, couvert depuis le dos juſqu'à la queue, de petites écailles d'un rouge éclatant-clair. Seba *p.* 141. *t.* 89. *n.* 3.

18. LÉZARD tigré de l'Iſle de Ceylan, à queue fourchue. Seba *p.* 143. *t.* 90. *n.* 7.

19. LÉZARD de Rio de Zaneiro, magnifique par ſes couleurs, mâle & femelle. Seba *p.* 143. *t.* 91 *n.* 1. 2.

20. LÉZARD du Breſil de Baia, nommé *Taraguira*. Seba *p.* 144. *t.* 91. *n.* 3.

21. LÉZARD du Breſil, nommé *Tecunhana*. Seba *p.* 144. *t.* 91. *n.* 4.

22. LÉZARD du Breſil, qui depuis la tête juſqu'à la fin de la queue, eſt d'un cendré clair, roux & brun, avec de larges bandes qui traverſent. Seba *p.* 144. *t.* 92. *n.* 1.

23. LÉZARD à queue fourchue du Breſil. Seba *p.* 145. *n.* 3.

24. LÉZARD de Guinée bleu. Seba *ibid. n.* 4. de la *Tabl.* 92. Un autre *Lezard* de l'Amérique. *Lacertus Americanus lemniſcatus* de Seba *Theſ. I. p.* 88. *Tab.* 53. *fig.* 9. & un *Lezard* d'Amboïne, nommé par le même Seba *Lacerta Amboïnenſis tæniolis fimbriatis. Theſ. II. p.* 11. *Tab.* 9. *fig.* 5. 6. ſont compris par M. LINNÆUS *Amœnit. Tom. I. Amph. Gyll. n.* 16. *p.* 130. ſous le nom de *Lacerta caudâ tereti, corpore ſeſquilongiore, pedibus pentadactylis, dorſo lineis longitudinalibus ſtriato.* C'eſt auſſi la notice qu'il en donne *Syſt. Nat. p.* 93-20.

25. LÉZARD jaune & verd. Seba *ibid. n.* 5.

26. LÉZARD d'Amboïne, mâle & femelle. Seba *p.* 147. *t.* 94. *n.* 1. 2. Seba parle d'un autre *ibid. n.* 3.

27. LÉZARD, nommé *Taletec*, & *Tamacolin* dans la nouvelle Eſpagne. Seba *p.* 151. *t.* 97. *n.* 1. différent d'un autre dont nous parlerons plus bas.

28. LÉZARD du Breſil, nommé *Quetzpaleo*, dont la queue eſt couverte d'anneaux & epineuſe. Seba *p.* 152. *t.* 97. *n.* 4.

29. LÉZARD du Mexique, nommé *Cutezpallin*; très-beau *Lezard*, qui ne fait point de mal, *ibid. n.* 5.

30. LÉZARD du Breſil, nommé *Taraguico Aycuraba*. Seba *p.* 154. *t.* 98. *n.* 3.

31. LÉZARD de Ceylan, nommé *Teyuguacu*. Seba *p.* 155. *t.* 99. *n.* 2.

32. LÉZARD d'un roux foncé. Seba *p.* 157. *t.* 100. *n.* 3.

33. Grand LÉZARD de Ceylan. Seba *p.* 165. *t.* 105. *n.* 1. *p.* 166. *t.* 105. *n.* 2. & un autre petit *Lezard* de l'Iſle de Ceylan, d'un jaune verd & clair. Seba *p.* 172. *t.* 109. *n.* 2.

34. LÉZARD ſingulier de l'Amérique, dont la queue eſt très-longue, & très-menue par le bout. Seba *p.* 174. *t.* 110. *n.* 4. La femelle au *n.* 5.

35. LÉZARD qui a ſur la tête comme la figure d'un double peigne, & depuis la tête juſqu'à la queue, qui eſt menue, des taches blanches. Seba *p.* 116. *t.* 72. *n.* 5.

36. LÉZARD à longue queue. *Lacerta longicauda*. Seba *p.* 119. *t.* 75. *n.* 2.

37. LÉZARD de Virginie, nommé *Taletec*. Seba *p.* 121. *t.* 76. *n.* 2.

38. LÉZARD verd de la Caroline, de Cateſby *II. p.* 65. Il a cinq pouces de long, & il change de couleur.

39. LÉZARD verd de la Jamaïque, qui a ſix doigts de long. Cateſby *p.* 66.

40. LÉZARD à queue bleue, de la Virginie & de la Caroline, qui a ſix pouces de long. Cateſby p. 67.

41. LÉZARD gris du même Païs. Cateſby *p.* 68. de cinq ou ſix pouces de long.

42. LÉZARD volant, ou petit LÉZARD volant. *Lacertus volans ſeu Dracunculus alatus*, Belon *Sing. des Obſerv. II. c.* 70. Bontius *p.* 59. l'a peint avec deux pieds. Rai *Synop. Quad. p.* 275. Seba *I. t.* 87. *n.* 3. & 11. *p.* 92. *t.* 86. *n.* 3. en parle. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 36. ſous le nom de *Draco*, en fait un Genre ſéparé de celui des *Lezards*; & *Amœnit. Tom. I. p.* 126. *n.* 12. il le nomme *Lacertâ caudâ tereti, pedibus pentadactylis, alis femore connexis, criſtâ gulæ triplici.* Voyez au Genre des *Ecureuils* la notice de l'*Ecureuil volant*. Ces Animaux ſe retirent dans les arbres, où ils vivent de *Mouches*, de *Papillons*, & d'autres inſectes.

43. Petits LÉZARDS de l'Iſle de Ceylan, dont les œufs ne ſont pas plus gros qu'un pois. Seba *II. p.* 4. *t.* 2. *n.* 9.

44. LÉZARDS étrangers verds, dont parle Seba *ibid. p.* 6. *t.* 4. *n.* 4. 5.

45. LÉZARD d'Amboïne, frangé. Seba *II. p.* 11. *t.* 9. *n.* 5.

46. LÉZARD d'Afrique, de couleur jaune, avec des points noirs. Seba *p.* 15. *t.* 12. *n.* 6.

47. LÉZARD du Mexique, marbré de noir & blanc. Seba *p.* 31. *t.* 30. *n.* 2.

48. LÉZARD de Ceylan à petites écailles noires & blanches. Seba *p.* 32. *t.* 32. *n.* 3.

49. Petit LÉZARD de Ceylan, garni de bandes. Seba *p.* 43. *t.* 41. *n.* 6.

50. Beau LÉZARD de Ceylan, tigré, qui ne fait point de mal. Seba *p.* 50. *t.* 49. *n.* 2.

51. LÉZARD roux d'Afrique. Seba *p.* 63. *t.* 63. *n.* 4.

52. LÉZARD de l'Amérique, bien tacheté. Seba *p.* 69. *t.* 68. *n.* 2.

53. Petit LÉZARD étranger tacheté, couvert de petites écailles d'un brun pourpré. Seba *p.* 84. *t.* 79. *n.* 5. dit avoir conſervé de ces petits Animaux dans une bouteille vuide pendant ſix mois. M. KLEIN doute

que des *Lezards* puiſſent vivre ſi longtems ſans manger.

54. LÉZARD de l'Amérique, Amphibie, nommé *Tupinambis*, & de l'eſpece de ceux qu'on nomme *Sauvegardes*. Seba *p.* 91. *t.* 86. *n.* 1.

55. LÉZARD de S. Jago de Chili, dont la femelle a une queue qui a pluſieurs petits rameaux. Seba *p.* 110. *t.* 103. *n.* 3. & 4.

56. LÉZARD nommé *Tejuguacu* & *Saurus*, de l'Iſle de Ceylan. Seba *p.* 111. *t.* 105. *n.* 1. de l'eſpece de ceux qu'on nomme *Sauvegardes*, & le premier de tous, à cauſe de la beauté de ſes couleurs. Seba *p.* 111. *t.* 105. *n.* 1.

57. LÉZARD bleu & blanc de l'Iſle de Java. Seba *ibid. n.* 2.

58. LÉZARD à tête & pieds verds. Edouard 202.

59. LÉZARD dont la queue eſt fourchue. Edouard 203.

60. LÉZARD à queue ronde, du double plus longue que le corps, qui a le cinquieme doigt du pied de derriere très-long. M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* & *Amænit. Tom. I. p.* 286. *Mus. Princ. n.* 11. en parle ſous le nom de *Lacerta caudâ tereti, corpore duplo longiore, pedibus pentadactylis, criſtâ gulæ integerrimâ, dorſo lævi.* On en voit la figure dans le même Volume des *Amæn. Tab.* 14. *n.* 11. Ce Naturaliſte lui donne le nom de *Principalis* dans ſon *Syſt. Nat. n.* 93-9.

61. LÉZARD marbré, nommé par M. LINNÆUS *Lacerta tereti longâ, pedibus pentadactylis caudâ gulâ ſubcriſtatâ, antice dentatâ, dorſo lævi, Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 93-11. *Amæn. Tom. I. Amphib. Gryll. n.* 15. & *Mus. Princ. n.* 12.

## III.

*LÉZARDS* à dos dentelé, *dorſo pectinato.*

1. LEZARD tigré, nommé *Aſcalabos*. Seba *I. pag.* 157. *t.* 100. *n.* 2.

2. LEZARD, nommé LINGUANA, SENEMBI; dans la Nouvelle Eſpagne TAMACOLIN. Seba *I. p. t.* 97. 152. *n.* 3.

Le *Lezard* de Surinam, nommé *Leguana*, Seba *Thes. I. p.* 143. *Tab.* 95. *fig.* 2. le *Lezard* de l'Amérique, nommé *Leguana* du même Seba *ibid. fig.* 1. Le *Leguana* d'Asie du même Seba *I. p.* 151. *Tab.* 96. *fig.* 4. le *Senembi* ou *Iguana* d'Amboïne, du même, *I. p.* 153. *Tab.* 98. *fig.* 1. le *Leguan* de Bontius *Jav. p.* 56. *Tab.* 56. l'*Yviana* d'Oviedo *Americ. L.* 13. *c.* 3. d'Olearius *Mus. p.* 6. *Tab.* 6. *fig.* 1. & *p.* 8. *Tab.* 7. *fig.* 2. l'*Yvana*, ou *Iguana* de Wormius *Mus p.* 313. l'*Iguana* de Nieremberg *Nat. p.* 217. *Tab.* 271. de Roberg *Differ. de lue vener. pag.* 9. *Tab.* 9. Jacob *Mus. Tab.* 4. l'*Iguane* de Rhedi *Exper.* 100. *t.* 101. le *Senembi* ou *Iguana* de Marcgrave *p.* 236. *Tab.* 236. de Jonston, *Quad. p.* 191. *Tab.* 77. *fig.* 5. le *Senembi* & *Iguana* des Indes de Rai *Quad. p.* 265. de Sloane *Hist. II. p.* 333. & le *Senembi* & *Iguana*, & *Leguan* du *Mus. Petrop. I. p.* 431. ne sont tous que le même *Lezard* différent par quelques varietés, & que M. LINNÆUS *Amœnit. Tom. I. p.* 123. *Amph. Gyllen.* nomme *Lacerta caudâ tereti, pedibus pentadactylis, cristâ dorsi longitudinali, gulâ pendulâ, anticè dentatâ.* M. KLEIN. *Disp. Quad. p.* 107. *& suiv.* donne la Notice de tous ces *Lezards*. Le *Peguana* de Ceylan, nommé *Soa-ager*, que les Européens nomment *Kemphanem*, dont Seba parle *p.* 149. *n.* 3. le *Lézard* d'Arabie de différentes couleurs, nommé *Galeotes*, Seba *p.* 145. *t.* 93. *n.* 1. le *Kolotes*, ou *Ascalabotes*, nommé par d'autres *Ophiomachus*, Seba *pag.* 146. *t.* 93. *n.* 2. un autre *Ophiomachus*, qui est une espece de *Dragon* du Brésil, Seba *ibid. n.* 4. un *Lezard* d'Orient, Seba *p.* 145. *t.* 92. *n.* 2. un *Lezard* du Mexique, Seba *p.* 140. *t.* 89. *n.* 1. un autre *Lezard* du Mexique, qui se trouve dans les rochers, nommé *Tecoixin* Seba *p.* 141. *t.* 89. n. 2. le grand *Lezard*, ou *Guannes* de Catesby *II. p.* 64. le même que celui dont parle Rai; le *Lezard solaire* de l'Amérique, qui a les marques du Soleil sur la peau, Seba *II. p.* 169. *t.* 106. *n.* 2. le *Lézard brun* & à taches noires de Galice. Seba *II. p.* 79. *Tab.* 76. *n.* 5. sont tous des *Lezards*, dont le dos est en forme de dents de peigne. Seba *Thes. I. Tab.* 100. *n.* 1. donne le nom de *Basilic* à un dragon d'arbre volant,

*Amphibie* de l'Amérique : & *ibid. Tab.* 103. *n.* 2. il parle d'un autre *Dragon* volant ou *Lezard* volant de l'Amérique.

## IV.

### *LÉZARDS* de la figure des *Salamandres.*

Ces eſpeces de *Lezards*, dit M. KLEIN, reſſemblent aux *Salamandres* par la tête, & la langue, qui eſt épaiſſe large & charnue ; & aux *Lezards* par le tronc, la queue & les pieds.

1. LÉZARD gris de St. Euſtache. Il eſt rare. Seba *I. p.* 139. *t.* 87. *n.* 6.

2. LÉZARD de l'Amérique, ſemblable à la *Salamandre.* Seba *I. p.* 146. *t.* 93. *n.* 3.

3. LÉZARD d'Amboïne. Seba *I. p.* 153. *t.* 98. *n.* 1.

4. LÉZARD de la Nouvelle Eſpagne, nommé *Ameira*, dont la queue eſt fourchue. Seba *p.* 158. *t.* 98. *n.* 2.

5. LÉZARD, nommé *Salamandre* de l'Amérique. Seba *p.* 169. *t.* 107. *n.* 1. 2. La femelle a ſur la queue de plus grandes écailles épineuſes que le mâle.

6. LÉZARD, ou SALAMANDRE de l'Amérique, ſemblable au *Lézard.* Il a à côté de la tête des épines en forme d'étoiles. Seba *ibid. n.* 3.

7. LÉZARD, ou SALAMANDRE prodigieuſe d'Amboïne. Seba *p.* 173. *t.* 109. *n*, 3. Le derriére de ſa tête, comme le *Cameleon*, eſt armé de deux cornes pointues.

8. LÉZARD, ou SALAMANDRE de Mexique, qui eſt très-rare. Seba *p*, 21. *t.* 20. *n.* 4.

9. Autre LÉZARD d'Amboïne de la figure de la *Salamandre.* Seba *ibid. n.* 4.

10. LÉZARD de la figure de la *Salamandre*, du Cap de Bonne Eſpérance, chargé de piquants. Seba *II. pag.* 10. *t.* 8. *n.* 6.

11. TAPAYAXIN, *Lézard* rond du Cap de Bonne Eſperance. Seba *ibid. n.* 7.

12. LÉZARD de l'Iſle de Ceylan. Seba. *II. p.* 17. *t.* 14. *n.* 4.

## V.

## *SALAMANDRES.*

SALAMANDRE, Σαλαμανδρα en Grec, le même en Latin; *Molch* en Allemand; en Italien *Salamantuega*, *Salamanqueſa*; en Eſpagnol *Salmender*; aux Indes JEKKO. Mais les *Salamandres* qu'on nomme JEKKO-*Salamandres* différent beaucoup des *Lezards*. Les *Salamandres*, ſuivant le ſentiment commun des modernes, ſont vivipares; ce dont cependant Seba ne convient pas. Il dit que les JEKKOS ſont de vrais *Salamandres*; & parceque les JEKKOS pondent des œufs qui écloſent par l'ardeur du Soleil, il conclut, que les *Salamandres* ſont ovipares. Tout le monde convient que les *Jekkos*, eſpece particuliere de *Salamandre*, ſont ovipares, & Seba s'eſt trompé en ce qu'il a crû, que ces JEKKOS, qu'on peut appeller *Salamandres ovipares*, ſont du même Genre que les *véritables Salamandres*, qui ſont vivipares, comme la *Vipere* l'eſt en effet. Elles ne mettent point au jour des œufs, mais elles mettent bas des petits vivans enveloppés d'une peau, & qui ſortent de cette peau en naiſſant. Le *Scinque*, le *Cordyle*, le *Seps*, ſont auſſi de fauſſes *Salamandres*.

1. SALAMANDRE terreſtre. *Salamandra terreſtris*. La *Salamandra maculoſa* de Seba *Theſ. II. p.* 15. *Tab.* 12. *fig.* 5. celle de Geſner *Quad. p.* 80. d'Aldrovande *Quad. p.* 639. de Schwenkfeld *Rept. p.* 163. d'Olearius *Mus. p.* 9. *Tab.* 8. *fig.* 4. de Mathiole ſur Dioſcoride *p.* 274. *Tab.* 234. la *Salamandra terreſtris maculis luteis diſtincta* de Charleton *Exercit. p.* 28. la *Salamandra terreſtris* de Rai *Quad. p.* 273. de Jonſton *Quad. p.* 194. *Tab.* 77. *fig.* 10. la *Salamandra terreſtris vera nigra, maculis luteis diſtincta* du Muſ. Petrop. *I. pag.* 443. *n.* 170. ſont la même eſpece, & ne different que par quelques varietés. M. LINNÆUS la nomme *Amœn. Tom. I. Amph. Gyll. p.* 131. *n.* 17. & *Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 93.-18. *Lacerta caudâ tereti, pedibus inermibus*

*palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore nudo, punctis perforato.*

2. Grande SALAMANDRE de l'Amérique, d'un cendré noir foncé, nommée MABOYA. *Salamandra Americana major.* Labat *de l'Amérique I. pag.* 325.

3. SALAMANDRE de Quedlinbourg, qui reſſemble pour la couleur à la *Salamandre* des Indes Orientales, dit M. KLEIN. M. André Michel Mullerus en a envoyé le pere & la mere & les petits, conſervés dans de l'eſprit de vin, le 24. Avril 1725. à ce Naturaliſte; qui en donne la notice; & c'eſt la même que la *Salamandra maculata* de Seba *II. p.* 15. *t.* 12. *n.* 5. *Salamandre* commune en Europe.

4. Petite SALAMANDRE Aquatique, qui vit ſur terre & dans l'eau. *Salamandra Amphibia, Salamandra Aquatica minor.* Aldrovande parle d'une *Salamandre aquatique noire :* Mathiole d'une autre *Salamandre aquatique*; Grevin d'une *Salamandre* très-monſtrueuſe; Hoffmann d'une autre *Salamandre*, qui paroit être la même *Salamandre* que la petite *Salamandre aquatique* de Beſler. Voyez Wurffbainius ſur les *Salamandres aquatiques* Rai *Quad.* 273. Petitvert *Mus.* 18. *n.* 111. Charleton *Onom.* 26. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. edit. 6. n.* 25. nomme la *Salamandre* aquatique, *Lacerta pedibus inermibus fiſſis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda ancipiti.*

5. Très-petite SALAMANDRE brune, marquée de taches blanches, de la Jamaïque. Sloane *II. p.* 334. *t.* 273. *fig.* 7. 8. C'eſt le *Mabouga* de du Tertre *p.* 315. & de Rochefort *p.* 147.

6. SALAMANDRE Aquatique de l'Amérique. Seba *p.* 141. *t.* 89. *n.* 4. & 5. Le même Seba parle d'une petite *Salamandre* de l'Iſle de Ceylan II. *p.* 15. *t.* 12. *n.* 7. M. LINNÆUS *Amœn. Tom. I. Muſæum Princip. p.* 288. *n.* 14. & *Syſt. Nat. édit. 6. n.* 93.-12. nomme *Lacerta caudâ tereti longâ, pedibus pentadactylis, dorſo anticè denticulato, collo capiteque ponè aculeato*, une *Salamandre* de l'Amérique, ſemblable au *Lézard*, dont parle Seba *I. p.* 170. *t.* 107. *f.* 3. & une autre *Salamandre Amphibie* du même Seba *Theſ. I. p.* 169. *t.* 107. *f.* 1.

1. Le P. Feuillée *Obſerv. Phyſ. I. p.* 319. parle d'une belle *Salamandre aquatique* noire, dont la queue eſt ſinguliere.

## VI.

### *GEKKOS, SALAMANDRES* qui ſont Ovipares.

1. GEKKO, Animal qui a les pieds plus élevés que la *Salamandre*, & cinq doigts à chaque pieds. Il eſt couvert de petites écailles. Seba *II. p.* 125. *& ſuiv. t.* 110. *fig.* 2.

2. GEKKO de l'Iſle de Ceylan, qui eſt une Amphibie, & qui a la queue courte. Seba *I. p.* 170. *t.* 108. *n.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M. LINNÆUS *Amœn. Tom. I. Amph. Gyll. p.* 133. *n.* 19. & *Syſt. Nat. edit.* 6. *n.* 93. 5. comprend ſous le nom de *Lacerta candâ tereti, pedibus pentadactylis, digitis utrinque criſtatis, ſubtus imbricatis, corpore verrucoſo*, ce GEKKO de l'Iſle de Ceylan, le *Lacerta Indica ſquamis & verrucis rotundis, digitis latis interne rugoſis*, de Petivert *Mus. p.* 19. *t.* 118. & le *Lacerta Indica*, ou *Salamandra Bufanis capite, griſea, tuberculis albis notata.* du Muſ. Petrop. *I. p.* 444. *n.* 171.

3. Autre GEKKO de l'Iſle de Ceylan, ſemblable au précédent, dont la queue eſt ronde & par anneaux Seba *ibid. p.* 171. *n.* 2.

4. GEKKO étoilé, qui eſt la *Salamandre* aquatique de l'Arabie, ou la *Salamandre Cordyle* d'Egypte, de Seba *II. p.* 109. *t.* 103. *n.* 2.

Feuillée *In Diar. Botan. Tom. I. p.* 319. parle d'une *Salamandre* aquatique noire, dont la queue eſt différente.

5. GEKKO qui a la peau dure, que quelques-uns nomment Tarantule. Aldrovande, en donne de ſept différentes eſpeces.

## VII.

### *CORDYLES.*

1. CORDYLE vulgaire, *Cordylus vulgo, Uromatrix.* Il

eſt pentadactyle, & il a la face de la *Salamandre*. M. LINNÆUS, *Syſtem. Nat. edit. 6. n.* 93-4. & *Amœnit. Tom. I. Amph. Gyllenb. p.* 132. *n.* 18. nomme *Lacerta verticillata, ſquamis denticulatis, pedibus pentadactylis*, le *Cordyle* d'Aldrovande, de Rai, & de tous les autres Naturaliſtes; le *Lezard* d'Afrique à queue épineuſe mâle & femelle de Seba *Theſ. I. p.* 136. *Tab.* 84. *fig.* 3. 4. & un autre *Lezard* d'Afrique couvert d'écailles, & varié de cendré & de brun, dont il eſt parlé dans le *Muſ. Petrop. I. p.* 442. *n.* 146.

2. CORDYLE à queue fourchue de l'Amérique, nommé *Salamandre* de l'Amérique à queue fourchue. *Cordylus caudâ bifurcatâ.* Seba *I. p.* 173. *t.* 109. *n.* 5.

3. CORDYLE brun, *Cordylus ſubfuſcus.* Rai, *Synop. Quad. p.* 263.

## VIII.

### *SCINQUE.*

1. SCINQUE, *Scincus*, nommé *Crocodile terreſtre* par Dioſcoride, & *petit Crocodyle* par Belon. Rhaſis décrit le *Scinque* ſemblable au *Lézard.*

2. SCINQUE d'Egypte & d'Arabie, *Scincus Ægyptiacus Arabicus*; qui eſt le grand *Scinque* de Beſler. A peine a-t-il dix pouces de long. C'eſt le *Scinque* qu'on apporte ſalé en Italie, & dont on fait grand uſage en médecine.

3. SCINQUE marin, *Scincus maritimus maximus*, nommé par Seba *II. p.* 112. *t.* 105. *n.* 3. très-grand *Lézard* de mer, ou *Crocodile* d'Arabie. C'eſt le *Lacerta Cyprius Scincoïdes* d'Aldrovande *p.* 660. M. LINNÆUS, ſous le nom de *Barbara*, parle d'une eſpece de *Scinque*, reſſemblant par la face au *Scinque marin.* Dans ſon *Syſtem. Nat. n.* 93.-16. & *Amœn. Tom. I. Muſ. Princ. n.* 21. il l'appelle *Lacerta caudâ tereti, pedibus pentadactylis, ſquammis rotundulis leviſſimis ſubgriſeis, lateralibus ſubfuſcis.*

4. SCINQUE brun de la Jamaïque, *Scincus maximus fuſcus.* Sloane *Voyag. de la Jamaïq. p. II.* 334. *t.* 273. *fig.* 9. C'eſt le *Mabouya*, ou *Scinc* de Du Tertre *pag.*

314. le *Brochet* de terre de Rochefort *p.* 149. le *Cucitz* du Perou & de Chili, ſelon Feuillée *p.* 744.

## IX.

### *SEPS.*

1. SEPS. Pline le nomme *Scolopendre*, & dit qu'il eſt funeſte aux pieds des Quadrupedes. En lui ôtant les pieds il a la figure de la *Vipere* & eſt vivipare, & paſſe pour être venimeux; car les *Reptiles* qui font leurs petits vivans, paſſent tous pour être venimeux. On donne au *Seps* le nom de *Chalcis*, & de *Lacerta Chalcidica*, parcequ'il a ſur le dos des lignes couleur d'airain. Imperati en parle ſous le nom de *Cæcilia vulgaris*. Ariſtote dit qu'il eſt de la couleur du *Cæcilia*. Il a des pieds, la queue très-longue, la figure d'un *Serpent*. Grevinus lui donne une couleur pâle & non d'airain. Scaliger le nomme *Putria*, parceque les plaies qu'il fait, tombent en pourriture. Pluſieurs Auteurs confondent le *Seps*, qui eſt un *Serpent*, avec le *Seps-Lezard*, nommé *Lacerta Chalcidica pedata*. Seba *II. p.* 70. *t.* 68. *n.* 7. parle d'un Ver d'Afrique de la forme d'un *Serpent*, d'une eſpece ſinguliere, qui tient le milieu entre les *Serpens*, les *Anguilles* & les *Vers*. Columna dit que le *Seps* eſt une eſpece de *Vipere*, ſemblable au *Lezard*. Il nait dans la Syrie, la Lybie, & l'Iſle de Chypre. Grevinus *pag.* 74. *p.* 115. donne la figure d'un autre *Seps*, bien différent de celui-ci.

2. SEPS de Columna; en Latin *Lacerta Chalchidica*, *Chalcides*, *Chalcis*, ſelon Pline *l.* 32. *c.* 3. Il n'a point de taches couleur d'airain, mais toute ſa peau eſt de cette couleur; & outre ſa reſſemblance avec le *Lezard*, il a le naturel de la *Vipere*. Voyez les Auteurs cités ſur le *Seps*. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 93-5. & *Aman. Tom. I. p.* 293. *Mus. Princ. n.* 20. nomme le SEPS *Lacertâ caudâ verticillatâ, pedibus ſubpentadactylis, ſquamis quadratis*. Il y a un *Chalcides* que M. LINNÆUS *Syſt. Nat. n.* 93-7. nomme *Lacerta caudâ tereti, pedibus tridactylis*.

X.

## X.

### *CAMELEON.*

1. CAMELEON. Ce nom a-t'il été donné à ce petit Animal, parcequ'il eſt un petit *Lion ?* Les Auteurs ſont partagés ſur ce nom, qui lui a été donné ſans qu'on ſache comment, & qu'on lui conſerve, parcequ'il eſt connu ſous ce nom. Il eſt Ovipare. On trouve dans les *Memoires de l'Académie Royale des Sciences* la deſcription anatomique du *Cameleon* d'Egypte. Il eſt ſemblable à celui des Indes Orientales & d'Amboïne, dit Seba *I. p.* 133. *t.* 82. *n.* 2. C'étoit une erreur que de croire que ces Animaux ne vivoient que d'air ſans rien manger. Il eſt vrai qu'il reſte longtems ſans manger, mais il vit d'Inſectes & de *Mouches*. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. édit.* 6. *n.* 93-17. & *Amænit. Tom. I. p.* 290. *Mus. Princ. n.* 16. donne le nom de *Lacerta caudâ tereti brevi, pedibus pentadactylis, digitis duobus tribuſque coadunatis*, au *Cameleon* d'Orient & d'Amboïne, au *Cameleon* de l'Iſle de Ceylan, couleur de ſafran, dont parle Seba *Theſ. I. p.* 134. *t.* 82. *f.* 3. à un petit *Cameleon* d'Amboïne, au *Cameleon* marbré de noir & de blanc, du Cap de Bonne-Eſpérance, du même Seba *Theſ. I. p.* 135. *t.* 83. *f.* 5. & au *Cameleon* d'Olearius *Mus.* 9. *t.* 8. *f.* 3.

2. CAMELEON du Mexique, nommé *Cuapapalcalt.* Seba *pag.* 132. *t.* 82. *n.* 1. Il eſt d'un cendré gris foncé.

3. CAMELEON maſqué. *Cameleo larvatus.* C'eſt le *Dragon* d'arbre volant, de l'Amérique, *Amphibie* ou *Baſilic* de Seba *I. p.* 156. *t.* 100. *n.* 1. Il a une eſpece de cuculle ou capuchon derriere la tête, & une nageoire ſur le dos, qui lui ſert à nager quand il eſt dans l'eau, & à ſauter dans les arbres quand il eſt ſur terre. Il a les pieds d'un *Lezard ;* ceux de derriere ſont très-longs. Cet Animal eſt très-rare.

4. CAMELEON blanc. M. KLEIN dit en avoir eu un

de cette couleur. Feuillée *Tom. III. p.* 16. donne la différence du *Cameleon* & du *Lezard.*

* Selon la remarque de ce M. KLEIN, *Summ. Dub. ad. Claſſ. de Amph. p.* 28. *n.* 4. beaucoup de *Lezards* n'ont point d'écailles; d'autres ont des écailles de la conſiſtance de leur peau, ou de la dureté du parchemin. Il faut en excepter les *Crocodiles*, qui ont le corps couvert comme d'eſpeces de boucliers, qui ſont d'une ſubſtance plus dure que les écailles des autres *Lezards.* Entre les *Lezards*, ceux qui ont la queue ſerrée fréquentent l'eau; d'autres l'ont en horreur. & par conſéquent tous ne ſont pas des Amphibies. On fait du *Dragon* ou *Dragoncule* volant un Amphibie; c'eſt comme comme ſi l'on diſoit que la *Chauve-Souris* eſt un Amphibie. Les *Dragons volants* ſe trouvent dans l'Iſle de Java, où ils ne ſont point des Animaux malfaiſants. Ils volent & marchent, & ne vivent que de *Mouches.* Ils n'ont point de dents, ainſi que les *Salamandres terreſtres* ou à queue ronde, & le *Cameleon.* Ces Animaux ont les bords des mâchoires en forme de ſcie.

# ORDRE II.

## *SERPENS.*

SEBA nous a donné une ample collection de *Serpens* & de *Couleuvres* connus dans les différentes parties du Monde : mais elle eſt ſans ordre & ſans méthode. M. LINNÆUS, ſur ceux qu'il a eu occaſion d'examiner, en a établi ſix Genres : c'eſt ſa diviſion que je ſuis. Tous les *Serpens*, on le ſait, n'ont point de pieds, *pedes nulli. Syſt. Nat. édit.* 6.

### GENRE PREMIER.

SERPENS qui ont le corps nud, des rides aux côtés

sur la peau, la lévre supérieure élevée, deux filets, & point de queue. *Corpus nudum, rugis lateralibus, oris labium superius prominens, tentaculis duobus, caudâ nullâ.*

Tel est l'*Aveugle*, nommé aussi *Anvoye*, en Latin *Cæcilia*, décrit daus les *Surinamensia Grylliana* des *Amœnitates* de M. LINNÆUS *Tom. I. p.* 489. *n.* 3.

Seba parle d'un *Cæcilia* de Ceylan, *Thes.* II. *Tab.* 17. *n.* 2. d'un autre des Indes Orientales & Occidentales, *ibid. Tab.* 21. *n.* 4. d'un autre de l'Amérique *Tab.* 24. *n.* 1. d'un autre de Ceylan, *Tab.* 25. *n.* 2.

## GENRE II.

*Serpens* qui ont des anneaux tout au tour du corps & de la queue, *annulis circularibus truncum caudamque cingentibus.*

C'est l'*Amphisbène*, qui a deux cens anneaux autour de l'abdomen, & trente autour de la queue. Il est décrit dans le *Mus. Princ.* des *Amœnitates Tom. I. p.* 295. *n.* 22. Rai en parle *Synop. Quad. p.* 288.

L'*Ibiara* de Marcgrave *Bras. p.* 239.

L'*Amphisbène* de Ceylan, dont parle Seba *Thes.* II. *p.* 2. *Tab. I. fig.* 7.

Un autre *Serpent* de Ceylan, nommé par le même *Cæcilia*, *Thes.* II. *p.* 19. *Tab.* 18. *fig.* 2.

Un autre *Serpent* de l'Amérique, nommé *Cæcilia* dans Seba, *Thes.* II. *p.* 24. *Tab.* 22. *fig.* 3.

Un autre de l'Amérique, nommé encore *Cæcilia* dans Seba *Thes.* II. *p.* 25. *Tab.* 24. *f.* 1.

Un *Amphisbène* de l'Amérique, varié de brun & de blanc, dont parle Seba *Thes.* II. *p.* 77. *Tab.* 73. *fig.* 4.

Un autre nommé *Apamea Syriaca biceps*, du même Auteur, *Thes.* II. *p.* 106. *Tab.* 100. *fig.* 3.

Et un autre gros de l'Amérique, de différentes couleurs, décrit par Seba *Thes.* I. *p.* 140. *Tab.* 88. *fig.* 3.

Ces *Serpens* sont tous du même Genre. Les Anciens lui ont donné le nom d'*Amphisbène*, Serpent à deux têtes, parcequ'ayant le bout de la queue de la même grosseur que la tête, ils ont cru faussement qu'il avoit deux têtes.

Il y a encore un *Serpent* à anneaux de l'Amérique, nommé *Myrus* dans Seba *Thes.* II. *Tab.* 35. *n.* 2.

## GENRE III.

*Serpens* couverts d'écailles à l'abdomen & sur la queue, *squammæ abdomen caudamque subtus tegentes.*

Tel est un *Cæcilia*, qui a 135 écailles à l'abdomen, & autant à la queue. Il en est parlé dans la *Fauna Suecica* de M. LINNÆUS *n.* 258. Celui-ci se trouve en Suede, où il est nommé *Ormislao*, *Koppar-orm.*

Le *Scytale* qui a 240 écailles autour de l'abdomen, & 13 à la queue. Il est décrit dans le *Musæum Principis* des *Amœnitates Tom. I. p.* 296. *n.* 23. Le *Scytale* de l'Amérique, nommé aussi *Amphisbène* & *Cæcilia* par Seba *Thes.* II. *p.* 3. *Tab.* 2. *f.* 1. 2.

Le *Scytale* de la nouvelle Espagne, du même Seba *Thes.* II. *p.* 4. *Tab.* 2. *fig.* 3. 4.

L'*Amphisbène* d'Amboine, remarquable par sa peau à rezeau & ses belles écailles rouges, décrit par Seba *Thes.* II. *p.* 9. *Tab.* 7. *fig.* 4.

Un *Amphisbène* de l'Amérique, du même Seba *Thes.* II. *p.* 21. *Tab.* 20. *fig.* 3. & un *Amphisbène* des Indes Orientales, dont parle Seba *Thes. I. p.* 27. *Tab.* 53. *fig.* 7.

Ces *Serpens* sont tous du même Genre. Seba parle encore d'un *Scytale* de l'Amérique *Thes.* II. *Tab.* 42. *n.* 4. & d'un autre de l'Isle de Chio, *ibid. Tab.* 86. *n.* 4.

## GENRE IV.

COULEUVRES qui ont l'abdomen couvert de bandes circulaires, & des écailles dessous la queue, *scutæ abdomen & squamæ caudam subtus tegentia.*

1. COULEUVRE à bandes, *Coluber lemniscata*, qui a CCL. bandes écailleuses à l'abdomen, & XXXV. écailles à la queue. *Coluber scutis abdominalibus* CCL. *squamis caudalibus.* XXXV. *Syst. Nat. p.* 34. *n.* 89-1. décrite dans les Amphibies de Gyllenborg *n.* 6. *p.* 118. des *Amœni-*

*tates* de M. LINNÆUS; & dans les *Surinam. Grill. ibid. p.* 493. *n.* 9. La *Serpentula* de l'Iſle de Ceylan de Seba *Theſ.* I. *p.* 19. *Tab.* 10 *fig. dern.* le *Serpent* à bandes larges du même Païs, *lemniſcis latis*, dont parle le même Seba *Theſ.* II. *p.* 76. *Tab.* 76. *fig.* 3. le *Serpent* noir de l'Amérique à anneaux larges & blancs, dont il eſt fait mention dans le *Muſ. Petropol. p.* 464. *n.* 218. ſont la même eſpece de *Couleuvre*. Le *Clayquarana* des Portugais, *Serpent* à bandes, dont parle Seba *Theſ.* II. *Tab.* 9. *n.* 1. 2. peut être une *Couleuvre* de la même eſpece.

2. COULEUVRE qui a CXIX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & CX. écailles à la queue. *Coluber ſcutis abdominalibus* CXIX. *ſquamis caudalibus* CX. *Syſt. Nat. ibid.* 2. *Surinam Gryll. p.* 493. *n.* 10. où on la trouve décrite. C'eſt le petit *Serpent* bleu céleſte de Surinam. *Anguiculus Surinamenſis cyaneus* de Seba *Theſ. II. pag.* 44. *Tab.* 43. *fig.* 2.

3. COULEUVRE nommée CENCOATEL. *Coluber ſcut. abdom.* CCXX. *ſquam. caud.* CXXIV. *Couleuvre* qui a CCXX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & CXXIV. écailles à la queue, *Syſt. Nat. ibid.* 3. *Muſ. Princ. p.* 306. *n.* 37. C'eſt un très-beau *Serpent* de l'Amérique. *Anguis venuſtiſſimus Americanus*, dit Seba *Theſ.* II. *p.* 18. repréſenté à la *Tab.* 16. *fig.* 2. 3.

4. COULEUVRE nommée APACHYKOATL, qui a CCXVII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & CVIII. écailles à la queue. *Coluber ſcut. abdom.* CCXVII. *ſquam. caud.* CVIII. *Syſt. Nat. n.* 4. Il eſt nommé dans le *Mus. Princ.* des *Amœnit. Tom. I. p.* 300. *n.* 25. *Anguis ſcutis abdominalibus* CCXVII. *ſquamis caudalibus* CVIII. C'eſt le *Serpent* d'Amboïne noir & blanc, nommé *Apachykoatl.* Seba *Theſ.* II. *p.* 21. *Tab.* 20. *fig.* 1. Nieremberg *Nat. p.* 284. Jonſton *Serpent. p.* 29.

5. COULEUVRE nommée *Petola*, qui a CCIX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XC. écailles à la queue. *Coluber ſcut. abdom.* CCIX *ſquam. caud.* XC. Elle eſt décrite dans le *Muſ. Princ. p.* 306. *n.* 36. Celle qui eſt décrite dans les *Amph. Gyllenb. p.* 119. *n.* 8. en eſt une varieté; elle a CCVII. bandes écailleuſes à l'abdomen,

& LXXXXV. écailles à la queue. Seba *Thes.* I. *p.* 89. en parle sous le nom de *Serpent* de l'Amérique, nommé *Petola, Serpens Americana Petola dicta.* Il est représenté à la *Tab.* 54. *fig.* 4.

6. COULEUVRE qui a CXCVI. bandes écailleuses à l'abdomen, & LXVII. écailles à la queue. Elle est décrite dans le *Mus. Princ. p.* 305. *n.* 35. La suivante n'est qu'une varieté de celle-ci, que Seba *Thes.* I. *p.* 71. *Tab.* 43. *fig.* 5. nomme *petit Serpent* de Ceylan, ou autre espece de NAIA; *Serpentula Ceilonica seu Naia altera.*

7. Autre COULEUVRE nommée NAIA, CXCIII. bandes écailleuses à l'abdomen, & LX. écailles à la queue. *Coluber scut. abdom.* CXCIII. *squam. caud.* LX.

* De tous les *Serpens*, il n'y en a point (dit M. LINNÆUS *Amæn. Tom.* II. *p.* 105.) de plus venimeux que ceux vulgairement nommés *Naia* dans l'Isle de Ceylan, savoir la *Couleuvre* ci-dessus.

Un *Serpent* des Indes couronné, ou à lunette, dont Rai parle *Quad.* 330. *Serpens Indicus coronatus diademate, seu conspicillo insignitus.*

La *Vipere, Cobras* de Cabelos, nommée *Naia*, de Kœmpfer *Amænit.* 565. *Tab.* 567. *Vipera Cobras de Cabelos, Naia dicta.*

Le *Serpent* à lunette, dont M. LINNÆUS parle dans le premier *Tom.* de ses *Amænitates p.* 112. *Anguis conspicillo insignita.*

Un *Serpent* des Indes brun & blanc, long de deux pieds & demi, dont la bouche est oblongue, la tête plate, & marquée d'une figure de diadême; ou *Serpent* à lunette, décrit dans le *Mus. Petropolit.* 454. *n.* 27. *Serpens indicus ex fusco & albo variegatus, ad duos pedes & dimidium longus, rostro oblongo, & capite plano, diademate seu conspicillo insignitus.*

Un *Serpent* des Indes couronné, ou à lunette, nommé par les Portugais *Cobras de Capello*, dont parle Seba *Thes.* II. *Tab.* 90. *fig.* 1. *Serpens Indicus coronatus diademate, seu conspicillo insignitus, Lusitanis Cobras de Capello dictus.*

Un *Serpent* de Malabar couronné, ou à lunette;

nommé *Cobra de Capello.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 85. *fig.* 1. *Serpens Malabarica diademate coronata, sive conspicillo insignita, Cobra de Capello dicta.*

Un *Serpent* du Perou & à lunette. Seba *Thes.* II. *Tab.* 85. *fig.* 1. *Serpens ex regno Peru, conspicillo insignita.*

Un *Serpent Naia* du Royaume de Siam, à lunette, nommé aussi *Cobra de Capello* ou *Cabelo.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 89. *fig.* 1. *Serpens Naia Siamensis cum conspicillo, seu Cobra de Capello vel Cabelo dictus.*

Un petit *Serpent* à lunette, Seba *Thes.* II. *Tab.* 89. *fig.* 2. *Serpens cum conspicillo minor.*

Un *Serpent* des Indes à lunette, entouré de belles bandes circulaires. *Serpens Indicus cum conspicillo, lepidè circulatus.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 89. *fig.* 3.

Un *Serpent* du Bresil, à lunette découpée en figure de cœur, & mouchetée de quatre taches ressemblant à des yeux. *Serpens Brasilienſis cum conspicillo cordis oculati formam habente.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 89. *fig.* 4.

Le *Naia*, ou *Cobra de Capello* par les Portugais, très-grand *Serpent* mâle des Indes, à lunette. *Serpens Indicus Naia, seu Lusitanis Cobra de Capello dictus, maximus, conspicillo notatus, mas.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 97. *fig.* 1.

COBRA de Capello femelle, *Serpent* des Indes sans lunette. *Serpens Indicus seu Cobra de Capello femina sine perspicillo.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 97. *fig.* 1.

COBRA de Capello à lunette, *Serpent* de l'Isle de Ceylan. *Serpens Ceilanica conspicillo notata, seu Cobra de Capello.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 97. *fig.* 3.

SERPENT à lunette de la nouvelle Espagne. *Serpens conspicillo ornata ex novâ Hispaniâ.* Seba *Thes.* II. *Tab.* 97. *fig.* 4.

COBRA de Capello femelle, sans lunette. Seba *Thes.* II. *Tab.* 90. *fig.* 2. *Cobra de Capello femina sine perspicillo.*

COBRA de Capello du Cap de Bonne-Espérance. Kolbe *p.* 432. Languet *Voyag. p.* 30.

NAIA de l'Isle de Ceylan, selon Bruchman *Epist.* 37. *Tab.* 5. 6. 7.

COBRAS de Cabelo des Indes Orientales, & surtout de l'Isle de Ceylan.

Tous ces *Serpens* de différens Païs ne ſont que la même eſpece. Ce qui la diſtingue des autres, c'eſt que quand cet Animal eſt irrité, la peau de ſa tête s'etend, & alors il reſſemble en quelque ſorte à un *Ecureuil volant*, prêt à faire un ſaut. Son poiſon eſt ſi ſubtil, qu'un homme qui en eſt mordu, meurt peu de tems après dans des convulſions, dit Kœmpfer, qui en a vu dans les Indes.

8. COULEUVRE, qui a CXC. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XCVIII. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CXC. *Squam. caud.* XCVIII. Il en eſt parlé dans *Muſ. Princ.* des *Amœnit. Tom. I. p.* 305. Celle décrite parmi les *Amphib.* de Gyllenborg, *ibid. p.* 120. *n.* 9. n'en eſt qu'une varieté, & c'eſt le *Serpent* de l'Amérique à anneaux, *Serpens Americana anulata*, dont parle Seba *Theſ. II. pag.* 38. *Tab.* 38. *fig.* 2.

9. COULEUVRE à CXC. bandes écailleuſes à l'abdomen, & à XLII. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CXC. *ſquam. caud.* XLII. C'eſt une eſpece de *Serpent Eſculape*, dont parle Seba *Theſ. II. p.* 19. *Tab.* 18. *fig.* 4.

ESCULAPE du Breſil. Seba *Theſ. II. Tab.* XLII. *fig.* 1. de Panama en Amérique; *Tab.* LIV. *fig.* 2. de l'Amérique *Tab.* LXVI. *n.* 1. il eſt nommé *Argoli.* Autre du Breſil. *ibid. n.* 2. *&* 3. Autre très-grand *Eſculape*, *Theſ. II. Tab.* LXXXVI. *n.* 1.

10. COULEUVRE qui a CLXXXIV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & L. écailles à la queue. *Coluber ſcut. abdom.* CLXXXIV. *Squammæ caud.* L. Cette *Couleuvre* eſt décrite dans le *Muſ. Princ.* des *Amœnitates* de M. LINNÆUS *Tom. I. p.* 304. *n.* 33. où elle eſt nommée *Anguis ſcutis abdominalibus* CLXXXIV. *caudalibus* L. Elle approche d'une autre décrite dans les *Amphibies* de Gyllenborg, *ibid. p.* 118. *n.* 6. qui a CCL. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XXXV. écailles à la queue. Un petit *Serpent* de l'Iſle de Ceylan, de Seba *Theſ. I. p.* 19. *Tab.* 10. *fig.* derniére, *Serpentula ex inſulâ Ceilan*; un autre *Serpent* à bandes larges, du même Seba, *Theſ. II. p.* 76. *Tab.* 76, *fig.* 3. *Serpens Ceylonica lemniſcis latis*; un autre *Serpent* noir de l'Amérique à anneaux larges &

blancs, *Serpens Americanus niger annulis latis albis*, dont il eſt parlé dans le *Muſ.* de Peterſbourg *p.* 464. *n.* 218. ſont de la même eſpece.

11. SIBON, *Couleuvre* qui a CLXXX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LXXX. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLXXX. *Squam. caud.* LXXX. Elle eſt décrite par M. LINNÆUS dans le premier Tome de ſes *Amœnitates p.* 304. *n.* 32. C'eſt un *Serpent* d'Afrique, beau par la varieté de ſes couleurs, auquel les Hottentots ont donné le nom de *Sibon*, *Serpens Africana, ab Hottentottis Sibon dicta*, dit Seba *Theſ. I. p.* 22. *Tab.* 14. *fig.* 4. Il a la tête ronde, ſerrée & des yeux grands.

12. COULEUVRE connue en Europe, qui a CLXXVI. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LX. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLXXVI. *ſquam. caud.* LX. Elle eſt décrite parmi les Amphibies de Gyllenborg. *Amœnit. Tom. I. p.* 116. *n.* 3. M. LINNÆUS en parle encore dans ſa *Faun. Suec. p.* 36. *n.* 259. Geſner *Serp.* 43. en fait mention ſous le nom d'*Anguis*. Rai, *Quad.* 334. Aldrovande, *Serp.* 287. Charleton, *Onom.* 33. ſous le nom de *Natrix torquata*. Merret, *Pin. p.* 204. ſous celui d'*Anguis Coluber*. Elle eſt nommée dans le *Muſ. Petrop. I. p.* 475. *Natrix torquata ex cæruleo nigro & albo varia*, & dans le *Voyage d'Oelande* 6. 154. *Coluber*. On lui donne en Scanie le nom de *Snok*, en Smolande celui de *Ringorm*.

13. COULEUVRE d'Afrique, bleue, qui a CLXV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XXIV. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLXV. *ſquam. caud.* XXIV. Elle eſt décrite dans le *Muſ. Princip. p.* 303. *n.* 31. Seba *Theſ. II. p.* 16. *Tab.* 13. *fig.* 3. la nomme *Anguiculus Africanus cæruleus*.

14. AHÆTULLA, *Couleuvre* qui a CLXIV. bandes écailleuſes autour de l'abdomen, & CL. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLXIV. *ſquam. caud.* CL. Elle eſt décrite dans les Amphibies de Gyllenborg, *p.* 115. *n.* 2. Le *Serpent* de l'Iſle de Ceylan a des lignes brunes; nommé par Seba *Theſ. II. pag.* 14. *Tab.* 12. *fig.* 3. *Serpens Ceilonica lineis ſubfuſcis*. Le *Serpent* verd de Borneo, *Anguis Borneocus viridis, familiaris, per-*

*tenuis*, dont parle Petivert, *Muſ. p.* 18. *n.* 105. & le *Serpent* de l'Iſle de Ceylan, nommé *Ahætulla*, dont Rai fait mention, *pag.* 331. ſont la même eſpece de *Couleuvre.*

15. COULEUVRE qui a CLX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & C. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLX. *ſquam. caud.* C. Elle eſt décrite dans le *Muſ. Princ. p.* 302. *n.* 30. l'*Ibiboca* du Breſil, dont parle Seba *Theſ. II. Tab.* 20. *n.* 2. Un *Serpent* ſiflant de l'Iſle de Ceylan, qui a des belles bandes ſur la peau; *Serpens Ceilonica ſibilans, pulchrè lemniſcata, Theſ. II. Tab.* 45. *n.* 5. *Malpolon*, autre beau *Serpent* de l'Iſle de Ceylan; *Serpens Zeilanica exquiſitiſſima, Malpolon dicta, Theſ. II. p.* 52. *Tab.* 52. *n.* 4; *Hippo*, *Serpent* d'Afrique, *Serpens Africana Hippo dicta, Theſ. II. p.* 57. *Tab.* 56. *n.* 4. & un autre *Serpent* de l'Amérique, qui eſt plus rare, marqué de bandes rouges & blaches, *Theſ. II. p.* 115. *Tab.* 197. *n.* 4. tous ces *Serpens* ſont de la même eſpece.

16. COULEUVRE à CLV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & à XCIV. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLV. *ſquam. caud.* XCIV. C'eſt le *Serpent* de l'Amérique à longues bandes fort étroites, de Seba *Theſ. II. Tab.* 11. *n*, 4. *Serpens Americana lemniſcata.* On en trouve la deſcription dans les *Surinam Gryll.* des *Amœnitates Tom. I. p.* 494, *n.* 11.

17. COULEUVRE à CLII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & à CXXXIX. écailles à la queue, *Coluber ſcuta abdom.* CLII. *ſquam. caud.* CXXXIX. Celle qui eſt décrite dans le *Muſ. Princip. p.* 302. *n.* 29. n'a que CXXXV. écailles à la queue. Cette *Couleuvre* à les yeux grands.

18. COBELLA. *Couleuvre*, qui a CL. bandes écailleuſes autour de l'abdomen, & LIV. écailles à la queue. *Scut. abdom.* CL. *ſquam. caud.* LIV. nommée dans les *Amph. Gyllenborg p.* 117. *n.* 4. *Coluber ſcutis abdom.* CL. *caudalibus* LIV. C'eſt dit Seba *Theſ.* II. *p.* 4. *Tab.* 2. *fig.* 6. Un *Serpent* de l'Amérique nommé *Cobella.* M. LINNÆUS en parle encore dans le *Muſ. Princip. p.* 302. *n.* 28.

19. ÆSPING, ou *Couleuvre* qui a CL. bandes écail-

leuſes à l'abdomen, & XXXIV. écailles à la queue. *Coluber ſcut. abdom.* CL. *ſquam. caud.* XXXIV. Cette *Couleuvre* ſe trouve en Smolande, ou elle eſt nommée *Æſping*. dit M. LINNÆUS *n.* 261.

20. VIPERE. *Couleuvre*, qui a CLV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XXXVI. à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CLV. *ſquam. caud.* XXXVI M. LINNÆUS en parle *Faun. Suec. n.* 260, Geſner *Serp. p.* 124. Aldrovande, *Serpent. p.* 108. Cluſius, *p.* 123. Rai 289. Charleton *Onom.* 30. Petivert *Muſ. p.* 17. *n.* 103. Les Actes d'Upſal 1736, *p.* 11. *n.* 4. Le Voyage d'Oelande *p.* 23. Seba donne pluſieurs eſpeces de *Vipere*, ſavoir.

Une de Java, nommée *Jararaca. Theſ.* I. *Tab.* 70. *n.* 12.

Une d'Afrique, nommée *Nepa*, *ibid. Tab.* 19. *n.* 7.

Une de l'Iſle de Madere en Afrique, *ibid. Tab.* 54. *n.* 2.

La vraie *Vipere* des Indes Orientales. *Theſ.* II. *Tab.* 8. *n.* 4.

Une de Surinam. *ibid. n.* 5.

Un *Serpent* de l'Amérique ſemblable à la *Vipere*. *Theſ.* II. *Tab.* 12. *n.* 1.

Une du Breſil, nommée *Cayata*, eſpece de *Bitin*. *Theſ.* II. *Tab.* 15. *n.* 2.

Une de l'Amérique, nommée *Cobra. Theſ.* II. *Tab.* 21. *n.* 1.

Une de l'Amérique, nommée *Cencoalt*, miſe au rang des *Aſpics* par Seba, *Theſ.* II. *Tab.* 26. *n.* 1.

Une autre, *ibid. n.* 2, 3. Aldrovande en parle, *l.* 1. *p.* 197.

Une *Vipere* du Caire. *Theſ.* II. *Tab.* 27. *n.* 1.

Une *Vipere* du Breſil, nommée *Jaxana. Theſ.* II. *Tab.* 28. *n.* 1.

Une *Vipere* nommée *Tamachia*, *ibid. n.* 2.

Une belle *Vipere* de l'Amérique, tachetée. *Theſ.* II. *Tab.* 35. *n.* 1.

Une *Vipere* de l'Iſle de Saint Euſtache en Amérique, nommée *Echis. Theſ.* II. *Tab.* 36. *n.* 1.

D'autres, *ibid. n.* 2. 3, 4.

Une *Vipere* du Breſil, nommée *Ibiraxoa. Theſ.* II. *Tab.* 41. *n.* 3.

Une *Vipere* de Ceylan. *Theſ.* II. *Tab.* 45. *n.* 4.

Une autre très-belle *Vipere* de Ceylan. *Theſ.* II. *Tab.* 48. *n.* 2.

Une très-belle *Vipere* d'Afrique, nommée *Ammodyte. Theſ.* II. *Tab.* 50.

Une *Vipere* de l'Iſle de Ceylan, nommée *Mangonizo*, *Theſ.* II. *Tab.* 53. *n.* 3.

Une très-belle *Vipere. Tab.* 54. *n.* 3.

Une du Japon, *ibid. n.* 4.

Une *Vipere* d'Arabie, nommée *Maraſſus. Theſ.* II. *Tab.* 55. *n.* 2.

Une *Vipere* cornue d'Illyrie, proche la mer Adriatique, nommée *Ceraſte. Theſ.* II. *Tab.* 50. *n.* 3. Seba parle encore d'un *Ceraſte* du Royaume de Siam. *Theſ.* II. *Tab.* 19. *n.* 1. & *ibid. Tab.* 34. *n.* 1, 2. d'une *Vipere* de Siam, beau *Serpent*, autre eſpece de *Ceraſte.*

Une *Vipere* couronnée de l'Iſle de Ceylan, nommée *Cobra. Theſ.* II. *Tab.* 46. *n.* 2.

Une *Vipere* de la Virginie, à taches pourprées. *Theſ.* II. *Tab.* 71. *n.* 3.

Une belle *Vipere* de l'Amérique meridionale, nommée *Paraguajana. Theſ.* II. *Tab.* 74.

Une *Vipere* du Breſil, nommée *Tetzauchcoalt. Theſ.* II. *Tab.* 77. *n.* 2, 3. Il y a un *Tetzauchcoalt* de la Nouvelle Eſpagne, qui, dit Seba *Theſ.* II. *Tab.* 80. *n.* 1. reſſemble à un *Serpent* du Japon, nommé *Prince Aſmodée*, ſelon le même Auteur. *Theſ.* II. *Tab.* 79. *n.* 1. Nous ne pouvons pas aſſurer que l'un & l'autre ſoient des eſpeces de *Viperes.*

Une *Vipere* d'Orient, nommée en Hebreu *Zeboa*, en Grec *Hyæna. Theſ.* II. *Tab.* 78. *n.* 1.

Une grande *Vipere* de Ceylan, nommée *Bitin. Theſ.* II. *Tab.* 114. *n.* 3, 2.

* Toutes ces eſpeces de *Viperes* peuvent bien être du même Genre, mais non de la même Eſpece. Il y a le *Serpent* à ſonnete qui eſt auſſi un eſpece de *Vipere*, mais d'un autre Genre, comme nous le marquons plus bas.

21. COULEUVRE qui a CXLII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LXXIV. écailles à la queue. *Coluber ſcu-*

*ta abdom.* CXLII. *ſquam. caud.* LXXIV. Elle eſt décrite dans le *Muſ. Principis* des *Amœnitates de* M. LINNÆUS *Tom. I. p.* 301. *n.* 27.

22 AMMODYTE, eſpece de *Couleuvre* qui a CXLII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XXXII. écailles à la queue. Elle eſt décrite dans les *Surinam. Gyll.* des *Amœnit. Tom. I. p.* 506. *n.* 25. Rai *p.* 287. Jonſton, *Serp. p.* 14. *Tab.* 1. *fig.* 3. parlent de cette *Couleuvre.*

Seba *Theſ.* II. *Tab.* 1. 31. *n.* 2. donne le nom *d'Ammodyte* à un ſerpent de l'Amérique couleur de flamme, & à un autre de Surinam. *Theſ. II. p.* 79. *Tab. n.* 5. Il y a encore une *Couleuvre* de l'Iſle de Ceylan, que Seba *Theſ. II. Tab.* 76. *n.* 1. nomme *Ammodytes.*

23. COULEUVRE qui a CXXVIII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XLVI. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CXXVIII. *ſquam. caud.* XLVI. Elle eſt décrite dans le *Muſ. Princip. p.* 301. *n.* 26.

24. COULEUVRE qui a CXXIV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LX. écailles ſur la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CXXIV. *ſquam. caud.* LX. Elle eſt décrite dans les *Amph. Gryll. p.* 119. *n.* 7. C'eſt une *Couleuvre* de l'Amérique, qui reſſemble à une *Vipere*, dit Seba, *Theſ. II. tab.* 12. *n.* 3.

25. COULEUVRE bleue azur, qui a CXIX. bandes écailleuſes à l'abdomen, & CX. écailles à la queue. *Coluber ſcuta abdom.* CXIX. *ſquam. caud.* CX. Elle eſt décrite dans *Surinam. Gryll. p.* 493.

C'eſt l'*Anguiculus Surinamenſis Cyaneus* de Seba *Theſ. II. Tab.* 43. *n.* 2.

26. COULEUVRE qui a CXVIII. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LXI. écailles à la queue. *Coluber ſcut. abdom.* CXVIII. *ſquam. caud.* LXI. Cette *Couleuvre* eſt décrite dans les *Amph.* de *Gyllenb.* & eſt la même qu'un *Serpent* de Malabar de deux couleurs & très-beau, dont parle Seba *Theſ. II. Tab.* 54. *n.* 1.

Voila les différentes eſpeces de *Couleuvres* dont M. LINNÆUS nous donne la notice *Syſt. Nat. edit.* 6. *p.* 34. *n.* 89. 1-26.

27. On voit encore dans Seba, *Theſ. Tab.* 54. *n.* 1. & 4. une *Couleuvre* de Malaca, mâle & fémelle.

*Theſ. II. Tab.* 59. *n.* 1. une *Couleuvre* couleur de feu, nommée *Tlehua*. Il y en a une autre du même nom, de la Nouvelle Eſpagne, dont parle Seba, *Theſ. II. Tab.* 84. *n.* 1.

*Theſ. II. Tab.* 60. *n.* 1. & 3. une *Couleuvre* de Tarragone en Eſpagne, mâle & femelle.

*Ibid. n.* 4. Une *Couleuvre* étoilée de Rio de la Plata.

*Theſ. II. Tab.* 77. *n.* 4, 5. Une *Couleuvre* du Mexique, nommée *Xalxalhua*.

*Theſ. II. Tab.* 78. *n.* 2. Une *Couleuvre* de Guinée, nommée *Ammobates*. C'eſt le *Dipſas* des Grecs.

*Theſ. II. Tab.* 61. Une *Couleuvre* du Mexique, nommée *Depone*.

## GENRE V.

Sous le nom de *Cenchris*, M. LINNÆUS comprend les *Serpens* qui ont à l'abdomen & ſur la queue des bandes écailleuſes ; la tête eſt couverte de petites écailles ; la queue eſt ſans appendices. *Scuta abdomen caudamque ſubtus tegentia, caput ſquamis parvis tectum, caudâ abſque appendice. Syſtem. Nat. edit.* 6. *p.* 35. *n.* 90.

Le *Boiguacu* eſt un *Cenchris*. Il a CCXL. bandes écailleuſes à l'abdomen, & LXIV. à la queue. Marcgrave, *Braſ. p.* 239. Piſon *Braſ. p.* 1648. *p.* 41. Piſon *Natura*. 1658. *p.* 277. Rai, *Quad.* 325. parlent de ce *Serpent*.

Du même Genre ſont le *Conſtrictor* de Kœmpfer, *Amœnit.* 573. *Serpent* qui s'entortille autour des hommes & des animaux pour les étouffer, ce qui fait qu'il eſt appellé *Conſtrictor*, ſerreur.

Le *Serpens Indicus-bubalinus*, nommé *Anacandra* dans l'Iſle de Ceylan. Rai en parle, *Quad.* 332.

Le *Giboya*, ou *Jaboya*, de Laet, *Occid. p.* 554.

L'*Anguis ſtupidus*, le Serpent ſtupide de Nieremberg. *Natur.* 274.

Le *Serpent* étranger, *Serpens peregrinus* de Cluſius *Exot. p.* 113.

Le *Pimberoh* de Seba, *Theſ. II. p.* 97. *Tab.* 91. *n.* 1. très-grand *Serpent* de l'Iſle de Ceylan. *Serpens Ceylonica maxima*.

Un *Serpent* femelle du Mexique, qui a des figures d'yeux sur la peau. *Serpens oculæa Mexicana femina*, du même Seba *Thes. II. p.* 104. *Tab.* 98. *n.* 1. Il y a un *Serpent* de Ternate, qui a aussi des figures d'yeux sur la peau, représenté à la *Tab.* 56. *n.* 4. du *Thes. I.*

Un beau *Serpent* du Brésil, du païs de Guaira, qui passe pour la Reine des *Serpens*, dit Seba, *Thes. II. p.* 105. *Tab.* 99. *n.* 2. *Regina Serpentum habita.*

Un *Serpent* d'arbre de l'Amérique, fort estimé parce qu'il est singulierement peint. Seba *Thes. I. p.* 85. *Tabl.* 53. *n.* 1. *Serpens Americana arborea, singulari artificio picta, magni æstimata.*

On trouve la Description du *Boiguacu* dans le premier Tome des *Amœnit.* de M. LINNÆUS. *Surinam. Gryl. p.* 497. *n.* 16. *& la fig. à la Tab.* 14.

Seba *Thes. II. Tab.* 42. *n.* 2. parle d'un *Cenchrus serenus* du Brésil, & *ibid. n.* 3. d'un *Cenchrus* de Babylone. Nous ne pouvons dire si ces deux *Serpens* sont du même Genre que ceux dont nous venons de donner la notice.

## GENRE VI.

*Serpens* qui ont des bandes écailleuses à l'abdomen & à la queue, & au bout de la queue des especes de sonnettes composées d'écailles. *Scuta abdomen caudamque subtus tegentia, crepitaculum articulis urceolalis caudam terminans*, dit M. LINNÆUS *System. Nat. edit. 6. p.* 35. *n.* 91.

Ce Naturaliste donne deux especes de *Serpens à sonnette* sous le nom de *Crotalophorus.* La premiere a CLXXII. bandes écailleuses à l'abdomen, XXI. à la queue, & trois écailles. *Scuta abdom.* CLXXII. *caud.* XXI. *squam.* III. Elle est décrite dans les *Surinam. Gryll.* Tom. *I.* des *Amæn. p.* 500. *n.* 17. De cette espece sont la *Dame* des *Serpens*, *Domina Serpentum* de Nieremberg *Nat. p.* 268. *Tab.* 268. de Jonston *Serp. p.* 26. *Tab.* 7. d'Olearius *Mus. p.* 18. *Tab.* 11. *fig.* 2.

Le très-grand *Serpent* venimeux de la Virginie, dont Vincent parle dans son *Catalogue p.* 4. *n.* 38. *Serpens venenosus maximus Virginianus.*

La *Vipere* à ſonnette de l'Amérique, longue de quatre pieds, de couleur griſe ou cendrée, avec des taches brunes çà & là ſur le dos, & qui a une ſonnette au bout de la queue, compoſée de pluſieurs écailles. *Vipera Americana caudiſona longitudine IV. pedes exæquans, coloris leucophæi, hinc inde in dorſo fuſco colore adſperſa, tintinnabulum ſeu crepitaculum in caudâ extremâ è multis ſquamis compoſitum habens.* Il en eſt parlé dans le *Muſ. Petropol. p.* 454. *n.* 36.

La ſeconde eſpece de *Serpent* à ſonnette a LXV. bandes écailleuſes à l'abdomen, & XXVIII. à la queue. *Scut. abdom.* LXV. *ſcut caud.* XXVIII. Celle décrite dans le *Muſ. Princip.* du même *Tom. des Amænit. pag.* 297. *n.* 24. eſt nommée *Anguis crotalophorus, ſcutis abdom.* CLXV. *caudalib.* XXX. & a II. bandes écailleuſes à la queue plus que celle dont M. LINNÆUS donne la notice dans ſon *Syſtême.*

La *Vipere* à ſonnette de l'Amérique, *Vipera caudiſona*, dont parle Rai, *Quadrup. p.* 296.

La très-grande *Vipere* à ſonnette des Indes Orientales. *Vipera Orientalis maxima caudiſona.* Seba *Theſ.* II. *p.* 101. *Tab.* 36.

Une autre *Serpent* ou *Vipere* à ſonnette de l'Amérique. *Serpens crotalophora ſeu Vipera caudiſona Americana.* Seba *Theſ.* II. *p.* 99. *Tab.* 95.

Le BOICOCININGA de Marcgrave *Braſ.* 240. de Piſon *Braſ.* 41. 275.

Le TEUHTLACET-ZAUHQUI d'Hernandez *Mexiq.* 329.

M. LINNÆUS donne la deſcription de la plupart de tous ces différens Genres de *Serpens* & de *Couleuvres* * dont on vient de voir la notice. Mais la *Serpentologie* de Seba ne ſe réduit pas à ce petit nombre. Il ne m'eſt pas poſſible, ſuivant la méthode du Savant Suedois, de ranger les autres, & d'aſſigner à chacun ſon genre, ſon eſpece, & ſa varieté. Seba n'a pas toujours eu l'attention de les bien caractériſer. On

* *Tom. I.* des *Amænit.* dans les *Amph. Gyllenb.* le *Muſ. Princip.* & les *Surin. Gryll.*

ne

ne connoît pas par la plûpart de ſes deſcriptions (car il n'en dit rien) un *Serpent* qui a le corps nud, tel que l'*Anvoye*, d'avec un autre qui a des anneaux circulaires, tel que l'*Amphiſbène*; ni un *Serpent* qui a des écailles au ventre & à la queue, tel que le *Scytale*, d'avec celui qui porte des bandes écailleuſes au ventre & des écailles à la queue, comme ſont les *Couleuvres*; ni enfin un *Serpent* qui a des bandes écailleuſes au ventre & à la queue, & de petites écailles ſur la tête, comme le *Boiguacu*, d'avec celui dont l'abdomen ou le ventre & la queue ſont couverts de bandes écailleuſes, & qui porte au bout de la queue des eſpeces de ſonnettes compoſées d'écailles, tel que le *Boicocininga*, autrement nommé *Serpent à ſonnetes*. C'eſt un travail qui demande du tems, & auquel je ne puis me livrer pour le préſent.

Cependant, comme le Seba eſt rare, & que cet Ouvrage cher ne ſe trouve que dans les cabinets d'un très-petit nombre de Naturaliſtes & de curieux, je crois faire plaiſir, en ſuivant l'ordre alphabétique, de continuer à donner la notice des *Serpens*, dont pour la plûpart, par les raiſons ci-deſſus marquées, j'ignore les Genres & les Eſpeces.

Acontias ou Javelot d'Amboïne, beau Serpent, *Theſ.* II. *Tab.* 7. *n.* 1.
Autre Acontias d'Amboïne. *Theſ.* II. *Tab.* 44. *n.* 1.
Acontias de la Jamaïque. *Theſ.* II. *Tab.* 55. *n.* 3.
Acontias des Indes. *Theſ.* II. *Tab.* 62. *n.* 1.
Acontias de Santa Crux. *Theſ.* II. *Tab.* 64. *n.* 1.
Acontias ou Cenchrias d'Amboïne. *Theſ.* II. *Tab.* 72. *n.* 1.
Acontias de la Nouvelle Eſpagne. *Theſ.* II. *Tab.* 78. *n.* 3.
Anacandaja, Serpent de Ceylan, ſi fort qu'il rompt les membres d'un Buffle. *Theſ.* II. *Tab.* 83.
Anguigena, Anguille de Mer monſtrueuſe, que Seba croit être un Serpent. *Theſ.* II. *Tab.* 40. *n.* 3. 4.
Antrachina, Serpent de l'Amérique, noir comme du

charbon, qui fréquente les maisons. *Thes.* II. *Tab.* 64. *n.* 2.

Apoa, Serpent du Bresil. *Thes.* II. *Tab.* 51. *n.* 2.

Argus, Serpent très-rare de Guinée, qui dévore un autre petit Serpent, qui se nourrit de Rats & de Chenilles. *Thes.* II. *Tab.* 23. *n.* 1.

Aspic d'Egypte, marqué de taches noires. *Thes.* II. *Tab.* 10. *n.* 1. & *n.* 2. 3.

Un autre Aspic, de l'Amérique mâle & femelle.

Aspic de l'Isle de Java. *Thes.* II. *Tab.* 53. *n.* 4.

Petit Aspic de Surinam. *Thes.* II. *Tab.* 64. *n.* 4.

Très-grand Aspic du Bresil, nommé *Cobra*. *Thes.* II. *Tab.* 68. *n.* 1.

Espece d'Aspic verd de l'Amérique. *Thes.* II. *Tab.* 68. *n.* 5. Il se nourrit de Grenouilles.

Très-grand Aspic d'Egypte. *Thes.* II. *Tab.* 88. *n.* 1.

Aspic rouge de Ceylan. *Thes.* II. *Tab.* 88. *n.* 2.

* Tous ces Aspics sont du Genre des Couleuvres.

Ataligato, Serpent rare du Mexique. *Thes.* II. *Tab.* 77. *n.* 6.

Bali-Salan Boekit, Serpent de Ternate. *Thes.* I. *Tab.* 57. *n.* 4.

Bayhapua, Serpent d'Afrique. *Thes. II. Tab.* 84. *n.* 2.

Bochir, Serpent d'Egypte. *Thes. II. Tab.* 38. *n.* 3.

Bojobi, nommé Cobra de verde, Serpent rare de l'Amérique. *Thes. II. Tab.* 41. *n.* 1. Autre Bojobi, Serpent soufflu de Ceylan. *Thes. II. Tab,* 81. *n.* 1.

Boiquatrara, Serpent des Indes. *Thes. II.* 78. *n.* 4. Un autre Boiquatrara à la *Tab.* 82. *n.* 1.

Boitapio, ou Cobra de Sibo du Bresil, serpent épineux. *Thes. II. Tab.* 77. *n.* 1.

Boyuna, Serpent de Ceylan. *Thes. II. Tab.* 39. *n.* 3. Il y en a un autre du même Païs, du même nom, dont la couleur est noire. *Thes. II. Tab.* 83. *n.* 2.

Cabo, Serpent du Promontoire de Tiburon en Amerique. *Tab.* 75. *n.* 1. *Thes. II.*

Caracara, Serpent singulier de l'Amerique. *Thes. II. Tab.* 68. *n.* 3.

Chelydrus, Serpent de l'Amérique. *Theſ. II. Tab.* 40. *n.* 1.

Chiametla, Serpent de l'Amerique. *Theſ. II. Tab.* 61. *n.* 1.

Coecuba, Serpent, qui chante pour attraper les Oiſeaux, dont il ſe nourrit. *Theſ. II. Tab.* 82. *n.* 2.

Caracoras, nommé Talieboebot par les Portugais, Serpent de l'Amerique. *Theſ. II. Tab.* 75. *n.* 5.

Dipſas, Serpent bleu d'Amerique, dont la morſure cauſe la ſoif. *Theſ. II. Tab.* 3. *n.* 2. Autre mis au rang des Dipſas. *ibid. Tab.* 14. *n.* 1. Autre de Surinam, couleur d'olive, avec des taches d'un rouge foncé. *ibid. n.* 2. Autre d'Amboine. *ibid. n.* 3. Autre de Surinam de couleur bleue. *ibid. Tab.* 32. *n.* 1. Autre d'Amboïne. *Theſ. II. Tab.* 44. *n.* 2.

Driynus, ou Chelydrus d'Amboine. *Theſ. II. Tab.* 72. *n.* 2.

Duberria, Serpent terreſtre de l'Amérique. *Theſ. II.* 75. *n.* 4.

Empereur de Quadalajara, Serpent du Mexique, auquel les Negres attribuent la vertu d'annoncer les choſes futures. *Theſ. II. Tab.* 1. *n.* 1.

Encetra, Serpent de l'Amerique. *Theſ. II. Tab.* 68. *n.* 5.

Gliricapa, Serpent très-long & très-menu, de l'iſle de Ceylan. *Theſ. I. Tab.* 108. *n.* 1.

Guacu, Serpent du Breſil. *Theſ. II. Tab.* 38. *n.* 4. Autre du même nom. *ibid. Tab.* 51. *n.* 3.

Hæmacathes, Serpent d'Afrique. *Theſ.* II. *Tab.* 58. *n.* 1. autre du Japon. *ibid. n.* 3.

Hotambaia, Serpent de l'Iſle de Ceylan, de couleur jaune. *Theſ.* II. *Tab.* 33. *n.* 6.

Hydre, Serpent à ſept têtes, plutôt Dragon que Serpent. Voyez-en l'Hiſtoire dans Seba. *Theſ.* I. *pag.* 159.

Hydre de Ceylan, nommé Duberria. *Theſ* II. *Tab.* 1. *n.* 6.

Jacua-Acanga, nommé *Fedagoſo* par les Portugais ; *Phyticus* par les Peuples d'Orient. *Theſ.* II. *Tab.* 102. *n.* 1.

Javara-Epeba, Serpent de l'Iſle de Ceylan. *Theſ.* I. *Tab.* 95. *n.* 5.

Ibyara du Breſil, & d'Amboïne, Serpent qui a la queue d'un Amphibène, & qui ſe nourrit d'inſectes nommés Millepieds, *Millepeda*. *Theſ.* II. *Tab.* 25. *n.* 1.

Inteſtin, *Inteſtinalis*, Serpent de Guinée, qui n'eſt pas plus gros que l'inteſtin d'un Oiſeau. *Theſ.* II. *Tab.* 75. *n.* 2.

Kikkanetta, Serpent de l'Amerique. *Theſ.* II. *Tab.* 75. *n.* 2.

Lemnia, ou Laphiati, Serpent qui ſe nourrit de Grenouilles. *Theſ.* II. *Tab.* 13. *n.* 2.

Lentiſque, Serpent d'Afrique, ainſi nommé parcequ'il aime cette Plante. *Theſ.* II. *Tab.* 5. *n.* 5.

Lyrica de l'Amérique, Serpent qui par ſon doux ſifflement attire à lui les Oiſeaux. *Theſ.* II. *Tab.* 42. *n.* 3.

Macacoatl, Serpent de l'Amerique, qui aime les Cerfs. *Theſ.* II. *Tab.* 79. *n.* 3.

Macoatl, beau Serpent du Mexique. *Theſ.* II. *Tab.* 73. *n.* 1.

Mamballa, Serpent de l'Iſle de Ceylan, qui a la tête faite comme un Chien de chaſſe. *Theſ.* II. *Tab.* 39. *Theſ.* II.

Milio, Serpent de Guinée très-rare. *Theſ.* II. *Tab.* 83. *n.* 3.

Moluros, Serpent de l'Amerique. *Theſ.* II. *Tab.* 41. *n.* 4. 5.

Ninboo-Quanque Cholla, Serpent rare du Mexique, à queue large. *Theſ.* II. *Tab.* 77.

Pela, Serpent de l'Amérique, ſujet aux poux. *Theſ.* II. *Tab.* 84. *n.* 3.

Petzcoal, Serpent du Mexique, *Thes.* II. *Tab.* 84. *n.* 1.

Phyticus, Serpent prodigieux d'Afrique, honoré d'un culte divin par les Negres. Autre Phyticus des Indes Orientales, nommé auſſi *Gerende*, adoré comme le precedent, & encore plus beau. *Thes.* I. *Tab.* 62. *n.* 1. 2.

Polonga, Serpent qui ne fait point de mal, de l'Iſle Ceylan. *Thes.* II. *Tab.* 102. *n.* 1.

Prince Aſmodée, Serpent du Japon. *Thes.* II. *Tab.* 79. *n.* 1. Autre de la Nouvelle Eſpagne, nommé Tetzauhcoalt. *Thes.* II. *Tab.* 80. *n.* 1.

Roi des Serpens, nommé Lamanda, de l'Iſle de Java. *Thes.* II. *Tab.* 104. *n.* 1.

Rotange, Serpent beau & rare de l'Iſle de Ceylan *Thes.* I. *Tab.* 35. *n.* 4.

Scolopax, Serpent d'Arabie. *Thes.* II. *Tab.* 39. *n.* 1. 2.

Sega, Serpent d'Afrique. *Thes.* II. *Tab.* 5. *n.* 3, 4.

Sepedon, Serpent de l'Amerique. *Thes.* II. *Tab.* 72. *n.* 1.

Serena, Serpent qui ſe trouve en Sicile, marqué de rouge, de brun & de blanc, *Thes.* II. *Tab.* 5. *n.* 1.

Serpent mangeur de Rats, de l'Iſle de Ceylan, nommé *Myophagus*. *Thes.* II. *Tab.* 8. *n.* 1. 2. Autre mangeur de Rats. *ibid.* *Tab.* II. *n.* 2. 3.

Serpent de Ceylan, qui a des figures de Croix ſur la peau, *Crucifera*. *Thes.* II. *Tab.* 2. *n.* 2.

Serpent de Rocher, qui ſe nourrit de Crapauts & de Grenouilles. *Thes.* II. *Tab.* 37.

Serpent de Lybie, qui ſe nourrit d'Oiſeaux & d'autres Animaux. *Thes.* II. *Tab.* 15. *n.* 1.

Serpent d'Afrique, mangeur de Chenilles. *Thes.* II. *Tab.* 3. *n.* 3.

Serpent Royal. *Thes.* II. *Tab.* 52. *n.* 2.

Serpent de mer couronné. Amphibie. *Thes.* II. *Tab.* 18. n. 3.

Serpent de Moculo en Amerique, qui ſe nourrit d'Arraignées. *Thes.* II. *Tab.* 75. *n.* 3.

Serpent mangeur de Grenouilles, de l'Isle de Madere. *Thes.* II. *Tab.* 51. *n.* 4. Autre de l'Isle de Madere, très-prompt à la course, de couleur rousse. *Thes.* I. *Tab.* 54. *n.* 3.

Serpent de la Frise Occidentale, dont on se sert en Medecine. *Thes.* II. *Tab.* 4. n. 1.

Serpent très-beau de l'Amerique, honoré d'un culte divin par les Sauvages. *Thes.* I. *Tab.* 36. *n.* 5.

Serpent de la Virginie, qui se nourrit de Grenouilles. *Thes.* I. *Tab.* 75. *n.* 4.

Serpent de Madere en Afrique, nommé *Levipes*, à cause de la viteſſe avec laquelle il rampe. *Thes.* I. *Tab.* 99. *n.* 3.

Beau Serpent de l'Amérique, de couleur tannée ou roussatre. *Thes.* I. *Tab.* 55. *n.* 6.

Serpent vulgaire d'Allemagne. *Thes.* II. *Tab.* 47. *n.* 1.

Serpent d'Italie. *Ibid. Tab.* 48. *n.* 1.

Tacuman, Serpent du Paraguai. *Thes.* II. *Tab.* 100. *n.* 2.

Tamacailla-Huilia, Serpent du Mexique. *Thes.* II. *Tab.* 98. *n.* 1.

Textilis, Serpent du Bresil, ainsi nommé, à cause de la varieté de ses couleurs. *Thes.* II. *Tab.* 67. *n.* 3.

Titu, Serpent du Bresil de couleur d'olive avec des taches noires, qui se nourrit d'Oiseaux. *Thes.* II. *Tab.* 11. *n.* 1.

Tojuqua, Serpent couronné de la Nouvelle Espagne. Très-beau Serpent. *Thes.* II. *Tab.* 105. *n.* 4.

Tab. IV.
pag 247. Tom. I.











# SYSTÊME NATUREL
## DU
# *REGNE ANIMAL,*

## PARTIE QUATRIEME.

## *CLASSE DES POISSONS.*

Suivant la Méthode d'Artedi, & de M. Linnæus.

M. Klein (*de Audit. Piſc. Lipſic* 1746. *pag.* 2. *n.* 6.) définit les Poiſſons, Animaux ſans pieds, qui nagent par le moyen de leurs nageoires: *Animalia apoda, pinnis natantia.* Artedi *Ichthy. Part. II. pag.* 1. dit: Le Poiſſon eſt un Animal apode (ou ſans pieds), toujours partagé de nageoires: *Piſcis eſt Animal apodum, pinnis ſemper prædituм.* Le *Manati* des Indiens, dont le même Artedi *ibid. p.* 5. fait un Plagiure, n'a que des nageoires au ventre, & point ſur le dos. Cet Animal, dit le P. du Tertre *Tom. II. p.* 199. a ſous le ventre de petites pattes en forme de mains, garnies chacune, de quatre doigts fort courts & onglés. C'eſt ce qui

fait que d'après M. KLEIN nous en donnons la notice dans la *Classe des Quadrupedes Ord. II. Fam. 5. des Anomalopedes n. 5.* Schwenkfeld & d'autres Ichthyologues définissent les Poissons, des *Animaux qui vivent dans l'eau.* Mais les *Tipules* & d'autres Insectes aquatiques ne vivent que dans l'eau, & ils ne sont cependant pas des Poissons. Il est donc mieux de s'en tenir à la définition de M. KLEIN, & de penser avec lui que les Poissons sont des Animaux sans pieds, munis de nageoires, qui leur servent pour nager; car le *Rosmarus* ou la *Bête à la grande dent*, les *Phocas*, & le *Manati*, sont une Famille de Quadrupedes Anomalopedes chez M. KLEIN; & chez M. LINNÆUS les *Phocas* & le *Manati*, un Genre particulier de Quadrupedes dans l'Ordre des *Feræ*.

## *Division des Poissons, selon* ARTEDI.

Ce Naturaliste partage la *Classe des Poissons* en cinq Ordres. Le premier comprend les *Malacopterygiens*, Poissons à nageoires molles, *Pisces Malacopterygii*, dont les uns sont des Poissons d'eau douce, les autres des Poissons de Mer. Le second Ordre les *Acanthopterygiens*, ou Poissons à nageoires épineuses, *Pisces Acanthopterygii*, pareillement Poissons d'eau douce & de Mer. Le troisieme, les *Branchiosteges*, Poissons dont les ouies sont cachées, *Pisces Branchiostegi.* Tels sont les Poissons ronds. Le quatrieme Ordre contient les *Chondropterygiens*, Poissons à nageoires cartilagineuses, *Pisces Chondropterygii.* Tels sont les *Lamproies*, les *Esturgeons*, &c. Et sous le cinquieme Ordre sont rangés les *Plagiures* ou *Poissons Cetacés.*

M. LINNÆUS suit la même division dans sa *Fauna Succica*, & son *Systema Naturæ.* Mais les *Plagiures* composent son premier Ordre; les *Chondropterygiens* le second; les *Branchiosteges* le troisiéme; les *Acanthopterygiens* le quatriéme; & les *Malacopterygiens* le cinquiéme. Ainsi ce Savant Naturaliste commence par où Artedi finit. Nous allons suivre le même Ordre.

# ORDRE PREMIER.

## POISSONS PLAGIURES ou CETACÉES.

### *PISCES PLAGIURI.*

### GENRE PREMIER.

LAMANTIN, nommé par Artedi *Part. V. p.* 109. par M. LINNÆUS *Syst. Nat. édit. 6. p. 39. n. 96. Trichechus*; par Rondelet *l. 16. c. 18. pag.* 490. Gesner *p.* 213. *Manatus*; par Aldrovande *Cet. c.* 11. *p.* 728. 729. Jonston *l. 5. c. 2. p.* 223. Charleton *p.* 169. *Manati Indorum*; par Rai *Quadrup.* 193. par Hernera *Descrip. du nouv. Monde c.* 12. *Taureau marin*; dans le *Voyage de Congo p.* 146. d'Antoine Zucchellus, la *Donna*; par Rochefort *See-Kœjen*; dans l'Exode *c.* 25. *v.* 5. *Tachas* ou *Thachasch*. Les Anglois nomment ce Cetacée *Manalec*, les Espagnols *Manathi* ou *Manati*, les Portugais *Pezze Mouler* ou *Muger*. On l'appelle à Amboïne *Dujung* ou *Dujong*; à Gajane *Cojumero*. C'est le même que M. KLEIN, comme nous l'avons déja dit, met dans la Famille des Quadrupedes Anomalopedes. Il a les deux machoires garnies de dents.

### GENRE II.

CATODON, Cetacée, dont deux especes. La premiere nommée par Artedi *Catodon fistulâ in rostro*. C'est la *Balæna minor in inferiore maxillâ tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso*, de Sibbald & de Rai *p.* 15.

La seconde Espece, nommée par Artedi *Catodon fistulâ in cervice*, est la *Balæna major in inferiore tantum maxillâ dentata, macrocephala bipinnis*, de Sibbald, de Rai *p.* 11. le *Cete* de Clusius *Exot. l. 6. c.* 17. le *Cetus dentatus* de Charleton *p.* 167. nommé en Anglois *A Trumpe* de Purchas; & par les Hollandois *Pot-*

*walfiſch.* Willughby en parle *p.* 41. & M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 262. dit que ces deux *Catodons* habitent dans la Mer de Norwege. Ils n'ont point de nageoires ſur le dos, & la machoire inférieure eſt ſeule garnie de dents. Ce ſont des *Baleines* qui jettent l'eau par les trous qu'elles ont; l'une l'a placé au bout de la machoire ſupérieure; l'autre ſur le haut de la tête.

## GENRE III.

NARHWAL des Iſlandois, nommé par Charleton *p.* 168. *Monoceros, unicornu marinum*; par Rai *p.* 11. *Monoceros piſcis degenere Cetaceo*; par Willughby *p.* 42. *Monoceros piſcis*; par Dale *Pharm.* 413. *Monoceros unicornu.* C'eſt le dixiéme Genre de *Baleine* de Schoneveld *Ichthy.* 28. Ce Cetacée, qui eſt le *Monodon* des Grecs, a des dents à la machoire ſupérieure, point de nageoires ſur le dos. Il a donné occaſion à la fable du Quadrupede terreſtre *Monoceros*, inventée par les Anciens.

## GENRE IV.

*BALEINES*, dont pluſieurs eſpeces.

1. BALEINE vulgaire, nommée par Artedi *Spec.* 106. *Balæna fiſtulâ in medio capite, dorſo caudam verſus acuminato*; Baleine qui a un tuyau au milieu de la tête, par où elle jaillit l'eau qu'elle avale, & qui a le dos pointu vers la queue; nommée par Geſner 114. *Balæna vulgo dicta*; par Aldrovande *Cet.* 688. *Balæna vulgi*; par Jonſton *Piſci.* 152. *Balæna vulgaris*; par Rondelet *Part. II. p.* 475. *Balæna vulgo dicta*; par Charleton *Onom.* 46. *Balæna vulgaris*; par Rai 6. *Balæna vulgaris edentula, dorſo non pinnato*; par Dale *Pharm. p.* 414. ſimplement *Balæna.* Schoneveld *Ichthy.* 24. parle de cette *Baleine vulgaire*; Martens l'appelle *Baleine du Spitzberg.* Elle a été connue des Anciens. Ariſtote *H. A. l.* 3. *c.* 12. l'a nommée Μυσιχητος. Gaza, & Pline *Hiſt. Nat. l.* 32. *c.* 11. l'ont traduit par *Muſculus.* Les Suedois la nomment *Groenlands Walfisk*; les Anglois

*The Whale.* La *Balæna major, laminas corneas in ſuperiore maxilla habens, bipinnis, fiſtula carens*, de Sibbald & de Rai *p.* 216. eſt la même, mais mal décrite d'après Jean Faber Lynceus. Il eſt même vraiſemblable (c'eſt la remarque de M. LINNÆUS) que Faber Lynceus n'a point décrit d'autre *Baleine* que celle de Groenland ou de Spitzberg de Martens, qui eſt la *Baleine vulgaire* dont nous venons de donner la notice. Ce Cetacée, ſelon M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 39. *n.* 99-1. eſt ſans nageoire ſur le dos, & n'a que des dents à la machoire ſupérieure.

2. FIN-FISCH, eſpece de *Baleine*, nommée par Artedi *Spec.* 107. *n.* 2. *Balæna fiſtulâ in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorſo;* la même que la *Balæna edentula, corpore ſtrictiore, dorſo pinnato*, de Rai *p.* 9. 10. C'eſt le *Fin-Fiſch* des Anglois, le Φυσαλος d'Elien *l.* 9. *c.* 49. & d'Oppien *l.* 1. *p.* 14. le *Phyſeter* de Pline *l.* 9. *c.* 4. *l.* 32. *c.* 11. de Solin *Polyhiſt. c.* 55. de Rondelet *l.* 16. *c.* 14. *p.* 485. d'Aldrovande *Cet. c.* 4. *p.* 689. de Jonſton *l.* 5. *p.* 216. de Willughby *p.* 41. Geſner *Aqu. p.* 723. 851. la nomme *Phyſalis Bellua ſeu Phyſeter*, & Charleton *p.* 167. M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 265. & *Syſt. Nat. n.* 99-2. en donne la notice. C'eſt le *Soufleur*. Il y en a deux autres, dont parlent Sibbald & Rai. Voyez plus bas *Genre VI.*

3. BALEINE qui a un double tuyau au bout de la machoire ſupérieure, par où elle jette l'eau. *Balæna fiſtula duplici in roſtro, protuberantia cornuiformi in extremo dorſo.* Artedi *Part. V. p.* 107. *n.* 3. C'eſt la *Balæna tripinnis nares habens, cum roſtro acuto, & plicis in ventre*, de Sibbald & de Rai *p.* 16.

4. BALEINE qui a un double tuyau ſur le front, & la mâchoire inférieure beaucoup plus large. *Balæna fiſtulâ duplici in fronte, maxillâ inferiore multo latiore.* Artedi *ibid. n.* 4. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. n.* 99-3. La *Balæna tripinis, maxillam inferiorem rotundam, & ſuperiorem multo latiorem habens*, de Sibbald & de Rai *p.* 17. en eſt une varieté.

1. MARSOUIN, nommé par Artedi *part. V.* 104. *n.* 1. *Delphinus corpore fere coniformi, dorso lato, rostro subacuto.* Dauphin qui a le corps presqu'en forme de cone, le dos large, le museau pointu. C'est le φωκαινα d'Aristote *l.* 6. *c.* 14. *l.* 8. *c.* 13. le *Tyrsio* de Gaza, le *Tursio* de Pline *l.* 9. *c.* 9. le *Phocœna* de Wotton *l.* 8. *c.* 194. *fol.* 17 de Rondelet *l.* 16. *c.* 9. *p.* 473. de Jonston *l.* 5. *c.* 2. de Charleton *p.* 168. de Willughby *p.* 31. de Rai *p.* 13. de Belon *p.* 16. de Gesner *p.* 711. 838. d'Aldrovande. Cet. *c.* 8. *p.* 719. 720. de Schoneveld *p.* 77. Ce Naturaliste le nomme petit Dauphin des Mers Septentrionales & Orientales. Les Danois le nomment *Marsuin*, les Anglois *A Porpesse.*

2. DAUPHIN, nommé par Artedi *ibid. p.* 105. *n.* 2. & M. LINNÆUS *Syst. Nat. p.* 39. *n.* 100-2. *Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto.* C'est le Δελφις d'Aristote *l.* 2. *c.* 13. *l.* 3. *c.* 1. *l.* 4. *c.* 8. 9. 10. *l.* 5. *c.* 5. *l.* 6. *c.* 12. *l.* 8. *c.* 2. 13. 19. *l.* 9. *c.* 48. d'Athenée *l.* 7. *p.* 282. *l.* 8. *p.* 353. le Δελφιν d'Elien *l.* 1. *c.* 18. *l.* 2. *c.* 6. *l.* 5. *c.* 5. *l.* 6. *c.* 15. *l.* 8. *c.* 3. *l.* 10. *c.* 8. *l.* 11. *c.* 12. *l.* 12. *c.* 12. le Δελφις, ινος d'Oppien *l.* 1. *p.* 15. 22. 25. & *l.* 2. Pline *II. n. l.* 9. *c.* 8. *l.* 8. *c.* 25. 56. *l.* 32. *c.* 11. Cuba *l.* 3. *c.* 25. Wotton *l.* 8. *c.* 194. Rondelet *l.* 16. *c.* 8. Jonston *l.* 5. *c.* 2. Charleton *p.* 168. Aldrovande *Cet. c.* 7. *p.* 703. Rai *p.* 12. Willughby *p.* 28. Gesner *de Aquat.* & les autres, en parlent sous le nom de *Delphinus.* Les Anglois le nomment *The Delphin* & *Porpesse.*

3. ORCA, ou NORD-ÇAPER des Ecossois, nommé par Artedi 106. *n.* 3. & par M. LINNÆUS *Faun. Suec. p.* 100. *n.* 267. *Syst. Nat. p.* 39. *n.* 100.-3. *Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis.* Pline *l.* 9. *c.* 6. & *l.* 32. *c.* 11. Cuba *l.* 3. *c.* 63. Wotton *l.* 8. *c.* 195. Rondelet *l.* 16. *c.* 13. Gesner *de Aquat.* 635. Aldrovande *Cet.* 698. Jonston *Pisc.* 217. Schoneveld *Ichth.* 53. Charleton *Onom.* 168. Willughby *Ichty* 40. & Rai *p.* 10. en parlent sous le nom d'*Orca.* Les Suedois le nomment *Loepare*, Martens *Bults-Kopf*; sur l'Ocean *Loper.* Les Hilliglandois *Tandtheye*, *Springer* & les Anglois *Grampus.* Ces Poissons sont communs dans les

mers d'Occident & du Nord. Ils ont des nageoires sur le dos, & les machoires garnies de dents.

## GENRE VI.

1. SOUFLEUR, dont la machoire supérieure est plus longue, que l'inférieure, & qui a une longue nageoire sur le dos. *Physeter maxillâ superiore longiore; pinnâ longâ in dorso.* Artedi *p.* 104. *n.* 1. C'est la *Balena major in inferiore tantum maxillâ dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens*, de Sibbald & de Rai *p.* 15.

2. SOUFLEUR, dont la nageoire du dos est très-élevée, & la pointe plate & dentelée. *Physeter pinnâ dorsi altissimâ, apice dentium plano.* Artedi *ibid.* 2. Sibbald & Rai *p.* 16. le nomment *Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes.* Ces Poissons, selon M. LINNÆUS *System. Natur. n.* 101. ont sur le dos une grande nageoire, & des dents courbes à la machoire inférieure. Le *Fin-Fisch* des Anglois est le *Soufleur* des Anciens.

* Ces *Plagiures*, ou *Poisson Cétacées*, par la structure intérieure de leurs corps appartiennent plutôt à la Classe des Quadrupedes terrestres, qu'à celles des Poissons. Ils ont des poulmons, la respiration, une queue, & des mammelles pour allaiter leurs petits; & en un mot, comme les Quadrupedes, ils sont vivipares. Le savant M. Anderson, sous le nom général de *Baleine*, nous a donné l'Histoire & la description de ces différentes especes de *Cetacées.* Il y en a joint même plusieurs autres, comme la *Scie*, l'*Epée* &c. On les trouve dans notre *Dictionnaire des Animaux* au mot *Baleine*, tous décrits d'après ce Naturaliste.

# ORDRE II.

## POISSONS A NAGEOIRES CARTILAGINEUSES.

*Piſces Chondropterygii.*

## GENRE PREMIER.

Poiſſons qui ont cinq trous de chaque côté des ouies, & le corps plat.

1. RHINOBATE ou RAIE, qui eſt le Ῥινοβατος d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 11. nommé par Artedi *ibid. Icth. p.* 99. *n.* 1. *Raia oblonga, unico tantum aculeorum ordine in medio dorſo.* Gaza a traduit le Ῥινοβατος d'Ariſtote par *Squatino-Raia.* C'eſt ſous ce nom & celui de *Rhinobatus*, que les Naturaliſtes parlent de ce Poiſſon, comme Aldrovande *l.* 3. *c.* 67. *p.* 475. 477. 478. Charleton *p.* 131. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Geſner *de Aquat. p.* 903. Willughby *p.* 79. Rai *p.* 28. Rondelet *l.* 12. *c.* 22. *p.* 370.

2. RAIE bouclée; *Raia clavata*; nommée par Artedi *ibid. n.* 2. & par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 268. *Raia aculeata, dentibus tuberculoſis, Cartilagine tranſverſâ in ventre.* C'eſt la *Raia clavata* de Rondelet *l.* 12. *c.* 13. *p.* 353. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 57. *p.* 460. de Geſner *de Aquat.* de Schoneveld *p.* 58. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Charleton *p.* 130. de Willughby *p.* 74. & de Rai *p.* 26. Les Anglois la nomment *The Thornback* & *Maids.*

RONCE. C'eſt une autre eſpece de *Raie bouclée*, qui n'eſt qu'une varieté de la precédente. *Altera ſpecies Raiæ clavatæ*, ſelon Rondelet *l.* 12. *c.* 14. *p.* 354. Geſner *p.* 795. 936. Aldrovande *l.* 3. *c.* 58. *p.* 461. Willughby *p.* 78. Rai *p.* 26.

3. PASTENAGUE, en Grec Τραγων par Ariſtote *l.* 1. *c.* 5. *l.*

5. *c.* 3. 5. *l.* 6. *c.* 10. 11. *l.* 8. *c.* 13. *l.* 9. *c.* 37. Τηυγων par *Elien* *l.* 1. *c.* 37. 56. *l.* 2. *c.* 36. 50. *l.* 8. *c.* 26. par Athenée *l.* 7. *p.* 330. par Oppien *l.* 1. *p.* 5. *l.* 2. *p.* 46. 47. 48. En Latin *Paſtinaca* par Rondelet *l.* 12. *c.* 1. *p.* 331. Geſner *p.* 679. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Aldrovande *l.* 3. *c.* 46. Schoneveld *p.* 58. Willughby *p.* 67. & Rai *p.* 24. On nomme en Angleterre cette eſpece de *Raie*, *The Fire-Flairt*; à Rome *Bruco* ou *Brucho*, dit Salvien.

4. ALTAVELA, nom qu'on donne à Naples à une autre eſpece de *Paſtenague*. C'eſt la *Raia corpore glabro, aculeis ſæpè duobus poſticè ſerratis in caudâ apterygia*, d'Artedi *n.* 4. nommée par Columna *Aquat. c.* 2. *p.* 4. *t.* 2. *Paſtinaca marina altera.* Πλερυγλατεια en Grec. Willughby *p.* 65. & Rai *p.* 24. en parlent.

5. AIGLE, *Aquila*; Αετος en Grec par Ariſtote *l.* 5. *c.* 5. par Athenée *l.* 7. par Oppien *l.* 1. Cette eſpece de *Raie* eſt l'*Aquila* de Pline *l.* 9. *c.* 24. de Salvien *fol.* 146. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Willughby *p.* 64. de Rai *p.* 23. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 47. *p.* 438. Columna *c.* 1. *p.* 3. *t.* 2. la nomme *Paſtinaca marina lævis altera*; en Grec Οξυπλερυδης. C'eſt la ſeconde eſpece de *Paſtenague* de Rondelet *l.* 12. *c.* 2. *p.* 338. On la nomme à Rome *Aquilone.*

6. RAIE, nommée *Fullonica* par Rondelet *l.* 12. *c.* 17. *p.* 356. Geſner *p.* 797. 938. Aldrovande *l.* 3. *c.* 61. *p.* 462. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 130. Ce peut être la même que la *Raia aſpera noſtras* de Willughby *p.* 78, & de Rai *p.* 26. nommée en Anglois *The white Horſe.* Cette *Raie* a deux rangs de piquans ſur la queue, un ſimple proche des yeux, & le dos en eſt tout couvert. *Raia toto dorſo aculeato, duplici ordine aculeorum in caudâ, ſimplicique ad oculos*, dit Artedi *n.* 6.

7. MIRALLET, *Raie* nommée par Artedi *ibid. n.* 7. *Raia dorſo ventreque glabris, aculeis ad oculos, ternoque eorum ordine in caudâ.* C'eſt la *Raia oculata & lævis* de Rondelet *l.* 12. *c.* 9. *p.* 343. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 51. *p.* 453. de Geſner *p.* 793. 933. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Charleton *p.* 130. de Schoneveld *p.* 58. de Willughby *p.* 72. de Rai *p.* 27. Belon l'appelle *Mi-*

*raletus*. A Veniſe *Barrocol* ; à Rome *Arzilla* ; & à Marſeille *Mirallet*.

8. FLOSSADE, ou *Raie à bec pointu*. Artedi *n.* 8. ſous le nom de *Raia varia, tuberculis decem aculeatis in medio dorſi*, 1°. Le Βατος d'Ariſtote *l.* 5. *c.* 5. *l.* 6. *c.* 12. & d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. *l.* 2. *p.* 35. dont parlent Ovide & Pline *l.* 9. *c.* 24. & Paul Jove *c.* 3. *p.* 16. 20. le Χειροβατος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. *l.* 6. *c.* 12. & d'Athenée *l.* 7. *p.* 312, qui eſt la *Lævi-Raia* de Belon & de Salvien ; 3°. Le *Bos* de Belon, qui eſt l'*Oxyrynchus major* de Rondelet & d'Aldrovande, *l.* 3. *c.* 52. *p.* 453. de Jonſton, *l.* 1. *c.* 3. de Willughby *p.* 77. de Rai *p.* 26. Il y a une autre eſpece de *Raie* à long bec, *Raia Oxyrynchus major*, que quelques-uns croient être le *Bœuf* des anciens, dit Geſner *p.* 792. 933. Une autre eſpece à long bec ; Rondelet en parle *p.* 347. & 348. Tous ces *Raies* ne ſont que des varietés. Cette eſpece de *Raie* ſe nomme à Rome *Macoſa* & *Bavoſa*.

9. RAIE ondée, ou cendrée, nommée par Artedi *n.* 9. *Raia varia, dorſo medio glabro, unico aculeorum ordine in caudâ*. C'eſt le Βατις d'Ariſtote *l.* 1. *c.* 5. *l.* 2. *c.* 13. *l.* 5. *c.* 5. *l.* 6. *c.* 10. 11. *l.* 8. *c.* 15. *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 16. *c.* 13. *p.* 921. d'Oppien *l.* 1. *c.* 5. d'Athenée *l.* 7. *p.* 286. Cuba *l.* 3. *c.* 74. & 77. parle de cette eſpece de *Raie*, qui eſt la *Raia undalata ſive cinerea* de Rondelet *l.* 12. *c.* 6. *p.* 346. de Geſner *p.* 791. 932. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 50. *p.* 452. de Jonſton, de Charleton & des autres. Ce peut être auſſi la *Raia lævis* de Schoneveld Les Anglois la nomment *The Skate* ou *Flair*. Le Βατος d'Ariſtote eſt le mâle, & le Βατις la femelle.

10. TORPILLE. *Torpedo*, eſpece de *Raie*, dont pluſieurs varietés ; nommée par Artedi, *n.* 10. *Raia tota lævis*. C'eſt le Ναρκη d'Ariſtote *l.* 2. *c* 13. 15. *l.* 5. *c.* 5. 11. *l.* 6. 10. 11. *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 1. *c.* 36. *l.* 5. *c.* 37. *l.* 9. *c.* 14. d'Athenée. *l.* 7. *p.* 314. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. l. 2. *p.* 32. Cuba nomme cette eſpece de *Raie*, *Narcos*, *l.* 3. *c.* 62. Les autres Naturaliſtes *Torpedo*, comme Pline *l.* 9. *c.* 16. 24. 42. 51. & *l.* 32. *c.* 9. 11. Rondelet *p.* 258. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 139. Rai

*p.*

*p.* 28. Willughby *p.* 81. Gesner, Aldrovande *l.* 3. *c.* 45. *p.* 418. parlent d'une *Torpille* qui n'est point tachetée, *Torpedo non maculosa.* Le même Gesner, d'une *Torpille* qui a des taches sur le dos, *Torpedo maculosa supina.* Le même, d'une autre qui a des figures d'yeux sur la peau, *Torpedo oculata.* Rondelet donne la description de quatre, qui ne sont que des varietés. On nomme à Rome la Torpille *Ochiatella*, & en Angleterre *The Crampfisch.*

Voilà les dix Especes différentes de *Rai*, dont Artedi & M. LINNÆUS *Syst. Nat. édit.* 6. *p.* 40. *n.* 102. donnent la notice.

11. RONDELET parle encore de quelques autres Especes de *Raie;* savoir de la Raie étoilée, *Raia asterias p.* 350. de la Raie piquante, *Raia oculata & aspera p.* 351. d'une autre Raie piquante étoilée, *Raia asterias aspera p.* 352. d'une Raie épineuse, *Raia spinosa*, qu'il nomme *Carduire p.* 355. d'une autre Raie piquante, *Raia aspera p.* 356. d'une Raie piquante dessus & dessous, *Raia asperrima.* Mais ces *Raies* ne sont que des varietés; elles appartiennent aux Especes ci-dessus nommées. Tous les Poissons de ce Genre ont cinq trous à chaque branchie ou ouie, & le corps plat.

## GENRE II.

### Poissons qui ont cinq trous de chaque côté des ouies, & le corps oblong.

1. SCIE, nommé par Artedi *p.* 93. *n.* 1. & par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 270. *Squalus rostro longo cuspidato osseo plano, utrinque dentato.* C'est le Πριστης d'Aristote *l.* 6. *c.* 12. d'Athenée *l.* 8. *p.* 333. d'Opien *l.* 1. *p.* 14. & d'Elien *l.* 9. *c.* 49. qui nomme ce Poisson Πριστης. Pline *l.* 9. *c.* 3. 4. *l.* 32. *c.* 11. Cuba *l.* 3. *c.* 68. Gesner *p.* 729. Jonston *l.* 5. *c.* 2. en parlent sous le nom de *Serra*, & Aldrovande *l.* de *Cet. c.* 5. *p.* 693. Clusius *Exot. l.* 6. *c.* 9. Willughby *p.* 61. Rai *p.* 23. Rondelet *p.* 487. & d'autres, en parlent sous celui de *Serra* & de *Pristis.* Les Suedois nomment ce Poisson *Sag-fisk*,

les Anglois *The Saw-fish.* Aldrovande, Rondelet, qui l'appelle *Vivelle*, & les autres, le mettent dans le rang des Poiſſons cetacées, & nous en donnons dans notre *Dictionnaire des Animaux* la deſcription au mot BALEINE.

2. ÉMISOLE de Rondelet, *Galæus lævis*; eſpece de *Chien de Mer*, nommé par Artedi *n.* 2. *Squalus dentibus obtuſis ſeu granuloſis.* C'eſt le Γαλεος λειος d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 10. d'Athenée *l.* 7. *p.* 294. d'Oppien *l.* 1. *f.* 113. nommé en Latin *Galeus lævis* par Belon, Rondelet *l.* 3. *c.* 3. *p.* 375. Geſner *p.* 608. Aldrovande *l.* 3. *c.* 35. *p.* 392. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. l'appelle *Muſtelus lævis*, ainſi que Willughby *p.* 60. & Rai *p.* 22. les Anglois le nomment *The ſmooth* ou *unprickly Hound.*

Le *Chien* de Mer étoilé, *Galeus aſterias*, en eſt une varieté. Ariſtote *l.* 5. *c.* 10 *l.* 6. *c.* 11. Oppien *l.* 1. *fol.* 113. Athenée *l.* 7. en parlent ſous le nom de Γαλεος αστεριας, & Gaza, Belon, Geſner *p.* 613. Rondelet *l.* 13. *c.* 4. *p.* 376. Aldrovande *l.* 3. *c.* 36. *p.* 393. Willughby *p.* 61. Charleton *p.* 128. & les autres, ſous le nom de *Galeus ſtellatus*, de *Galeus aſterias*, & de *Muſtalus ſtellaris ſive varius.*

Le Γαλεος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 3. *c.* 1. *l.* 4. *c.* 5. d'Elien *l.* 1. *c.* 55. *p.* 59. *l.* 2. *c.* 55. *p.* 132. *l.* 9. *c.* 65. *p.* 570. & d'Oppien *l.* 1. *p.* 15. le *Squalus* d'Ovide & de Pline *l.* 9. *c.* 24. 51. dont Artedi ne marque pas l'eſpece, , peuvent être de celle-ci.

3. AIGUILLAT, ainſi nommé par Rondelet; autre eſpece de *Chien de Mer*, nommé par Artedi *n.* 3. *Squalus pinnâ ani nullâ, corpore ſubrotundo*; par Ariſtote *l.* 6. *c.* 10. *l.* 9. *c.* 37. par Athenée *l.* 7. *p.* 294. par Oppien *l.* 1. *fol.* 113. ακανθιας Γαλεος; par Rondelet *p.* 373. Geſner *p.* 607. Charleton 128. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. *Galeus acanthias*; par Jonſton *l.* 1. *c.* 3. *Galeus acantheas*; par Aldrovande *l.* 3. *c.* 40. *p.* 399. Willughby *p.* 56. Rai *p.* 2. *Galeus acanthias ſive ſpinax*; par Belon, Salvien *fol.* 135. *Muſtelus ſpinax*; par Scaliger *Muſtelus ſpinus*; par Schoneveld *p.* 29. *Canis acanthias*; en Alleman *Dornhundt*, ſelon Geſner; à Veniſe *Azio*; à Rome *Scazone*, ſelon Salvien; en Anglois *A Picked*

*Dog* ou *Hound-Fiſch* ; en Suedois *Hai*, ſelon M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 269. Ce Poiſſon ſe trouve dans la Mer d'Occident.

4. Autre eſpece d'AIGUILLAT, nommé par Artedi *n.* 4. *Squalus pinnâ ani carens, naribus extremo roſtro* ; par Willughby *p.* 57. & par Rai *p.* 21. *Galeus acanthias* ou *ſpinax fuſcus* ; A Gênes *Sagree.*

5. PORC ou CENTRINE, nommé par Artedi *n.* 5. *Squalus pinnâ ani carens, ambitu corporis triangulato.* C'eſt le Κεντρινη d'Elien *l.* 1. *c.* 55. *p.* 59. *l.* 11. *c.* 8. le Κεντρινη d'Athenée *l.* 7. *p.* 294. & d'Oppien *l.* 1. *p.* 15. *l.* 3. *c.* le *Centrina* de Rondelet *p.* 384. de Salvien *fol.* 156. de Geſner *p.* 609. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 41. *p.* 401. le *Centrine* de Jonſton *l.* 1. de Willughby *p.* 58. de Rai *p.* 21. nommé auſſi par Geſner *p.* 613. & par Belon *Vulpecula* ; & en Italien *Peſce Petro*, Porc Poiſſon.

6. ANGE, nommé par Artedi *n.* 6. *Squalus pinnâ ani carens, ore in apice capitis.* C'eſt le Ρινη d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. *l.* 5. *c.* 5. 10. 11. *l.* 6. *c.* 10. 11. *l.* 9. *c.* 37. d'Athenée *l.* 7. *p.* 319. d'Oppien *l.* 1. *p.* 15. le *Rhina* ou *Squatus* de Pline *l.* 32. *c.* 11. Le même Naturaliſte en parle ſous le nom de *Squatina l.* 9. *c.* 12. 24. 42. 51. *l.* 32. c. 3. Cuba *l.* 3. *c.* 83. Paul Jove *c.* 29. Belon, Rondelet *l.* 12. *c.* 21. *p.* 367. Salvien *fol.* 151. Geſner *p.* 899. Aldrovande *l.* 3. *c.* 66. *p.* 472. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 131. Willughby *p.* 79. Rai *p.* 26. Geſner en parle encore ſous le nom d'*Angelus.* On le nomme à Gênes *Peſce angelo* ; en Anglois *The Monk* ou *Angel-fish.* Ce Poiſſon eſt fort connu à Paris, & c'eſt celui qu'on y vend plus communément ſous le nom de *Raie.* Rondelet le met dans le rang des *Raies.*

7. MARTEAU ou POISSON JUIF, nommé par Artedi *n.* 7. *Squalus capite latiſſimo tranſverſo mallei inſtar.* C'eſt le Ζυγαινα d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. le Ζυγαννα d'Elien *l.* 9. *c.* 49. & d'Oppien *l.* 1. p. 14. en Latin *Zygæna*, ſelon Belon, Rondelet *p.* 389. Geſner 1050. 1255. Aldrovande *l.* 3. *c.* 43. *p.* 408. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 128. Willughby *p.* 55. Rai *p.* 20. Gaza a traduit le nom Grec Ζυγαννα par *Libella.* On le nomme

à Rome *Ciambetta*, dit Salvien ; en Anglois *The Balance-fish.*

8. RENARD, nommé par Artedi *n.* 8. *Squalus caudâ longiore quàm ipsum corpus* Ce Poisson qui a la queue plus longue que le corps, est nommé Αλωπηξ par Aristote *l. 6. c.* 10. 11. *l. 9. c.* 37. & Oppien *l* 2. *p.* 59. & Αλωπηκιας par Athenée *l.* 7. *p.* 294. Θαλατια αλωπηξ par Elien *l. 9. c.* 12. *p.* 522. C'est le *Vulpes marina* de Pline *l.* 2. *p.* 59. de Cuba *l.* 3. *p.* 101. de Gesner *p.* 1045. de Willughby *p.* 54. de Rai *p.* 50. le *Vulpes* de Rondelet *p.* 387. le *Simia* de Gesner & de Belon, & enfin le *Vulpecula marina* d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 39. *p.* 396. de Jonston *l.* 1. *c.* 3. de Charleton *p.* 128. Les Anglois le nomment *The Sea Fox* ou *Ape.*

9. MILANDRE, nommé par Artedi *Squalus naribus ori vicinis, foraminibus exiguis ad oculos.* Cette espece de *Chien*, qui a les narines voisines de la gueule, & des trous proche des yeux, est le Γαλεος Κυων d'Aristote *l. 6. c.* 11. d'Oppien *l.* 44. nommé *Canicula* par Pline, *Galeus Canis* par Rondelet *p.* 377. Salvien *fol.* 130. Willughby *p.* 51. Rai *p.* 20. Aldrovande *l.* 3. *c.* 33. *p.* 388. & Jonston en parlent sous le nom de *Galeus Canis vulgaris.* On l'appelle dans la Province de Cornouaille *A Tope*, à Marseille *Pal*, à Rome *Lamiola* ou *Canosa.*

10. ROUSSETTE, autre *Chien* de Mer, nommé par Artedi *n.* 10. *Squalus ex rufo varius, pinnâ ani medio inter anum & caudam pinnatam.* C'est le Σκυλιον d'Aristote *l. 6. c.* 10. 11. le Σκυμνος d'Athenée *l.* 7. *p.* 294. d'Oppien *l.* 1. *fol.* 113. nommé *Canicula* par Rondelet *p.* 380. Gesner *p.* 168. *Catulus major* par Salvien *fol.* 137. Aldrovande *l.* 3. *c.* 34. *p.* 390. Jonston *de Piscib. Catulus major vulgaris* par Willughby *p.* 62. & Rai *p.* 22. On le nomme à Rome *Scorzone*, à Venise *Pesce gatto*, dans la Province de Cornouaille en Angleterre *A Bounce.*

11. ROUSSETTE de la petite espece, nommée par Artedi *n.* 11. *Squalus dorso vario pinnis, ventralibus concretis.* C'est le *Catulus minor* de Salvien *fol.* 138. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 34. *p.* 390. de Willugby *p.* 64. de

Rai *p.* 22. & le *Muſtelus ſtellaris tertius* de Belon, nommé à Rome, dit Salvien, *Peſſe Gatto*, & en Angleterre *The Rough-Hound* ou *Morgay*.

12. CHAT de rocher, nommé par Artedi *n.* 12 *Squalus cinereus, pinnis ventralibus diſcretis*; par Rondelet *Canicula ſaxatilis*; *Catulus maximus* par Willughby *p.* 63. par Rai *p.* 22. *Muſtelus ſtellaris primus* par Belon & Geſner *p.* 723. en Italien *Catto Rochiero*. C'eſt une autre eſpece de *Rouſſette*.

13. CHIEN de Mer bleu, nommé par Artedi *n.* 13. *Squalus foſſula triangulari in extremo dorſo, foraminibus nullis ad oculos*. C'eſt le γλαυκος d'Elien *l.* 1. *c.* 16. *p.* 22. le *Galeus Glaucus* de Rondelet *p.* 378. de Geſner *de Aquat.* d'Aldrovande l. 3. *c.* 37. *p.* 394. de Jonſton *de Piſc.* de Willughby *p.* 49. de Rai *p.* 20. & le *Glaucus* de Charleton *p.* 128. On le nomme en Anglois *Blew Shark*.

14. LAMIE, nommé par Artedi *f.* 14. *Squalus dorſo plano, dentibus plurimis ad latera ſerratis*. Cette eſpece de *Chien* de Mer, dont les dents ſont en forme de ſcie par les côtés, eſt nommé λαμια par Ariſtote *l.* 5. *c.* 5. *l.* 9. *c.* 37. λαμια par Oppien *l.* 1. *p.* 14. καρχαριας par Athenée *l.* 7. *p.* 306. 310. κυων αλατλια par Elien *l.* 1. *c.* 17. *Lamia* par Pline *l.* 9. *c.* 24. Rondelet *p.* 390. *Canis Carcharias* ou *Lamia* par Geſner *p.* 173. 264. par Willughby *p.* 47. par Rai *p.* 18. par Aldrovande *l.* 3. *c.* 32. *p.* 383. & par Charleton *p.* 127. Aldrovande *l.* 3. *c.* 33. *p.* 388. parle d'un autre *Canis Carcharias*.

Le *Tiburon*, mis par Rondelet parmi les Cetacées, en eſt une varieté. Il en parle *p.* 489. Geſner *p.* 213. Marcgrave *l.* 4. Nieremberg *l.* 12. *c.* 20. Jonſton *l.* 4. *c.* 3. *p.* 208. & Rai *p.* 18. Les Suedois le nomment Poiſſon de Jonas, *Hai* en leur langue; *The White Shark* en Anglois.

Telles ſont les différentes eſpeces de *Chiens de Mer*, ſuivant Artedi, M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 40. *n.* 103. & les autres Naturaliſtes.

Rondelet *p.* 393. met auſſi dans le rang des *Chiens de Mer*, un Poiſſon nommé en Grec μαλθη, qu'il

nomme en François *Sorrat*, & qu'on appelle *Lamiola* à Rome à cauſe de la reſſemblance de ſes dents avec celles de la *Lamie*. Les Poiſſons de ce Genre ont le corps oblong, & cinq trous à chaque branchie.

## GENRE III.

POISSONS qui ont un trou de chaque côté des ouies, point de dents dans la bouche, & la bouche en forme de tube.

1. ÉTURGEON, nommé par Artedi *p.* 91. *n.* 1. *Acipenſer corpore tuberculis ſpinoſis exaſperato.* Durion dans Athenée *l.* 7. *p.* 315. le nomme Ουισκος. Le même Athenée *l.* 7. *p.* 294. le nomme Ακκιπησιος. Plaute *Comæd. fab. in baccharià*; Ciceron *de Fato & finib. l.* 2. *p.* 69. *Tuſcul. Quæſt. l.* 3. Martial, Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 17. *l.* 32. *c.* 11. Macrobe *l.* 3. *Saturn. c.* 16. Cuba *l.* 3. *c.* 1. Wotton *l.* 8. *c.* 9. *p.* 171. Belon, Rondelet *p.* 410. Geſner, Schoneveld *p.* 9. en parlent ſous le nom *Acipenſer*; & Cuba *l.* 3. *c.* 88. Paul Jove *c.* 4. *p.* 18. Aldrovande *l.* 4. *c.* 9. *p.* 517. Jonſton *l.* 2. *c.* 7. Charleton *p.* 152. Willughby *p.* 239. Rai *p.* 112. en parlent ſous le nom de *Sturio*. Les Suedois le nommment *Ston*, les Danois *Store*, les Anglois *The Sturgeon*, les Italiens *Sturione*.

Le Poiſſon nommé *Elops* par Rondelet *p.* 430. eſt eſt le même ou une varieté du précédent; ce que Pline confirme *l.* 9. *c.* 17. Il eſt nommé par Ariſtote *l.* 2. *c.* 13. 15. Ελοψ, & Ελλοψ par Elien *l.* 8. *c.* 28. & Athenée *l.* 7. *p.* 300.

2. COPSO & COLPESCE. Artedi *n.* 2. ſous le nom d'*Acipenſer tuberculis carens*, place le *Mario* de Pline *l.* 9. *c.* 15. qui eſt le *Huſo* des Allemands. & le *Copſo* & *Colpeſce* des Italiens. Voyez ſur ce Poiſſon Geſner, Aldrovande *l.* 4. *c.* 11. *p.* 534. Jonſton *l.* 2. *c.* 1. Charleton *p.* 153. Willughby *p.* 243. Rai *p.* 113.

L'*Ichthyocolla* de Pline *l.* 32. *c.* 7. de Belon, Rondelet, Aldrovande *l.* 5. *c.* 4. *p.* 566. Jonſton *l.* 3. *c.* 3. Willughby *p.* 244. Rai *p.* 114. & que les Allemands

nomment *Huſen*, eſt de la même eſpece que le *Copſo*, ainſi que l'*Antacée du Boriſthene*, nommé Ανταϛαιος par Elien *l.* 14. *c.* 23. 26. en Latin *Antacæus Boryſtenis*, ſelon Rondelet, Geſner, Jonſton *l.* 3. *c.* 2. & Charleton *p.* 158.

3. Autre eſpece d'ÉTURGEON, *Sturio alter Gedanenſis*, qu'on voit à Dantzic. M. KLEIN *Miſſ.* 4. *p.* 13. *t.* 1. en parle. Les Suedois le nomment *Sterlett.* Le Roi de Suede en a fait venir de Ruſſie pour en peupler un de ſes Lacs; & M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 272. le nomme *Acipenſer ordinibus quinque longitudinalibus ſquammarum oſſearum, intermedio oſſiculis quindecim.*

## GENRE IV.

POISSONS qui ont ſept trous de chaque côté des ouies.

1. LAMPROIE, *Lampetra*, Poiſſon de Riviere, nommé par Artedi *p.* 89. *n.* 1. *Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris præter inferiores majores*; par M. LINNÆUS *Faun. Suec.* 273. *Petromyzon pinnâ dorſali ſecundâ angulatâ.* C'eſt la *Lampetra parva & fluviatilis* de Rondelet *Part. II. p.* 202. de Geſner *p.* 598. 706. de Willughby *p.* 104. de Rai *p.* 35. d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 9. *p.* 581. de Jonſton *l.* 2. de Schoneveld *p.* 41. & de Charleton *p.* 159. La *Lampetra ſubcinerea maculis carens*, & la *Lampetra minima* de Salvien, ne ſont que des varietés. Aldrovande *l.* 4. *c.* 13. *p.* 539. parle d'une très-petite *Lamproie*, qui ne peut être que de la même eſpece. Willughby *Ichthy. p.* 104. & le Comte de Marſilly dans l'Hiſtoire de ſes Poiſſons du Danube 4. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 1. ont écrit ſur la *Lamproie* de Riviere. Les Suedois la nomment *Nein-œga*, & en Weſtrobotnie *Naetting*, où elle eſt fort commune, ainſi que dans les Rivieres d'Oſtrobotnie & de Norlande; les Allemands *Neunaugen*, & les Anglois *A Lampern.*

Artedi comprend auſſi ſous le titre de *Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris præter inferiores majores*, la *Muſtela* de Pline *l.* 9. *c.* 17. dont

parlent Ambroſ. *in Hexam.* 5. *c.* 2. Cuba *l.* 3. *c.* 56. une *Muſtela fluviatilis minor* de Belon, une autre *Muſtela* de la Moſelle, dont il eſt fait mention dans Auſone *v.* 107. & dans Caius Figula *fol.* 5. la *Murena* d'Albert le Grand *Anim. l.* 24. & enfin différents Genres de *Lamproie*, dont parle Geſner *p.* 597. & *Paralip. p.* 23. une autre que les Allemands & les Hollandois nomment *Prick* ou *Brick*, dont parlent Willughby *p.* 106. Rai *p.* 35. une *Lampreda minor* ou *Enneophtalmus major* de Kentmann, que Salvien *fol.* 63. Aldrovande *l.* 4. *c.* 13. *p.* 540. Jonſton *l.* 2. nomment *Prick* & *Pricka*; & une moyenne *Lamproie* de Sileſie de Schwenkfeld.

M. LINNÆUS fait remarquer qu'Artedi met ces Poiſſons tous de la même eſpece avec la *Lamproie* de riviere; mais cela mérite d'être examiné.

2. Grande LAMPROIE, ou LAMPROIE de Mer, nommée par Artedi *n.* 2. *Petromyzon maculoſus, ordinibus dentium circiter viginti.* Les Auteurs qui ont écrit ſur ce Poiſſon, ſont Paul Jove *c.* 34. *p.* 109. Rondelet *l.* 14. *c.* 3. *p.* 398. Charleton *p.* 153. Willughby *p.* 105. Rai *p.* 35. La *Lampreda* de Kentmann, dont parle Geſner *Parali. p.* 22. une autre *Lampreda marina* du même Geſner, la *Lampetra maculoſa & bicubitalis* de Salvien *fol.* 63. une autre *Lampetra major* d'Aldrovande *l.* 4. *c.* 13. *p.* 539. de Jonſton *l.* 2. *c.* 3. & la *Muſtela* ou la *Lampetra* de Belon & de Geſner *p.* 590. ne ſont que la même ou des varietés, que les Italiens nomment *Lampreda*, & les Anglois *A Lamprey* ou *Lamprey Pel.*

Il paroît, dit M. LINNÆUS, que ce Poiſſon eſt l'Εχενεις, dont parle Oppien *l.* 1. *p.* 9. Galien *Claſſ. II. fol.* 30. parle d'une ſeconde eſpece de *Lamproie* de Mer qu'il a vue à Rome, & dont aucun Auteur Grec n'a parlé, excepté Durion, parceque l'on n'en voit point dans la Mer de Grece. Galien la nomme Γαλεξια.

3. LAMPROIE aveugle, ou LAMPROIE ſans yeux; nommée par Artedi n. 3. *Petromyzon corpore annuloſo, appendicibus utrinque duobus in margine oris*; & par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 274. *Petromyzon pinnâ dor-*

*sali secundâ lineari, labio oris supernè pone lobato.* Willughby *p.* 107. Rai *p.* 36. en parlent sous le nom de *Lamproie aveugle* ou qui n'a pas d'yeux. Les Suedois la nomment *Lin-Aohl.* Ce peut être la *Lamproie de boue* de Schwenkfeld, *Lampetra minima canosa*, qui se trouve dans les Rivieres de Silesie.

Les Latins ont donné le nom de *Lampetra* aux *Lamproies*, parceque ces Poissons lechent les pierres, ce que veut dire le Grec *Petromyzon*, qui vient de πετρος *lapis*, & μυζω ou μυζαω *sugo.*

# ORDRE III.

## POISSONS DONT LES OUIES SONT CACHÉES, Qui n'ont point d'osselets aux nageoires, & dont les branchies sont membraneuses & osseuses.

## *Pisces Branchiostegi,*

*Pinnæ ossiculis carentes, branchiæ membranaceæ vel osseæ.*

### GENRE PREMIER.

Poissons qui ont la tête de la grandeur du corps, des appendices horizontaux tout autour du corps.

1. GALANGA, en Latin *Rana Piscatrix*, Poisson de mer nommé par Artedi *p.* 87. *n.* 1. *Lophius ore cirroso.* Aristote *l.* 9. *c.* 37. *l.* 2. *c.* 13. & *l.* 5. *c.* 5. en parle sous le nom de Αλιας Βατον; *l.* 9. *c.* 37. sous celui de Βατραχος αλιας; *Elien l.* 9. *c.* 24. *l.* 13. *c.* 15. sous celui de Βατραχος αλιευς, & Athenée *l.* 7. *p.* 286. Oppien *l.* 2. *p.* 33. Βατραχος. C'est la *Rana* d'Ovide & de Pline *l.* 9. *c.* 24. & *l.* 25. *c.* 10. la *Rana marina* de Jonston *l.* 1. *c.* 3. la *Rana Piscatrix* de Belon. Rondelet *p.* 363. Salvien *fol.* 139. Gesner *p.* 813. 816. Charleton *p.* 130. Willughby *p.* 85. 86. 8. 88. & de Rai *p.* 29. Gesner & Schoneveld *p.* 59. la nomment *Rana Piscatrix* seu *marina*; & Aldrovande *l.* 3. *c.* 64. *p.* 466. *Rana Piscatrix*

*vulgaris*. En Anglois *The Thoad-Fish*, ou *Frog-Fish*, *Sead-Divel;* en Italien, ſelon Salvien, *Martino Peſcatore.*

2. GUAJACUJA du Bréſil, ſelon Marcgrave & Rai *p.* 30. nommé par Artedi *n.* 2. *Lophius fronte unicorni.* Artedi & M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 41. *n.* 106. & 107. donnent le nom de *Lophius* à ces deux Poiſſons, du Grec Λοφια *pinna*, *eminentia*, parcequ'ils ont les nageoires élevées. Il ont des appendices qui font horizontalement le tour du corps, & la tête eſt plus grande que le corps.

## GENRE II.

Poiſſons qui ont des nageoires au ventre, qui toutes enſemble ont la figure d'un entonnoir.

LUMP des Anglois, *Lumpus Anglorum*, Poiſſon nommé *Cyclopterus* par Artedi & M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 275. *Syſtem. Nat. p.* 41. *n.* 107. du Grec Κυκλος *circulus* & πτερον *pinna*, parceque les nageoires du ventre de ce Poiſſon font un rond. Geſner *Paral.* 1284. Aldrovande *Piſc.* 479. Jonſton *Piſc.* 42. Charleton 131. Willughby *Ichthy.* 208. & Rai *Piſc.* 77. en parlent ſous le nom de *Lumpus Anglorum.* Schoneveld *Ichthy* 41. l'appelle *Lievre marin* de ſon Païs, *Lepus marinus noſtras.* On en parle dans les Voyages de Oelande ſous le nom de *Cyclopterus* ou *Lumpus.* On le nomme en Suedois *Siurygg-Fisk;* en Hilligandois *Haffpodde;* en Hollandois *Snottolff;* en Ecoiſſois *Cockpadd*; en Anglois *The Lump* ou *Sea-owl.* C'eſt une eſpece de Poiſſon rond, *ſpecies Orbis*, commun dans la mer de Bothnie, & qui pulveriſé eſt excellent contre la fiévre tierce, dit M. LINNÆUS *Faun. Suec.* Il marque (*Syſt. Nat.*) que les Nageoires qu'il a au ventre ſont en forme d'entonnoir.

## GENRE III.

Poiſſons ronds, qui n'ont point de nageoires au ventre, dont la peau eſt dure, & couverte d'aiguillons dans pluſieurs. Les uns ont pluſieurs dents quadrangulaires, les autres les ont triangulaires, d'autres n'en ont que quatre, & d'autres n'en n'ont point.

Voici les eſpeces dont Artedi *Genr. p.* 55. & *Spec. p.* 83. & M LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 42. *n.* 108. donnent la notice.

1. La premiere eſpece, nommée *Flaſcopſaro* par Rondelet *p.* 419. eſt nommée par Artedi *Part. V. p.* 83. *n.* 1. *Oſtracion ſphæricus tetraodon, aculeis undique exiguis.* C'eſt l'*Orbis primus* de Rondelet, de Willughby *p.* 143. de Rai *p.* 43. l'*Orbis vulgaris* de Charleton *Onom. p.* 154. d'Aldrovande *l.* 4. *c.* 15. *p.* 554. Geſner *p.* 631. & 744. en parlent. On le nomme à Veniſe *Peſce Colombo.* C'eſt le même dont Pline fait mention *l.* 32. *c.* 2. 11.

2. La ſeconde, nommée par Artedi *n.* 2. *Oſtracion oblongus quadrangulus gibboſus* eſt le même qu'Aldrovande *l.* 4. *c.* 19. *p.* 561. & Jonſton nomment *Oſtracion alter.* L'*Oſtracion alter gibboſus* d'Aldrovande, de Liſter dans Villughby *p.* 156. & le *Piſcis quadrangularis gibboſus* du même Willughby *p.* 20. & de Rai *p.* 44. ſont de la même eſpece.

3. La troiſiéme eſpece, qui eſt de figure ronde, & garnie tout autour de piquants épais, eſt nommée par Artedi *n.* 3. *Oſtracion ſubrotundus, aculeis undique denſis baſi triquetris.* Ce Poiſſon rond piquant eſt nommé *Orbis echinatus ſive muricatus* par Rondelet *l.* 15. *c.* 421. Geſner *p.* 632. 745. Aldrovande *l.* 4. *c.* 17. *p.* 556. Jonſton, Willughby *p.* 144. Rai *p.* 43. Charleton *p.* 154. & Cluſius *Exot. l.* 6. *c.* 23.

4. La quatriéme eſpece, qui eſt la *Lune* ou *Mole* de Rondelet *p.* 424. eſt nommée par Artedi *Oſtracion cathetoplateus ſubrotundus inermis aſper, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in capite*, eſt l'*Orthragoriſcus* de Pline *l.* 32. *c.* 2. 11. dont parle Geſner *p.* 635. la *Luna Piſcis* du même Geſner 640. la *Mola* de Salvien *fol.* 155. de Jonſton, d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 44. *p.* 412. de Charleton *p.* 129. de Willughby *p.* 151. & de Rai p. 51. Les Anglois le nomment *The Sund-fish.*

5. La cinquiéme eſpece, qui eſt le *Suetolt* ou *Bufolt* des Hollandois, eſt nommée par Artedi *n.* 5. *Oſtra-*

*cion oblongus teres aculeatus, osse scutiformi in pectore; tuberculis rotundis.* C'est l'*Orbis scutatus* de Rondelet *l.* 15. *c.* 3. *p.* 420. de Gesner *p.* 632. 745. d'Aldrovande *l.* 4. *c.* 16. *p.* 556. de Jonston, Willughby *p.* 144. de Rai *p.* 43. & de Charleton *p.* 154.

6. La sixiéme, est nommée *Ostracion oblongus quadrangulus, tuberculis quatuor majoribus in dorso.* C'est le même que Rai *p.* 45. nomme *Piscis maximus quadrangularis, id est dorso plano*, & que Willughby *p.* 20. dit être marqué de quatre tubercules peu loin de la tête, *quatuor tuberculis in dorso, non longe à capite, insignitus.* Le premier *Ostracion* d'Aldrovande *l.* 4. *c.* 19. *p.* 560. de Jonston, de Villughby *p.* 148. & l'*Ostracion* du Nil, que Belon & les autres nomment *Holosteus*, ne paroît pas être d'une espece différente.

7. La Septiéme espece, nommée par Artedi *n.* 7. *Ostracion oblongo-quadrangulus, rostro acuto, maculis in dorso ac capite*, est le *Piscis majusculus quadrangularis rostratus*, de Lister, Willughby *p.* 20. & Rai *p.* 45. & l'*Ostracion tertius rostratus* des mêmes Naturalistes paroît être le même Poisson.

8. La huitiéme espece, nommée par Artedi *n.* 8. *Ostracion quadrangulus, maculis variis plurimis*, est le *Piscis mediocris quadrangularis maculosus* de Lister, Willughby *p.* 20. & Rai *p.* 45.

9. La neuviéme espece, nommée *n.* 9, *Ostracion triangulatus, duobus aculeis in fronte, & totidem in imo ventre*, est le *Piscis triangularis cornutus* de Clusius, dit Rai *p.* 44.

10. La dixiéme, nommée *Ostracion triangulatus, aculeis duobus in capite, & unico longiore superne ad caudam*, est le *Piscis triangularis capite cornutus, cui è mediâ caudâ cutaceâ aculeus longus erigitur*, de Lister, Willughby *p.* 19. & Rai *p.* 44.

11. La onziéme espece, nommée *Ostracion triangulatus, limbis figuram hexagonam eminentibus, aculeis duobus in imo ventre*, est le *Piscis triangularis cornibus carens*, disent Willughby *p.* 156. & Rai *p.* 44.

12. La douziéme espece, nommée *Ostracion triangulatus totus maculosus ac tuberculosus, aculeis duobus*

*in imo ventre*, eſt le *Piſcis mediocris triangularis, ad imum ventrem prope caudam tantùm cornutus, ex toto maculis æqualibus ſubrufis densè inſignitus*, de Liſter, de Willughby *p.* 20. & de Rai *p.* 44.

13. La treiziéme, nommée *Oſtracion triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis duobus in imo ventre*, eſt nommée par Willughby & Rai *Piſcis triangulus parvus, non niſi imo ventre cornutus.*

14. La quatorziéme eſpece, nommée *Oſtracion triangulatus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carens*, eſt le *Piſcis triangularis, ex toto cornibus carens*, de Liſter, de Willughby *p.* 20. & de Rai.

15. La quinziéme eſpece, nommée *Oſtracion maculoſus, aculeis undique denſis exiguis*, eſt l'*Orbis aſper maculoſus* de Willughby *p.* 155. & de Rai *p.* 43.

16. La ſeiziéme, nommé *Oſtracion cathetoplateo-oblongus, ventre tantum aculeato & ſubrotundo*, eſt l'*Orbis caudâ productiore, dorſo lævi, ventre ſpinoſo*, de Willughby *p.* 44. & l'*Orbis Lagocephalus* de Grew *Muſ.* & de Rai *p.* 43.

17. La dix-ſeptiéme eſpéce, nommée *Oſtracion bidens ſphæricus, aculeis undique denſis triquetris*, eſt l'*Atinga alter minor orbicularis* de Willughby *p.* 155, & de Rai *p.* 44.

18. La dix-huitiéme eſpece, nommée *Oſtracion ſubrotundus, aculeis brevibus planis, ventre glabro*, eſt l'*Orbis muricatus Ranæ rictu*, nommé *Juamajacu Atinga* par Marcgrave *l.* 4. *c.* 14. Willughby en parle *p.* 145. 155. C'eſt encore l'*Orbis ſpinoſus* de Cluſius *Exot. l.* 6. *c.* 22. & de Rai *p.* 42.

19. La dix-neuviéme eſpece, nommée *Oſtracion ſubrotundus, aculeis undique brevibus triquetris raris*, eſt l'*Orbis muricatus & reticulatus* de Willughby p. 155. & de Rai *p.* 42.

20. La vingtiéme eſpece, nommée *Oſtracion rotundo-oblongus, tuberculis utrinque, pinna dorſi longiſſimæ*, eſt l'*Orbis Ranæ rictu* de Cluſius *Exot. l.* 6. *c.* 25. de Rai *p.* 43.

21. La vingt-uniéme eſpece, nommée *Oſtracion conico-oblongus, aculeis undique longis teretiformibus in*

*primis in lateribus*, est l'*Hystrix Piscis* de Clusius *Exot. l. 6. c.* 21. & de Rai *p.* 42.

22. La vingt-deuxiéme espece, nommée *Ostracion oblongus holocanthus, aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & collo*, est l'*Hystrix alter, capite angusto subrotundo & admodum spinoso, scilicet spinis prælongis in ipso capite & scapulis donatus*, de Willughby *p.* 155. & de Rai *p.* 42.

23. La vingt-troisiéme espece, nommée *Ostracion oblongus glaber, capite longo, corpore figuris variis ornato*, est l'*Orbis oblongus, Testudinis capite*, de Clusius *Exot. l. 6. c.* 26. de Willughby *p.* 147, de Rai *p.* 43. & peutêtre l'*Orbis lævis oblongus, cinereis & fuscis maculis notatus*, de Sloane.

## GENRE IV.

Poissons dont les mâchoires longues ont la figure du bec d'une *Bécasse*, armés de quelques aiguillons forts au dos, & qui ont des dents très-grandes & contigues.

1. GUAPERVA de Marcgrave *l.* 4. *c.* 12. de Jonston, nommé par Artedi *Part. V. n.* 1. *Balistes aculeis dorsi tribus, caudâ bifurcâ.*

2. GUAPERVA long, dont la queue est presque quarrée, & non fourchue, & la tête un peu large, de Lister *Append.* & de Willughby *p.* 21. nommé par Artedi *n.* 2. *Balistes aculeis dorsi duobus, caudâ quadratâ.*

3. GUAPERVA large, à queue fourchue, & qui a une nageoire tachetée sur le dos; selon Artedi, *Balistes caudâ bifurcâ, pinnâ dorsi maculosâ.* C'est le *Guaperva lata, caudâ forcipatâ, pinnâ dorsali maculis quibusdam distinctâ*, de Lister & de Willughby *p.* 21.

4. GUAPERVA large, strié vers la queue, selon Lister *Append. p.* 21. nommé *Balistes lineis striatis, caudâ bifurcâ.*

5. GUAPERVA, nommé *Porc-épic* par Lister & Willughby *p.* 21. *Histrix Guaperva*, & par Artedi *Balistes aculeis quinque in utroque latere.*

6. BECASSE de mer, selon Rondelet *p.* 427. *Scolo-*

*pax*; nommée par Artedi *Baliſtes aculeis binis, loco pinnarum ventralium, & ſolitario infra anum.* Aldrovande *l. 3. c. 13. p.* 298. Willughby *p.* 160. Rai *p.* 50. Geſner *p.* 838. ou plutôt 858. 1008. Jonſton *l. 1. c. 1.* Charleton *Onom. p.* 123. en parlent auſſi ſous le nom de *Scolopax.* Ce peut être, ſelon Geſner, la *Serra* de Pline. On nomme ce Poiſſon *Trombetta* à Genes, & à Rome *Soſſietta.*

Le nom de *Baliſtes*, qu'Artedi & M. LINNÆUS donnent à ce genre de Poiſſons, vient de Βαλλω *ferio, attingo*, frapper, atteindre. Ils ont des dents contigues & très-grandes, & de forts aiguillons ſur le dos.

# ORDRE IV.

## POISSONS A NAGEOIRES ÉPINEUSES.

## *Piſces Acanthopterygii.*

Ces Poiſſons, ſelon M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 43. ont les rayons des nageoires oſſeux, & quelques-uns ſont épineux. *Pinnæ radiis oſſeis, quibuſdam ſpinoſis.*

### GENRE PREMIER.

ARTEDI donne le nom *Sciæna* au Genre de Poiſſons, dont nous allons donner la notice. Ce mot vient du Grec σκια *umbra*, parceque leur couleur eſt obſcure & ſombre. Ils ont les ouuertures des ouies écailleuſes & la nageoire du dos fourchue.

1. OMBRE de mer, *Umbra marina*, nommée par Artedi *p.* 65. *n.* 1. *Sciæna maxillâ ſuperiore longiore, arrosâ in inferiore.* C'eſt le Σκιαινα d'Ariſtote, *l.* 8. *c.* 19. le Σκιαινα d'Elien *l.* 9. *c.* 7. *p.* 517. d'Athenée *l.* 7. *p.* 322. d'Oppien *Hal. p.* 6. *l. IV.* Le *Chromis* de Belon, nommé *Umbra* par Varron, Columelle, le Poëte Ennius, Apulée, Iſidore, Cuba *l.* 3. *c.* 99. Wotton

*l.* 8. *c.* 173. Rondelet *l. V. c.* 9 *p.* 132. Gesner, Willughby *p.* 299. Rai *p.* 95. l'*Umbra marina* de Gesner *p.* 1029. 1230. d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 17. *p.* 81. l'*Umbrina* de Jove *c.* 5. *p.* 48. le *Coracinus* de Salvien *fol.* 116. la *Sciæna* ou *Umbra* de Jonston *l.* 1. *c.* 1. celle de Charleton *p.* 135. & celle de Pline *l.* 9. *c.* 16. peuvent n'être que le même Poisson, auquel les Naturalistes ont donné différens noms, ou des varietés.

11. CORP, nom que Rondelet donne *p.* 128. au *Coracinus niger*, & au *Coracinus albus*, espece d'*Ombre*, qu'Artedi *n.* 2. nomme *Sciæna ex nigro varia, pinnis ventralibus nigerrimis.* C'est le Κορακινος d'Aristote *l.* 5. *c.* 10. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 15. 19. 30. *l.* 9. *c.* 2. d'Elien *l.* 14. *c.* 23. *p.* 833. d'Athenée *l.* 7. *p.* 308. & d'Oppien *Hal. l.* 1. *p.* 6. nommé en Latin *Coracinus* par Pline *l.* 9. *c.* 16. 18. & *l.* 5. *c.* 9. & *l.* 32. *c.* 5. 7. Gesner, Aldrovande *l.* 1. *c.* 15. *p.* 72. 74. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 135. Willughby *p.* 300. Rai *p.* 95. en parlent sous le même nom. Artedi ne sait si le Poisson que l'on nomme à Rome *Ombrino*, & dont Willughby *p.* 300. & Rai *p.* 96. font mention, est de la même espece. Selon le même Ichthyologue, le *Coracinus niger* de Salvien *fol.* 118. & d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 15. & le *Corvo de fortiera* de Salvien *fol.* 117. qui a un pied de long, qui est tout noir, & qui porte un très-grand aiguillon proche de la nageoire de l'anus, sont des especes différentes.

## GENRE II.

Poissons, qui ont l'ouverture des ouies écailleuses, & les dents molaires couvertes. Artedi leur donne le nom de *Sparus*, du Grec σπαιρειν *palpitare, vibrare*, parceque ces Poissons sortis hors de l'eau palpitent & se remuent beaucoup.

1. DORADE, *Aurata*, nommée par Artedi *n.* 14. *p.* 63. *Sparus dorso acutissimo, lineâ arcuatâ aureâ inter oculos.* C'est le Χρυσοφρυς d'Aristote *l.* 1. *c.* 15. *l.* 2. *c.* 17. *l.* 4. *c.* 10. *l.* 5. *c.* 10. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. 13. 15. 19. d'Elien

d'Elien *l.* 13. *c.* 28. *p.* 796. *l.* 11. *c.* 33. *l.* 16. *c.* 12. *p.* 920. d'Athenée *l.* 7. *p.* 328. & *l.* 8. d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. *l.* 3. *f.* 135. Ovide, & Varron *l.* 3. *c.* 3. en parlent ſous le nom de *Chryſophrys ;* les autres Naturaliſtes ſous celui d'*Aurato ;* comme Columelle *l.* 8. *c.* 16. Martial *Epigr. l.* 13. 90. Pline *l.* 9. *c.* 16. *l.* 32. *c.* 541. Cuba *l.* 3. *c.* 4. *fol.* 71. Paul Jove *c.* 11. *p.* 68. Wotton *l.* 8. *c.* 174. Rondelet *l.* 5. *c.* 2. *p.* 115. Salvien, Geſner, Belon, Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 140. Willughby *p.* 307. Rai *p.* 131. Aldrovande *l.* 2. *c.* 15. *p.* 171. nomme ce Poiſſon *Aurata vulgaris* ; les Italiens *Orata ;* les Veniſiens *Ora* ; les Eſpagnols *Dorade* ; les Anglois *Gilt head* ou *Gilt poll.*

2. CANTHENO, en Latin *Cantharus.* Artedi *p.* 58. *n.* 3. nomme ce Poiſſon *Sparus lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argenteâ.* C'eſt le Κανθαρος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 13. & d'Oppien *l.* 1. *p.* 19. le Θαλατλιος d'Elien *l.* 1. *c.* 26. *p.* 34; & le *Cantharus* des Latins. Pline, Belon, Rondelet *l.* 5. *c.* 4. *p.* 120. Geſner *p.* 178. & 211. Aldrovande *l.* 2. *c.* 20. *p.* 186. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 141. Willughby *p.* 309. Rai *p.* 130. ont écrit ſur ce Poiſſon. Gaza a traduit le Grec Καγθαρος par *Scarabæus.*

3. PAGEL, ſelon Rondelet, en Latin *Erythrinus*, nommé par Artedi *p.* 59. *n.* 5. *Sparus totus rubens, iride argentea.* En Grec Ερυθρικος & Ερι θρινος par Ariſtote *l.* 4. *c.* 11. *l.* 6. *c.* 13. & *l.* 8. *c.* 13. Athenée *l.* 7. *c.* 300. Oppien *l.* 1. *Erythinus* par Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 16. 52. & *l.* 32. *c.* 9. 10. & Belon; & *Erythrinus* par Rondelet *l.* 5. *c.* 16. *p.* 144. Geſner *p.* 365. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 311. Rai *p.* 134. Geſner, Salvien, Aldrovande *l.* 2. *c.* 9. *p.* 154. Charleton *p.* 140. le nomment *Rubellio.* On le nomme à Veniſe *Alboro* & *Arboro*, à Genes *Pagro*, à Rome *Frangolino* & *Fragolino.*

4. PAGRE, *Pagrus*, nommé par Artedi *p.* 64. *n.* 15. *Sparus rubeſcens, cute ad radicem pinnarum dorſi & ani in ſinum producta.* C'eſt le Φαγρος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 13. d'Elien *l.* 9. *c.* 7. *p.* 517. *l.* 10. *c.* 19. d'Athenée *l.* 7. *p.* 327. nommé *Pagrus* en Latin par Pline *l.* 9. *c.*

16. *l.* 32. *c.* 10. Cuba *l.* 3. *c.* 66. Belon, Rondelet *p.* 142. Gesner *p.* 656. Aldrovande *l.* 2. *c.* 8. *p.* 151. Willughby *p.* 312. Rai *p.* 131. Jonston *l.* 1. *c.* 1. ont écrit sur ce Poisson, nommé à Genes *Pagro*, en Anglois *Sea Bream.*

5. SYNAGRIDE, ou DENTALE; Poisson nommé par Artedi *p.* 59. *n.* 6. *Sparus varius, dorso acuto, dentibus quatuor majoribus.* C'est le Συναγρις d'Aristote, l. 2. *c.* 13. 15. *l.* 8. *c.* 2. 13. *l.* 9. *c.* 2. nommé Συνοδον par Elien *l.* 1. *c.* 44. *p.* 52. & Συνοδον & Συναγρις par Athenée *l.* 7. *p.* 322. Ovide & Charleton *p.* 140. en parlent sous le nom de *Synodon.* Cuba *l.* 3. *c.* 26. le nomme *Dentrix*, *Dentix*, & *Pagrus.* C'est le *Dentex* de Gaza, de Jove *l.* 12. *p.* 70. de Salvien, d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 12. *p.* 161. le *Synagris* de Rondelet *l.* 5. *c.* 19. *p.* 150. Aldrovande parle d'un autre *Dentex l.* 2. *c.* 17. *p.* 163. Le *Synodon* ou *Dentex* de Jonston *l.* 1. *c.* 1. de Willughby *p.* 312. & de Rai *p.* 134. est de la même espece. On le nomme en Italien *Dentale.*

6. BOGUE & BOGUE RAVEL, nommé par Artedi *p.* 61. *n.* 8. *Sparus lineis utrinque quatuor aureis ac argenteis longitudinalibus parallelis.* C'est le Βωκη d'Aristote, *l.* 9. *c.* 2. le Βωξ d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. d'Athenée *l.* 7. 286. En Latin *Box* & *Boca* par Pline & Jove *c.* 21. *p.* 89. *Voca* par Gaza. Rondelet *p.* 136. & 137. parle de deux especes. Il nomme la premiére simplement *Bogue*, & la seconde *Bogue Ravel.* Gesner *p.* 127. 147. Charleton *p.* 144. Aldrovande *l.* 2. *c.* 41. *p.* 271. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 317. Rai *p.* 135. ont écrit sur ces deux Poissons, qui ne sont que des varietés, étant de la même espece. On la nomme *Boga* à Venise, à Rome, & à Marseille.

7. MENDOLE, ou JUSCLE, Poisson nommé par Artedi *p.* 61. *n.* 9. *Sparus varius, maculâ nigricante in medio latere, dentibus quatuor majoribus;* en Grec par Aristote *l.* 6. *c.* 15. 17. *l.* 8. *c.* 30. *l.* 9. *c.* 2. Oppien *l.* 1. *c.* 5. Athenée *l.* 7. *p.* 313. Μαινις; *Menerela* par Ovide; *Mena* par Pline *l.* 9. *c.* 26. Belon, Rondelet *l.* 5. *c.* 13. *p.* 138. Gesner *p.* 519. & 612. Aldrovande *l.* 2. *c.* 39. *p.* 224. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 144. Willughby *p.*

318. Gaza le nomme *Alec ;* les Venitiens *Menela*, à Rome *Menola*, à Marſeille *Mendole*, à Narbonne *Juſcle*, dit Rondelet.

8. PICAREL, Poiſſon nommé par Artedi *p. 62. n. 10. Sparus maculâ nigrâ in utroque latere medio, pinnis pectoralibus caudâque rubris.* C'eſt le Σμαρις d'Ariſtote *l. 8. c. 30.* d'Oppien *l. 1. p. 5.* En Latin *Smaris* par Ovide, Belon, Rondelet *p. 140.* Geſner, Aldrovande *l. 2. c. 40. p. 228.* Jonſton *l. 1. c. 1.* Willughby *p. 319.* Rai *p. 136.* Il y a le *Maris leucomœnides* de Charleton *pag. 144.* la *Mæna candida* ou *Smaris* de Geſner *p. 522.* & *616.* le *Cerrus* de Pline *l. 32. c. 11.* c'eſt la même eſpece. On le nomme *Giroli* & *Gerruli* à Veniſe ; *Gerres* à Marſeille, dit Rondelet.

9. MORME, nommé par Artedi *p. 62. n. 11. Sparus maxillâ ſuperiore longiore, lineis utrinque duodecim nigris tranſverſis parallelis.* En Grec Μορμυρος par Ariſtote *l. 6. c. 17.* Athenée *l. 7. p. 313.* Euſtathe *f. 1150. 33.* Μορμυλος par Oppien *l. 1. p. 5. l. 2. p. 58.* En Latin *Mormylus* par Salvien ; *Mormyr* par Ovide, Pline *l. 32. c. 11. Mormur* par Gaza ; *Mormyrus* par Belon, Rondelet *l. 5. c. 22. p. 153.* Salvien *f. 184.* Geſner *p. 547.* Aldrovande *l. 2. c. 19. p. 184.* Jonſton *l. 1. tit. 3. c. 1.* Charleton *p. 141.* Willughby *p. 329.* Rai *p. 134.* parlent de ce Poiſſon. On le nomme à Rome *Mormillo*, à Veniſe *Mormiro*, à Marſeille & à Genes *Mormo*, à Narbonne *Morme*, & en Eſpagne *Marmo*, dit Rondelet.

10. CHROMIS, nommé par Artedi *pag. 62. n. 12. Sparus oſſiculo ſecundo pinnarum ventralium in longam ſetam quaſi producto.* C'eſt le Χρεμψ, Χρομις & Χρωμις d'Ariſtote *l. 4. c. 8. 9.* & *l. 5. c. 9.* & *l. 8. c. 19.* Elien *l. 9. c. 7. p. 516.* & *l. 10. c. 11. p. 582.* Athenée *l. 7. p. 328.* parlent de ce poiſſon, & les Latins ſous le nom de *Chromis*, comme Ovide *Hal. v. 121.* Pline *l. 9. c. 16.* Rondelet *l. 5. c. 21. p. 152.* Geſner *pag. 223.* & *264.* Aldrovande *l. 2. c. 14. p. 168.* Jonſton *l. 1. tit. 3. c. 1.* Willughby *p. 330.* Rai *p. 141.* & Charleton ſous le nom de *Cremis p. 140.* On le nom-

me en Toſcane & à Genes *Caſtagnole ;* en Sicile *Monachelle.*

11. ORPHE, Poiſſon, nommé *Sparus varius, maculâ nigrâ ad caudam in extremo æqualem*, par Artedi *p. 63. n.* 13. C'eſt l'Ορφος d'Ariſtote *l.* 5. *c.* 10. *l.* 8. *c.* 13. 15. d'Elien *l.* 5. *c.* 18. *p.* 275. *l.* 12. *c.* 1. d'Oppien *l.* 1. *p.* 6. Athenée *l.* 7. *p.* 315. le nomme Ορφως. Pline *l.* 9. *c.* 16. Rondelet *l.* 5. *c.* 25. *p.* 157. Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. Charleton *p.* 140. parlent de ce Poiſſon ainſi que Willughby *p.* 314. Rai *p.* 133.

Il y a un autre *Orphus* des anciens, dont parle Belon, & Aldrovande d'après lui, *l.* 2. *c.* 11. *p.* 158. Artedi ne ſait s'il eſt de la même eſpece que le précedent, ou d'une eſpece différente.

Tous les Poiſſons du Genre des *Spares* ont les dents rondes. Les ſuivans ont les dents larges.

12. SPARAILLON, Poiſſon nommé par Artedi *p.* 57. *n.* 1. *Sparus unicolor flaveſcens maculâ nigrâ annulari ad caudam.* C'eſt le Pυας d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 8. & *l.* 5. *c.* 11. d'Elien *l.* 9. *c.* 46. le Σπαρος d'Athenée *l.* 7. *c.* 320. d'Oppien *l.* 1. *fol.* 108. 34. d'Euſtathe *fol.* 1720. 41. le *Sparus* de Pline *l.* 32. *c.* 11. de Cuba *l.* 3. *c.* 79. *f.* 88. de Belon, de Rondelet *l.* 5. *c.* 3. *p.* 118. de Salvien *f.* 176. 6. & 177. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 18. *pag.* 182. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. de Charleton *p.* 141. de Willughby *p.* 308. de Rai *p.* 129. On le nomme *Sparo* à Rome.

13. SARGO, Poiſſon nommé par Artedi *p.* 58. *n.* 2. *Sparus lineis tranſverſis varius, maculâ nigrâ inſigni ad caudam.* C'eſt le Σαργος d'Ariſtote *l.* 5. *c.* 9. 11. *l.* 5. *c.* 17. *l.* 7, *c.* 2. d'Elien *l.* 1. *c.* 23. *p.* 29. *l.* 11. *c.* 19. *l.* 13. *c.* 2. d'Oppien *l.* 1. *p.* 19. *l.* 4. *f.* 147. 34. & 148. 47. d'Athenée *l.* 7. *p.* 321. Ennius *Apolog.* Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 17. 51. 59. Jove *p.* 74. Belon, Rondelet *l.* 5. *c.* 5. *p.* 122. Salvien *f.* 178. 6. & 179. & 180. Geſner *p.* 825. Aldrovande *l.* 2. *c.* 16. *p.* 176. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 141. Willughby *pag.* 309. Rai *p.* 130. parlent de ce Poiſſon, qu'on nomme *Sarge* en Italie & à Veniſe.

14. NIGREIL, Poiſſon nommé par Artedi *p.* 58. *n.* 4. *Sparus lineis longitudinalibus varius, maculâ nigrâ utrinque ad caudam.* C'eſt le Μελανυρος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 2. d'Elien *l.* 1. *c.* 41. *p.* 48. & *l.* 12. *c.* 17. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. & *l.* 3. *f.* 139. 37. 38. & d'Athenée *l.* 7. *p.* 313. & *l.* 8. le *Melanurus* d'Ovide, de Columelle *l.* 8. *c.* 16. de Pline *l.* 32. *c.* 11. & 2. de Jove *c.* 24. *p.* 94. de Belon, de Rondelet *l.* 5. *c.* 6. *p.* 126. de Salvien *f.* 181. 182. de Geſner *p.* 540. 638. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 2. *c.* 1. de Charleton *p.* 134. de Willughby *p.* 310. de Rai *p.* 131. & d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 13. *p.* 64. Gaza a traduit le Μελανυρος d'Ariſtote par *Oculata.* On le nomme à Rome *Occhiata*, à Marſeille *Oblada.*

15. SAUPE, nommé par Artedi *p.* 60. *n.* 7. *Sparus lineis utrinque undecim aureis parallellis longitudinalibus.* C'eſt le Σαλπη d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 8. *l.* 5. *c.* 9. 10. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. 13. & *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 9. *c.* 7. *p.* 516. d'Oppien *l.* 1. *p.* 6. d'Athenée *l.* 7. *p.* 320. la *Salpa* d'Ovide, de Pline *l.* 9. *c.* 57. de Cuba *l.* 3. *c.* 78. *f.* 88. 6. de Jove *c.* 14. *p.* 73. de Belon, de Rondelet *l.* 5. *c.* 23. *pag.* 154. de Salvien *f.* 119. & 120. de Geſner *p.* 832. & 979. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 21. *p.* 189. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. de Charleton *p.* 141. de Willughby *p.* 316. & de Rai *p.* 134. On le nomme à Gênes *Sarpa.*

16. A ce Genre de Poiſſons M. LINNÆUS en ajoute une ſeizieme eſpece, qu'il nomme *Sparulus* dans ſon *Syſt. Nat. p.* 43. On en trouve la deſcription dans le *Muſ. Princip.* de ſes *Amœnit. p.* 312. *n.* 44. où il eſt nommé *Sparus faſciis quinque tranſverſis, ſubfuſcis.*

## GENRE III.

Poiſſons auſquels Artedi donne le nom de *Labrus*; parcequ'ils ont les levres grandes & élevées & épaiſſes, dit M. LINNÆUS. La membrane des branchies eſt compoſée de ſix rayons. La nageoire du devant du dos eſt compoſée de rayons doubles, épineux & mous. Ces Poiſſons ont des nageoires au dos, au ventre, à la poitrine, à l'anus, & à la queue.

1. MOLE, Poiſſon nommé par Artedi *Part. III. p.* 33. *n.* 1. *Labrus roſtro ſurſum reflexo, caudâ in extremo circulari.* On le nomme *Tinca marina* à Veniſe ; en Angleterre dans la Province de Cornouaille *The Wraſſe* ou *Old-wife.* C'eſt le Φυκις d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 13. *l.* 8. *c.* 10. d'Oppien *l.* 1. *p.* 6. d'Athenée. *l.* 7. *p.* 319. Pline *l.* 9. *c.* 26. *l.* 32. *c.* 11. a latiniſé le mot Grec. Rondelet *l.* 6. *c.* 10. *p.* 186. Geſner *p.* 718. & 845. Charleton *p.* 133. Aldrovande *l.* 1. *c.* 8. *p.* 43. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. parlent de ce Poiſſon. Gaza a traduit le Grec Φυκις par *Fuca.* C'eſt ſous ce dernier nom que Cuba en fait mention. Artedi marque que ce *Phykis* & la *Tinca marina* ſont le même Poiſſon. Salvien en fait deux Poiſſons différens ſur l'authorité de Rondelet. C'eſt ce qui mérite d'être diſcuté. Willughby *p.* 319. nomme la *Tinca marina*, *Turdus vulgatiſſimus.*

2. VERDONE, nommé par Artedi *Part. III.* 2. *Labrus viridis, lineâ utrinque cæruleâ.* C'eſt le *Turdus viridis minor*, & le *Turdus viridis ſeu decimus* de Rondelet *p.* 179. & Willughby *p.* 320. Il eſt preſque partout de couleur verte, & ne differe de la *Grive* ou *Merle* noir de Salvien, dit Willughby *p.* 310. que par la couleur. Le *Lepas* ou *Pſorus* de Belon, ſelon Willughby *p.* 320. paroît être auſſi de la même eſpece. Il a 16 aiguillons à la nageoire du dos, l'autre en a 18. Sa queue & les nageoires de la poitrine, au rapport de Belon, ſont rondes.

3. PAON, *Pavo*, Poiſſon dont parlent Salvien *f.* 233. Aldrovande *l.* 1. *c.* 4. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 131. nommé par Artedi *Part. V. p.* 55. *n.* 6. *Labrus pulchrè varius, pinnis pectoralibus in extremo rotundis.* C'eſt le *Turdus ſecundus*, *Pavo colore ex viridi cæruleo* de Geſner *p.* 1016. Willughby en parle *p.* 322. & Rai *p.* 137. On le nomme à Rome *Papagallo.* Ce Poiſſon eſt admirablement bien varié de verd, de bleu, de noir, de rouge ; c'eſt ce qui fait que les Naturaliſtes lui ont donné le nom de *Pavo.* Ce Poiſſon eſt la ſeconde eſpece de *Tourd.*

4. TOURD ou GRIVE variée de la grande eſpece, *Turdus major varius*, Poiſſon nommé par Artedi *Part.*

*V. p.* 57. *n.* 10. *Labrus ex flavo & cæruleo varius, dentibus anterioribus majoribus.* Willughby *p.* 322. & Rai *p.* 137. en parlent.

5. TOURD ou GRIVE verte de la grande espece, *Turdus viridis major*, Poisson nommé par Artedi *ibid. n.* 11. *Labrus oblongus viridis, iride luteâ.* Willughby *p.* 222. & Rai *p.* 137. l'appellent *Turdus viridis major.* Celui que les mêmes Auteurs appellent *Turdus oblongus fuscus maculosus*, en est une varieté.

Rondelet donne douze especes de *Tourds*, qu'on appelle, dit-il, *Turdo* en Espagnol. Toutes ces especes ne different que par la couleur. Il appelle la premiere *Tourd.* La seconde est le *Pavo.* La troisieme est nommée à Rome *Minchia di Re.* La quatrieme *Perroquet.* La cinquieme ressemble au *Gonjon jaune*, & s'appelle *Tourd doré.* La sixieme ressemble au précédent. La septieme, qui se retire dans les rochers, se nomme *Cero.* La huitieme, qui n'en differe pas beaucoup, peut avoir le même nom. Rondelet donne le nom de *Gajan*, de *Bille*, & de *Menestrier*, à la neuvieme. La dixieme n'a point de nom particulier. Il appelle *Auriol* la onziéme, que d'autres, dit-il, nomment *Gajan & Durdo.*

6. SCARE de Candie, *Scarus Cretensis*, selon Aldrovande & Rai *p.* 129. le même que le *Turdus viridis Indicus* de Lister *Append.* & de Willughby *p.* 13. nommé par Artedi *Labrus tetraodon virescens, caudâ bifurcâ.*

7. GIRELLA, Poisson nommé par Artedi *Part. V. p.* 53. *Labrus palmaris varius, dentibus duobus majoribus maxillæ superioris.* C'est le Ἰουλις d'Aristote *l.* 9. *c.* 2. d'Athenée *l.* 7. *c.* 304. l'Ἰυλις d'Elien *l.* 2. *c.* 44. *p.* 123. d'Oppien *l.* 1. *p.* 6. & *l.* 2. *fol.* 127. 36. Gaza a traduit ce mot Grec par *Julia.* Pline en parle *l.* 32. *c.* 9. sous le nom de *Julis.* Voyez sur ce Poisson Belon *de aquat.* Rondelet *l.* 6. *c.* 7. *p.* 180. Salvien *f.* 219. Gesner *p.* 464. & 549. Aldrovande *l.* 1. *c.* 7. *p.* 39. Jonston *l.* 1. *c.* 2. Charleton *p.* 133. Willughby *p.* 324. Rai *p.* 138. On le nomme en Italie *Donzellina & Zigurella*, à Venise *Donzella*, à Marseille *Dovella*, à Gênes

*Zigorella*, dans l'Isle de Candie *Afdelles*, à Rome & à Naples *Menchina Dike*, à Rhodes *Zillo*.

8. SERRAN, en Latin *Channa*, Poisson nommé par Artedi *Part. V. p.* 53. *n.* 2. *Labrus maxillâ inferiore longiore, caudâ bifurcâ, lineis utrinque transversis nigris*; nommé en Grec Χαννη par Aristote *l.* 4. *c.* 11. *l.* 6. *c.* 13. *l.* 8. *c.* 2. & 13. Χαννη par Athenée *l.* 7. *p.* 327. Χαννος par Oppien *l.* 1. *p.* 6. Voyez sur ce Poisson Pline *l.* 9. *c.* 52. Salvien *f.* 227. Belon, Gesner, Rondelet *l.* 6. *c.* 9. *p.* 183; Willughby *p.* 327. Rai *p.* 140. Aldrovande *l.* 1. *c.* 10. *p.* 53. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 134. On le nomme *Sopracielo*.

Ce Poisson, selon Artedi, n'est peutêtre que le même ou une varieté du *Sachettus* des Venitiens, qui est le même que celui nommé *Channoidella* par Belon, Rondelet, Willughby *p.* 326. Rai *p.* 139. que l'*Hepatus* de Belon, de Gesner *p.* 411. d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 12. *p.* 58. de Jonston.

9. ANTHIE, Poisson connu des Anciens, & nommé Ανθιας par d'Aristote *l.* 6. *c.* 17. *l.* 9. *c.* 2. & 37. par Elien *l.* 1. *c.* 4. *l.* 8. *c.* 28. *l.* 12. *c.* 47. par Oppien *l.* 1. *p.* 10. par Athenée *l.* 7. *p.* 282. C'est le *Sacer* de Gaza, l'*Anthias* d'Ovide & de Pline *l.* 9. *c.* 58. la premiere espece d'*Anthie* de Rondelet *l.* 6. *c.* 11. *p.* 188. Cet Ichthyologue en donne de quatre especes. Voyez aussi sur ce Poisson Gesner, Aldrovande *l.* 1. *c.* 19. *p.* 88. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 325. Rai *p.* 138. Artedi le nomme *Labrus totus rubescens, caudâ bifurcâ.*

10. SCARE vulgaire, *Scarus vulgaris*, que le Poëte Ennius dans Jove appelle Cerveau de Jupiter, *Cereber Jovis*. Aristote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. *l.* 9. *c.* 37. Elien *l.* 1. *c.* 2. *p.* 5. *l.* 2. *c.* 54. Oppien *l.* 1. *p.* 5. 6. *l.* 2. *p.* 53. Athenée *l.* 7. *p.* 319. le nomment Σκαρος en Grec. Les Latins, de ce mot Grec, ont fait *Scarus*. Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 17. Ambros. *l.* 5. *c.* 5. Cuba *l.* 3. *c.* 31. Aldrovande *l.* 1. *c.* 2. *p.* 7. Willughby *p.* 306. Rai *p.* 129. Rondelet *l.* 6. *c.* 2. Gesner *p.* 830. Jonston *l.* 1. *c.* 1. & les autres, ont écrit sur ce Poisson. Artedi le nomme *Labrus, qui Scarus auctorum.*

11. SCARE varié, *Scarus varius.* Artedi le nomme *Labrus ex purpureo viridi cæruleo & nigro varius.* C'eſt la ſeconde eſpece de *Scare* de Rondelet *l. 6. c. 3. p.* 169. Geſner *p.* 832. Aldrovande *l.* 1. *c.* 2. *p.* 6. Jonſton Willughby *p.* 306. Rai *p.* 129. ont écrit ſur ce Poiſſon.

12. MERLE de Mer, nommé par Artedi *Part. V. p.* 55. *n.* 7. *Labrus cæruleo nigricans.* C'eſt le Κοττυφος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 15. d'Athenée *l.* 7. *f.* 152. d'Oppien *l.* 1. *p.* 19. & *l.* 4. le Κοσυφος d'Elien *l.* 1. *c.* 14. le *Merula* des Latins, comme de Columelle *l.* 8. *c.* 16. d'Ovide, de Pline *l.* 9. *c.* 15. & *l.* 32. *c.* 11. d'Ambroſ. *l.* 5. *c.* 2. *p.* 52. de Rondelet *l.* 6. *c.* 5. *p.* 172. Willughby & Rai l'appellent *Turdus niger.* Sa couleur n'eſt pas rouge, mais d'un bleu noir, dit Salvien.

13. CANUS, ſelon Rondelet, en Latin *Cinædus*, Poiſſon nommé par Artedi *Part. V. p.* 56. *n.* 8. *Labrus luteus, dorſo purpureo, pinnâ a capite ad caudam continuâ.* Il eſt nommé Αλφηστα par Athenée *l.* 7. *p.* 281. *Cinædus* par Pline, Rondelet *l.* 6. *c.* 4. *p.* 170. Aldrovande *l.* 1. *c.* 14. *p.* 67. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. & *Alpheſtes cinædus* par Charleton *n.* 135. Willughby *p.* 323. Rai *p.* 137.

14. SOLDAT, *Miles*, Poiſſon dont M. LINNÆUS donne la notice *Syſt. Nat. édit.* 6. *p.* 44. *n.* 112-14.

15. JAQUACARE, autre Poiſſon du même Genre, dont M. LINNÆUS donne la notice *Syſt. Nat. ibid.* C'eſt un Poiſſon du Breſil, nommé dans les *Amænitates* de cet Auteur *Muſ. Princ. p.* 313. *n.* 45. *Labrus roſtro reflexo, faſciis lateralibus tribus fuſcis.* M. KLEIN en parle dans ſon quatrieme *Miſſus p.* 37. On en voit la figure à la *Tab.* 10. *n.* 4.

16. LABRE, Poiſſon nommé dans les *Amænitates ibid. n.* 46. *Labrus roſtro reflexo, ocello purpureo, iride alba juxta caudam.* M. KLEIN en parle dans ſon quatrieme *Miſſus p.* 38. & on en voit la figure à la *Tab.* 11. *n.* 5. C'eſt le *Klip-viſch* ou *Soldaten-viſch* de Willughby *Ichth.* 1. *Tab.* 5. *f.* 4. & de Rai *Synop. meth. Piſc. p.* 151. & le *Piſcis militaris* de Ruyſch *Theat. Anim. Tom. I. Tab.* 2. 3. C'eſt un des meilleurs Poiſſons des Indes. La chair en eſt blanche, ferme, ſaine, & de bon goût, & il

a beaucoup de choſes qui le font reſſembler à l'*Orphus*, au *Spare*, au *Sargus*, au *Menadurus*, qui ſont tous Poiſſons du même Genre. C'eſt une autre eſpece que celui nommé ci-deſſus *Miles*.

17. LABRE, nommé dans les *Amœnitates n.* 47. *Labrus immaculatus, pinnæ dorſalis radiis ſpinoſis decem.*

18. On trouve dans le même Ouvrage *n.* 48. un autre Poiſſon, nommé par le même Auteur *Labrus oblongus, pinnæ dorſalis unico radio inermi.*

## GENRE IV.

Poiſſons dont la membrane des ouies eſt compoſée de ſix oſſelets, dont le front va en pente, & qui ont les nageoires du ventre garnies de deux rayons. Les Naturaliſtes donnent à ces Poiſſons le nom de *Blennius*, mot qui vient du Grec βλεννα, *mucus* ou *ignavus*, parceque ce Genre de Poiſſon eſt baveux. *Mucoſus Piſcis*, dit Artedi *Nom. Gen. p.* 71.

1. MESORO, nom qu'on donne à Rome, dit Salvien, à un Poiſſon nommé par Artedi *Part V. p.* 44. *n.* 1. *Blennius ſulco inter oculos, maculâ magnâ in pinnâ dorſi.* C'eſt le Βελεννος d'Athenée *l.* 7. *p.* 288. Poiſſon ſemblable au *Goujon*; le Βλεννος d'Oppien *l.* 1. *fol.* 108. Pline *l.* 32. *c.* 9. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Geſner *p.* 126. Aldrovande *l.* 2. *c.* 28. Willughby *p.* 131. Rai *p.* 72. &c. en parlent, Pline ſous le nom de *Blennius*, & les autres ſous le nom de *Blennus*. Les Anglois le nomment *The Butter Fly-fiſch*. Le *Belennus* de Rondelet paroît être un autre Poiſſon.

2. GATTORUGINE, nom qu'on donne à Veniſe à un Poiſſon qui, ſelon Willughby *p.* 132. approche beaucoup des *Alouettes* de Mer de Rondelet, qui reſſemble beaucoup au premier *Exocet* de Belon, ſi ce n'eſt pas le même, & qui peut être le *Piſcis Gutturoſus* de Geſner, Poiſſon qui a une groſſe gorge. Rai parle de ce Poiſſon *Synop. meth. Piſc. p.* 72. Artedi *ibid. n.* 2. le nomme *Blennius pinnulis duabus ad oculos pinnâ ani oſſiculorum viginti trium.*

3. PERCE-PIERRE, Poiſſon nommé par Artedi *Ib. n.* 4. *Blennius maxillâ ſuperiore longiore, capite ſummo acuminato.* C'eſt l'*Alauda non criſtata* de Rondelet *l.* 6. *c.* 22. *p.* 205, d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 25. *p.* 114. de Jonſton *l.* 1. *c.* 2. de Charleton *p.* 137. de Willughby *p.* 133. de Rai *p.* 73. On le nomme à Livourne *Galeetto*; & les Anglois dans la Province de Cornouaille *Mulgranoe and Bulcard.*

4. COQUILLADE, Poiſſon nommé par Artedi *n.* 3. *Blennius criſtâ capitis tranſverſâ cutaceâ.* C'eſt la *Galerita Alauda* de Rondelet *l.* 6. *c.* 21. *p.* 204. d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 25. *p.* 114. de Charleton *p.* 137. de Rai *p.* 73. de Willughby *p.* 134. & des autres.

5. BUTTER-FISH des Anglois, en Latin *Gunnellus*, ſelon Willughby *p.* 115. & Rai *p.* 144. nommé par Artedi *n.* 5. *Blennius maculis circiter decem nigris, limbo albicante utrinque ad pinnam dorſalem.*

6. LUMPEN, nom qu'on donne à Anvers à un Poiſſon nommé *Muſtela* par Willughby *p.* 120. & Rai *p.* 140 par Artedi *Ibid. n.* 6. *Blennius cirris ſub gulâ pinniformibus quaſi bifidis, aureolis dorſi tranſverſis.* Une autre *Muſtela vulgaris*, nommée auſſi *Galea* par Geſner, en eſt une varieté.

7. BLENNE de Mer vivipare de Schoneveld, Poiſſon dont parle auſſi Willughby *p.* 122. & *p.* 69. nommé par Artedi *n.* 7. *Blennius capite dorſoque fuſco flaveſcente, lituris nigris, pinnâ ani flavâ.*

M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 44. *n.* 113.-8. & 9. parle d'une huitieme & neuvieme eſpece de *Blenne*, & dans les *Amœnitates Muſ. Princ. p.* 316. *n.* 49. & 50. il en donne la deſcription. Il nomme la premiere *Blennius pinnis ocularibus ſubulatis, pinna ani oſſiculorum XXVI.* Elle approche beaucoup du *Gattorugine* des Venitiens. Il nomme la ſeconde *Blennius pinnis ocularibus breviſſimis palmatis, lineâ laterali curvâ.*

## GENRE V.

Ce Genre de Poiſſon eſt mis par Artedi *Part. III. p.* 25. & *Part. V. p.* 42. dans l'Ordre des Poiſſons

Malacopteres à nageoires molles. M. LINNÆUS *Syst. Nat. p.* 44. *n.* 114. les met dans celui des Poiſſons à nageoires épineuſes. Ils ont la membrane des ouies compoſée de cinq oſſelets, le corps long & rond, & trois nageoires.

1. DONZELLE. C'eſt le nom que Rondelet *l.* 14. *c.* 2. *p.* 397. donne à la premiere eſpece. C'eſt l'*Ophidiom* de Pline *l.* 32. *c.* 9. Geſner, Aldrovande *l.* 3 *c.* 26. *p.* 353. Jonſton *l.* 1. *c.* 2. Willughby *p.* 112. Rai 38. Belon & les autres, en font mention. C'eſt un petit Poiſſon, ſelon Pline, ſemblable au *Congre*. Artedi *Part. V. p.* 42. *n.* 1. le nomme *Ophidion citris quatuor in maxillâ inferiore*, Ophidion qui a quatre barbillons à la mâchoire inférieure.

2. Autre eſpece de DONZELLE, dont parle auſſi Rondelet *ibid. p.* 398. qui n'a point de barbillons, & nommée par Artedi *Ophidion cirris carens*. C'eſt l'*Ophidion flavum & imberbe* de Willughby *p.* 113. de Rai *p.* 39. de Schoneveld *p.* 53. que les Hilligandois nomment *Nügnogen*. Il ſe trouve dans la Mer Baltique.

3. Troiſiéme Eſpece, dont parle Artedi, *Part. III. p.* 25. *n.* IX. Ce Poiſſon, dit-il, a le corps oblong & rond, & il eſt fourni de trois nageoires.

## GENRE VI.

Poiſſons, ſelon M. LINNÆUS, *Syſtêm. Nat. édit. 6. p.* 45. *n.* 115. qui ont quatre ou cinq oſſelets à la membrane des branchies ou ouïes, dont les dents ſont contiguës & flexibles, les levres mobiles, & qui ont des nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue. Les Naturaliſtes leur ont donné le nom de *Chætodon*, du Grec χαιτα, en Latin *ſeta*, ſoie, & οδους, *dens*, dent, parceque ces Poiſſons ont les dents flexibles comme de la ſoie.

1. PARU du Breſil, dont parlent Marcgrave & Rai, *p.* 102. & nommé par Artedi, *part. V. pag.* 79. *n.* 1. *Chætodon niger, maculis flavis lunulatis varius.*

2. ACARAUNA du Breſil, ſelon Marcgrave & Rai,

*p.* 102. nommé par Artedi, *ibid. n.* 2. *Chætodon caudâ bifurcâ, aculeo in utroque latere ad caudam.*

3. VETULA, selon M. LINNÆUS. Willughby, *p.* 217. en fait mention sous le nom d'*Acarauna quadrata*, & il dit que les Matelots le nomment *Retula*. Artedi, *ibid. n.* 3. l'appelle *Chætodon quadratus, spinulis multis ad caput.*

4. Petit ACARAUNA noir, qui a quelques bandes jaunes sur le corps, disent Lister Willughby, *p.* 23. & Rai *p.* 103. nommé par Artedi, *ibid. n.* 4. *Chætodon niger, capite diacantho, lineis utrinque quatuor, transversis, curvis.* Le *Guarerva* du Brésil, dont parlent Marcgrave & Rai, *p.* 103. differe à peine du précédent, dit Artedi *part. III. p.* 52. *n.* 4.

5. Cette cinquiéme espece, selon Artedi *part. V. p.* 79. *n.* 5. a la queue fourchue & des piquants de chaque côté. Il le nomme *Chætodon lineis longitudinalibus varius, caudâ bifurcâ, utrinque aculeatâ.*

6. Cette sixiéme espece, qui a le corps noir, la queue blanche, & des piquants de chaque côté, est nommée par le même *Chætodon nigrescens, caudâ albescente æquali, utrinque aculeatâ.*

7. La septiéme espece, qui a le troisiéme os de la nageoire du dos, très-long, & deux courts piquants au-dessus des yeux, est nommée par le même *ibid. n.* 7. *Chætodon aculeis duobus brevibus supra oculos, ossiculo tertio pinnæ dorsalis longissimo.*

8. La huitieme espece est nommée par le même *ibid. n.* 8. *Chætodon canescens, aculeo utrinque ad os, ossiculo tertio pinnæ dorsalis setiformi longissimo.*

9. La neuvieme, que le même Auteur *ibid.* 3. nomme *Chætodon macrolepidotus, lineis utrinque duabus nigris, ossiculo quarto pinnæ dorsalis setiformi longissimo.* Ruysch *Theat. Anim. p.* 1. *t.* 1. *f.* 1. le nomme en Hollandois *de Tafelfisch.*

10. Cette dixieme espece est nommée par le même Artedi *ibid. n.* 9. *Chætodon macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris latis, lineâ quartâ in caudâ.*

M. LINNÆUS *Syst. Nat. édit.* 6. *p.* 45. en donne une onzieme espece.

## GENRE VII.

Poiſſon, qui a ſix os courbes à la membrane des ouies, & la tête toute couverte d'écailles. Les Naturaliſtes le nomment *Mugil*, comme qui diroit *Agil*, parceque ce Poiſſon eſt très-agile, dit Artedi *Nom. Gen. p. 73.*

Ce Genre de Poiſſon ne contient qu'une eſpece, nommée *Cabot* par Rondelet *l. 9. c. 2. p. 260.* C'eſt le Κεφαλος d'Ariſtote *l. 5. c. 11. l. 6. c. 17. l. 8. c. 2. 19.* d'Elien *l. 1. c. 3. p. 7. l. 13. c. 19.* d'Oppien *l. 1. p. 5.* le Κεστρεος ou Κεστρεα d'Elien *l. 7. c. 19. l. 13. c. 19.* le Κεστρευς d'Ariſtote *l. 2. c. 17. l. 4. c. 8. 10. l. 5. c. 5. 9. & ſuiv. l. 6. c. 13. 15. 17. l. 8. c. 2. 13. 19. 30.* & d'Athenée *l. 7. 306. l. 1. p. 4. l. 3. p. 86.* Oppien *l. 1. p. 5. l. 2. p. 53.* le nomme auſſi Κεστρεα. Entre les Latins les uns le nomment *Capito*, ou *Cephalus*, du Grec, parcequ'il a une groſſe tête, & les autres *Mugil*, à cauſe de ſon agilité. Ceux qui ont écrit ſur ce Poiſſon, ſous le nom de *Cephalus*, ſont Paul Jove *c. 10. p. 66.* Ambroſ. *Lexi. l. 5. c. 10. p. 57.* Geſner *p. 549.* & *684.* Belon, & les autres; les ſuivans en parlent ſous le nom de *Mugil*, ſavoir Ovide, Pline *l. 9. 15. 17.* Cuba *l. 3. c. 55.* Wotton *l. 8. c. 179.* Jonſton *l. 2. c. 4.* Aldrovande *l. 4. c. 6. p. 508.* Willughby *p. 274.* Rai *p. 84.* Charleton *p. 151.* & Salvien *f. 75.* On le nomme à Rome *Cephalo*, & en Angleterre *Mullet*, dit Artedi. S'il n'y en a qu'une eſpece, il y en a pluſieurs varietés. La figure qu'en donne Salvien, eſt exacte.

## GENRE VIII.

Poiſſons dont les os des branchies ne ſont point paralleles, qui ont le corps ſerré & des écailles rudes. Les Naturaliſtes leur ont donné le nom de *Zeus*, terme que l'on trouve dans Pline, & dont on ignore l'étymologie.

1. DORÉE, ou *Poiſſon de St. Pierre*, nommé par Ar-

tedi *Part. V. p.* 78. *n.* 1. *Zeus ventre aculeato, caudâ in extremo circinatâ.* C'eſt le Κυπρίος d'Athenée *l.* 7. *fol.* 164, qu'il nomme auſſi Χαλκεύς *l.* 7. *fol.* 163. ainſi qu'Oppien *l.* 1. *fol.* 6. 17. C'eſt le *Zeus* & *Faber* de Pline *l.* 9. *c.* 18. *l.* 32. *c.* 11. Paul Jove *c.* 27. *p.* 98. le nomme *Citula* ou *Poiſſon de S. Pierre.* Rondelet *l.* 11. *c.* 19. *p.* 308. Geſner *p.* 369. 439. Willughby *p.* 294. Rai *p.* 99. en parlent ſous le nom de *Faber*, ou *Gallus marinus.* On peut encore conſulter Columelle *l.* 8. *c.* 16. Wotton *l.* 8. *c.* 181. Salvien *fol.* 203. Geſner, Aldrovande *l.* 1. *c.* 25. *p.* 112. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 136. en parlent ſous le nom de *Faber.* Les Anglois, comme les François, le nomment *Dorée*, les Eſpagnols *Gal*; à Rome *Citulo*, *Peſce ſan Pietro*; à Genes *Rotula*; à Veniſe *Fabro.*

2. ABACATUXIA, ou ABACATUAIA, ſelon Jonſton *l.* 4. *c.* 1. Poiſſon du Bréſil, nommé par Artedi *n.* 2. *Zeus caudâ bifurcâ.* C'eſt le *Gallus marinus*, ou *Faber Indicus* de Willughby *app. p.* 33. le *Peixe Gallo* des Portugais, l'*Ican Kapelle* des Hollandois ſelon Ruyſch *Theat. Anim. p.* 16. *t.* 9. *f.* 7. Voyez Marcgrave *l.* 4. *c.* 11. Willughby *p.* 295. Rai *p.* 99.

3. SANGLIER, Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 3. *Zeus totus rubens, caudâ æqualis, roſtro ſurſum reflexo.* C'eſt le Καπρος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 13. *l.* 4. *c.* 9. d'Athenée *l.* 8. *c.* 331. l'*Aper* de Gaza, de Rondelet *l.* 5. *c.* 27. *p.* 161. de Charleton *p.* 123. de Geſner, d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 12. *p.* 297. de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. de Willughby *p.* 296. & de Rai *p.* 99. On le nomme *Riondo* à Rome, & *Strivale* à Genes.

## GENRE IX.

Genre de Poiſſon nommé *Callichthys*, qui a trois rayons à la membrane des ouies, dont le corps eſt ſeulement couvert d'un double rang d'écailles de chaque côté.

Ce Poiſſon eſt unique de ſon eſpece, ſelon M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 45. *n.* 118. Il en donne la deſcription dans le *Muſ. Princ.* de ſes *Amœnitates Tom.*

*I. p.* 317. *n.* 51. C'eſt le *Tamoata* du Breſil, & le *Soldigo* des Portugais. Voyez ſur ce Poiſſon Marcgrave; Hiſtoire du Breſil, *p.* 150. *Tab.* 150. Willughby *Ich. p.* 211. *Tab.* 3. *fig.* 6. Rai *Synop. Piſc. p.* 78. M. LINNÆUS en donne auſſi la figure dans le Tome cité de ſes *Amœnitates Tab.* 11. *n.* 1.

Il y a la *Fiatola* de Rome, nommée auſſi *Lampuga* & *Licette* à Veniſe, qu'Artedi *Part. V. p.* 33. nomme *Stromateus*, & qui eſt le *Callichthys* de Belon : mais ce Poiſſon eſt dans l'ordre des Poiſſons à nageoires molles, *Piſces Malacopterygii.*

## GENRE X.

Poiſſons qui ont ſept oſſelets à la membrane des ouies, & des appendices articulés aux nageoires de la poitrine. Artedi *Part. V.* 71. & *Gen. Piſc.* 32. en donne la notice ſous le nom de *Trigla.*

1. MULET, Poiſſon nommé par Artedi *Part. V. p.* 71. *n.* 1. *Trigla capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore.* C'eſt le Τριγλα d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 4. *c.* 11. *l.* 5. *c.* 9. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. 13. *l.* 9. *c.* 2. 37. le Τριγλη d'Elien *l.* 2. *c.* 41. *p.* 118. *l.* 9. *c.* 51. 65. *p.* 557. & *l.* 90. *c.* 2. d'Athenée *l.* 7. *p.* 324. 325. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5, 6. Les Latins, comme Ovide, Columelle *l.* 8. *c.* 17. Pline *l.* 9. c. 17 18. 51. & *l.* 32. *c.* 10, 11. Seneque *Natur. quæſt. l.* 7. *Epit.* 96. Martial *l.* 15. Ciceron *Parad.* 48. Horace *l.* 2. Juvenal *Sat.* 4. Macrobe *Saturnale l.* 3. *c.* 16. Gaza, Wotton *l.* 8. *c.* 169. *fol.* 151. Paul Jove *l.* 18. *p.* 83. Salvien *fol.* 235. 236. Schoneveld *p.* 47. Jonſton, Rai *p.* 90. Cuba *l.* 3. *c.* 60. Varron de *Re ruſtic. l.* 3. *c.* 17. Rondelet *l.* 10. *c.* 4. *p.* 290. Geſner *p.* 565. 667. & Aldrovande *l.* 2. *c.* 1. *p.* 131. en parlent ſous le nom de *Mullus.* Le *Mullus minor*, & le *Mullus barbatus*, que Rondelet nomme *Surmullet*, ne ſont que des varietés. Cet Auteur donne *l.* 10. *c.* 5. & 6. deux autres eſpeces de *Surmullets.* Il nomme l'un *Surmullet imbriaco*, à cauſe de ſa couleur rouge comme de la brique : l'autre *Surmulet*

*mulet Cavillone*, parceque, dit-il, il a la figure d'une clef de bois, qu'on nomme *caville* en Languedoc. Le Poiſſon ſuivant eſt d'une eſpece différente.

1. SURMULET, Poiſſon ainſi nommé en France, & en Angleterre, dit Artedi, *ibid. n.* 2. qui l'appelle *Trigla capite glabro, lineis utrinque quatuor luteis, longitudinalibus, parallelis.* Salvien *fol.* 236. *l.* 32. 34. *fol.* 235. *fig.* 95. eſt le premier qui a donné la deſcription de ce Poiſſon ſous le nom de *Mullus major*, & après lui Aldrovande *l.* 2. *c.* 1. *p.* 123. Jonſton, Willughby *p.* 285. Rai *p.* 91.

3. ROI DES MULETS. Il y a apparence que c'eſt le *Surmulet imbriaco* de Rondelet. Artedi *ibid. n.* 3. le nomme *Trigla capite glabro; tota rubens, cirris carens.* C'eſt le *Mulet* ſans barbillons, ou *Roi des Mulets*, de Willughby *p.* 286. *Mullus imberbis, ſive Rex mullorum.* On le nomme à Malte *Re di Triglia.*

4. CORBEAU de mer, ou HIRONDELLE de mer, Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 4. *Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales.* C'eſt le Κοραξ d'Athenée *l.* 8. *fol.* 177. 29, 32. 33. la premiére eſpece d'*Hirondelle* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 3. *p.* 136. l'*Hirondelle* de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 280. Rai *p.* 88. le *Corbeau* de Pline *l.* 32. *c.* 11. d'Iſidore *l.* 12. *c.* 6. de Salvien *fol.* 194. 195. Les Anglois dans la Province de Cornouaille le nomment *The Tub-Fish*; à Rome on le nomme *Capone.* M. LINNÆUS parle de ce Poiſſon *Faun. Suec. n.* 281. & dit qu'on le nomme en Suedois *Knorrhane*, & en Scánie *Knodina*, qu'il habite dans la Mer Occidentale, & que c'eſt l'*Hirondelle* de mer d'Aldrovande, de Jonſton, de Willughby & de Rai.

5. MILAN de mer, nommé par Artedi *ibid. n.* 5. *Trigla roſtro parum bifido, linea laterali ad caudam bifurca.* C'eſt le *Milvus* ou *Milvago* de Pline, dont Rondelet *l.* 10. *c.* 8. *p.* 297. Aldrovande *l.* 2. *c.* 58. *p.* 276. parlent ſous le nom de *Milvus*, Willughby & Rai ſous celui de *Lucerna*, Salvien ſous celui de *Cuculus.* On le nomme *Lucerna* à Veniſe, *Cocco* à Naples & en Sicile, *Organo* à Genes, *Galline* à Marſeille.

M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 46. fait du *Milvus*, du *Lucerna* & du *Cuculus*, trois eſpeces différentes.

6. HIRONDELLE de mer, ſelon Rondelet *l.* 10. *c.* 1. *p.* 254. Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 4. *Trigla capite parum aculeato, pinnula ſingulari ad pinnas pectorales.* C'eſt le Χελιδων d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 9. d'Elien *l.* 2. *c.* 50. *p.* 129. *l.* 9. *c.* 52. *l.* 12. *c.* 59. d'Oppien *l.* 2. *p.* 46. Artedi met ſous le même titre l'Ιερακ d'Elien *l.* 12. *c.* 59. d'Athenée *l.* 8. *fol.* 177. & l'Ιουξ d'Oppien *l.* 1. *fol.* 113. 53. le *Milvago* de Pline *l.* 32. *c.* 2. le *Milvus*, dont parle le même Naturaliſte *l.* 9. *c.* 26. 27. ainſi que Belon, Salvien, Aldrovande *l.* 2. *c.* 5. *pag.* 141. ou 124. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 283. Rai *p.* 89. l'*Hirundo* de Rondelet, de *Gillius* dans Elien, la *Lucerna* de Pline *l.* 9. *c.* 27. *l.* 32. *c.* 11. & le *Parabele* de Marcgrave, ne ſont que le même Poiſſon volant, à quelques varietés près. Il eſt nommé en Eſpagne *Volodor*, à Rome *Rondire*, à Malte & en Sicile *Falcone*, en Suede *Flygande-fisk*. Cette *Hirondelle de mer* eſt différente de celle ci-deſſus *n.* 4. que Rondelet nomme *Corbeau* de mer. Artedi obſerve que l'*Accipiter marinus* d'Elien *l.* 9. *c.* 52. appartient peutêtre à cette eſpece de Poiſſon.

7. MORRUDE, ou ROUGET, ſelon Rondelet *l.* 10. *c.* 2. *p.* 287. Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 7. *Trigla tota rubens, roſtro parùm bicorni, operculis branchiarum ſtriatis.* C'eſt le Κοκκυξ d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 9. *l.* 8. *c.* 13. d'Elien *l.* 10. *c.* 11. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. d'Athenée *l.* 7. *p.* 309. Gaza, Rondelet, Geſner, Aldrovande *l.* 2. *c.* 4. *p.* 139. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 89. Rai *p.* 89. en parlent ſous le nom de *Cuculus.* Belon fait mention d'un *Cuculus minor*; Schoneveld *p.* 32, d'un *Cuculus*, eſpece de *Lyra*, & Charleton *p.* 139. Ce peuvent être des varietés. Paul Jove *c.* 16. *p.* 76. appelle la *Morrude*, *Capo*; les Hollandois *Hunchem*, les Hilliglandois *Se hehanen*, les Anglois *The red Garnad*, ou *Rotchet.*

8. GURNARD des Anglois, en Latin *Gornatus* ou *Gurnatus griſeus*, ſelon Willughby *p.* 279. & Rai *p.* 88. Poiſſon, qui eſt une eſpece de *Cuculus*, dit Char-

leton *Onom. p.* 139. il eſt nommé par Artedi *ibid. n.* 8. *Trigla varia, roſtro diacantho, oculis geminis ad utrumque oculum.*

9. ROUGET, à cauſe de ſa couleur rouge; ou GRONEAU, parcequ'il grogne, comme les Porcs, dit Rondelet *l.* 10. *c.* 9. *p.* 298. Poiſſon nommé par Artedi *ibid.* n. 9. *Trigla roſtro longo diacantho, naribus tubuloſis.* C'eſt le Λυρα d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 9. le *Capo* de Paul Jove *c.* 16. *p.* 76. la *Lyra* de Rondelet, de Geſner, de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. la *Lyra prior* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 7. *p.* 146. de Willughby *p.* 282. de Rai *p.* 89. On le nomme, dit Artedi, dans la Province de Cornouaille *The Piper*; à Genes *Organie.*

10. MALARMAT, ſelon Rondelet *l.* 10. *c.* 10. *pag.* 299. Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 10. *Trigla cirris plurimis, corpore octagono.* C'eſt la ſeconde eſpece de *Lyra* de Rondelet, Aldrovande *l.* 2. *c.* 7. *p.* 147. de Willughby *p.* 283. de Rai *p.* 89. nommé auſſi par les mêmes *Cornuta ſive Lyra altera.* C'eſt le *Coccyx alter* ou *major* de Belon. On nomme ce Poiſſon à Rome *Peſce capone, Piſce forca.*

## GENRE XI.

Poiſſons qui ont ſept oſſelets à la membrane des ouies, & des éminences aux côtés de la queue. Artedi & M. LINNÆUS en parlent ſous le nom de *Scomber.*

1. MAQUEREAU, Poiſſon nommé par Artedi *Scomber pinnulis quinque in extremo dorſo, polypterygio, aculeo, brevi ad anum.* C'eſt le Σκομβρος d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 12. 13. *l.* 9. *c.* 2. d'Elien *l.* 14. *c.* 1. *p.* 738. d'Athenée *l.* 3. *p.* 121. *l.* 7. *p.* 321. d'Oppien *l.* 1. *Halieut. fol.* 108. 109. & *l.* 3. On le nomme en Latin *Scomber.* Voyez ſur ce Poiſſon Columelle *l.* 8. *c.* 17. Pline *l.* 3. *c.* 15. *l.* 32. *c.* 11. *l.* 31. *c.* 8. Belon, Rondelet *l.* 8. *c.* 7. *p.* 234. Geſner *p.* 841. Schoneveld *p.* 66. Aldrovande *l.* 2. *c.* 53. *p.* 270. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Willughby *p.* 181. Rai *p.* 58. Charleton *pag.* 147. Paul Jove *c.* 19. *p.* 86. 87. Wotton *l.* 8. *c.* 188.

*p.* 166. & Salvien *p.* 239. Les Suedois & les Danois le nomment *Makrill*, les Anglois *Makrel*, les Allemands *Macarell*. A Rome *Macarello*, à Veniſe *Scombro*, à Naples *Lacerto*, à Marſeille *Auriol*, & en Eſpagne *Corallo*.

2. THON, Poiſſon nommé par Artedi, *Scomber pinnulis octo vel novem in extremo dorſo ex ſulco ad pinnas ventrales.* C'eſt le Θυννος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 13. *l.* 4. *c.* 10. *l.* 5. *c.* 11. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. 12. 13. 15. 19. 30. *l.* 9. *c.* 2. d'Elien *l.* 9. *c.* 42. *p.* 549. *l.* 15. *c.* 13. 16. 27. *l.* 15. *c.* 3. 5. 6. d'Athenée *l.* 7. *p.* 301. 302. 303. 319. d'Oppien *l.* 2. *Hat.* *p.* 48. Gaza l'a traduit par *Thunnus*, nom qu'ont conſervé Aldrovande *l.* 3. *c.* 18. *p.* 313. Jonſton *l.* 1. *c.* 2. Charleton *p.* 124. Geſner *p.* 957. 967. 1148. Rai *p.* 57. Schoneveld *p.* 75. Pline *l.* 9. *c.* 15. le nomme *Thynnus*, & après lui Cuba *l.* 3. *c.* 96. Paul Jove *c.* 9. *p.* 52. Wotton *l.* 8. *c.* 186. & Willughby *p.* 176.

Le Ορκυνος d'Elien *l.* 1. *p.* 40. d'Oppien *l.* 1. *p.* 8. *l.* 2. *p.* 59. & d'Athenée *l.* 7. *p.* 301. 315. eſt une varieté. Pline *l.* 32. *c.* 11. Geſner *p.* 962. Aldrovande *l.* 3. *c.* 18. *p.* 314. Jonſton, en parlent ſous le nom Latin *Orcynus*. Salvien *fol.* 123. l'appelle *Limoſa*.

Le Πηλαμις d'Ariſtote *l.* 5. *c.* 9. 10. *l.* 8. *c.* 13. *l.* 9. *c.* 2. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. d'Athenée *l.* 7. *p.* 319. & le Πηλαμυς d'Elien *l.* 15. *c.* 10. *p.* 877. eſt le jeune *Thon*, dit Artedi. Pline *l.* 9. *c.* 15. & Belon, en parlent ſous le nom de *Pelamis*, ainſi que Willughby *p.* 180. & Rai *p.* 58. *n.* 2. Aldrovande *l.* 3. *c.* 18. *p.* 315. & Jonſton ſous celui de *Pelamis cærulea*.

Artedi met de la même eſpece le Χορδυλος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 2. d'Athenée *l.* 7. *p.* 306. que Pline *l.* 9. *c.* 15. & Gaza ont traduit par *Cordyla*. Les Anglois nomment le *Thon Tunny-Fish* ou *Spanish makreil*. Rondelet *l.* 8. *c.* 10. & 11. parle du *Thon Pelamyde*, nommé auſſi *Orcynus*, & de la vraie *Pelamyde*, qui eſt, dit-il, le *Thon* d'Ariſtote. L'*Orcynus*, dit-il, eſt le *Grand Thon*.

3. SCIEUREL. Poiſſon nommé par Artedi *Scomber lineâ laterali aculeatâ, pinnâ ani oſſiculorum triginta.* C'eſt le Σαυρις d'Ariſtote *l.* 9. *c.* 2. le Τραχυρος d'Elien

*l.* 13. *c.* 27. *p.* 795. *l.* 11. *c.* 50. d'Athenée *l.* 7. *pag.* 326. le *Saurus* de Paul Jove *c.* 19. *p.* 86. de Salvien *fol.* 79. le *Trachurus* de Rondelet *l.* 8. *c.* 6. *p.* 233. de Schoneveld *p.* 75. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 52. *p.* 268. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Charleton *p.* 143. de Willughby *p.* 290. de Rai *p.* 92. On le nomme *Sauro* à Rome ; *The Horſe Makrel* en Anglois, *Müſchen* en Allemand.

4. BONITE, nom que Rondelet *l.* 8. *c.* 9. *p.* 238. donne à l'Αμια d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. *l.* 4. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 2. 13. 19. *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 16. *c.* 12. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. *l.* 2. *p.* 59. d'Athenée *l.* 4. *p.* 135. *l.* 7. *p.* 277. dont parlent auſſi Pline *l.* 9. *c.* 15. Geſner, Aldrovande *l.* 3. *c.* 20. *p.* 327. Jonſton *l.* 1. *c.* 2. Salvien *fol.* 121., 122. Willughby *p.* 296. Cuba *l.* 3. *c.* 43. Artedi *Part. V. p.* 51. *n.* 4. nomme ce Poiſſon *Scomber dorſo dipterygio, oſſiculo ultimo pinnæ ſecundæ dorſalis prælongo* ; & il comprend ſous le même titre le Τρωκτης d'Elien *l.* 1. *c.* 5. *p.* 9. le Γλαυκος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 13. 15. 30. d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. d'Athenée *l.* 7. *p.* 295. 296. dont Pline *l.* 9. *c.* 16. parle ſous le nom de *Glaucus* ; Cuba *l.* 3. *c.* 38. 39. Aldrovande *l.* 3. *c.* 16. *p.* 303. Rai *p.* 93. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. On le nomme à Rome & à Livourne *Leccia*, dit Artedi. Rondelet *l.* 8. *c.* 16. *p.* 252. donne le nom de *Derbio* au *Glaucus*. Il y a le *Glaucos* d'Elien, qui eſt une eſpece de *Squale*, ſelon la remarque d'Artedi.

5. DERBIO. C'en eſt une eſpece différente du précédent, qui peut être la premiére ou ſeconde eſpece de Rondelet. Willughby en parle *p.* 34. C'eſt le *Glaucus primus* de Rai *p.* 94. Artedi *Part. V. p.* 51. *n.* 5. le nomme *Scomber dorſo dipterygio, oſſiculo ſecundo pinnæ dorſalis ſecundæ altiſſimo.*

6. SPET, Poiſſon qui eſt le Σφυραια d'Ariſtote *l.* 9. *c.* 2. d'Elien *l.* 1. *c.* 33. *p.* 40. d'Athenée *l.* 7. *p.* 323. d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. *l.* 2. *pag.* 58. En Latin *Sphyræna*. Rondelet *l.* 8. *c.* 1. & 2. *p.* 224. donne deux eſpeces de *Spet*. Geſner *p.* 882. 1059. Willughby *p.* 273. Aldrovande *l.* 1. *c.* 21. *p.* 102. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Rai *p.* 84. parlent de ce Poiſſon, nommé *Sudis* par Warron

*l.* 4. Pline *l.* 32. *c.* 11. Wotton *l.* 8. *c.* 166. On le nomme à Livourne *Luzzo marino.*

## GENRE XII.

Poiſſons qui ont cinq oſſelets à la membrane des ouies, & les nageoires du ventre de la figure d'un entonnoir.

1. BOULEROT noir ou GOUJON, nom que Rondelet *l.* 6. *c.* 17. *p.* 200. donne au Κωβιος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 6. *c.* 13. *l.* 8. *c.* 2. 13. 19. *l.* 9. *c.* 2. 37. d'Elien *l.* 2. *c.* 50. d'Athenée *l.* 7. *c.* 309. d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. *l.* 2. *p.* 46. C'eſt le *Gobio* & *Gobius niger marinus* de Pline *l.* 9. *c.* 57. Columelle *l.* 8. *c.* 17. Paul Jove *c.* 22. *p.* 90. Salvien *fol.* 214. Belon, Geſner *p.* 393. Aldrovande *l.* 1. *c.* 20. *p.* 97. Willughby *p.* 206. Rai *p.* 76. Schoneveld *p.* 36. Charleton *p.* 135. On le nomme à Veniſe *Go* ou *Goget*; à Genes *Zolero*; en Anglois *Sea Gudgeon.* Athenée parle de *Goujons* noirs, blancs & jaunes. Ce Poiſſon eſt nommé par Artedi *Gobius ex nigricante varius, pinnâ dorſi ſecundâ oſſiculorum quatuordecim.*

2. Autre eſpece de BOULEROT ou de GOUJON de mer, nommé par Artedi *Part. V. p.* 46. *n.* 2. *Gobius lineâ luteâ tranſverſâ in ſummo pinnæ dorſalis primæ.* Rondelet *l.* 6. *c.* 16. *p.* 195. Belon, Geſner *p.* 393. Aldrovande *l.* 1. *c.* 20. *p.* 96. Willughby *p.* 207. Rai, & les autres, en parlent. C'eſt le *Paganello* des Venitiens.

3. BOULEROT blanc, ſelon Rondelet *l.* 6. *c.* 18. *p.* 200. nommé par Artedi *ibid. n.* 4. *Gobius pinnâ ventrali cæruleâ; oſſiculis pinnæ dorſalis primæ ſupra membranam aſſurgentibus.* C'eſt le Κωβιος λευκος d'Ariſtote *l.* 9. *c.* 37. Κωβιος λευκοτερος d'Athenée *l.* 7. *p.* 309. le *Gobio albus* de Geſner *p.* 396. d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 20. *p.* 97. de Willughby *p.* 207. de Rai *p.* 76. le *Jozo* de Salvien *fol.* 213.

4 APHYS, GOUJON, ſelon Rondelet *l.* 7. *c.* 3. *p.* 210.

nommé par Artedi *ibid. n.* 4. *Gobius Aphya* & *Marsio dictus.* C'eſt le Κωβιτης d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 15. l'Αφυα Κωβιτις d'Athenée *l.* 7. *p.* 284. & 285. L'*Aphya Cobitis* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 29. *p.* 211. de Willughby *p.* 207. de Belon, Geſner, Jonſton *l.* 1. *c.* 1. C'eſt, dit Aldrovande *l.* 2. *c.* 38. *p.* 213. le *Pignoteli* ou *Marſione* des Venitiens.

## GENRE XIII.

Poiſſon qui a huit oſſelets à la membrane des ouies, le bout du muſeau en forme d'épée. Il a des nageoires au ventre, au dos, à la poitrine, à l'anus, & à la queue.

Ce Poiſſon, ſeul de ſon eſpece, eſt nommé EMPEREUR, EPÉE, ESPADON. M. Anderſon le met dans le Genre des Baleines. C'eſt le ξιφιας d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 13. 15. *l.* 8. *c.* 19. d'Athenée *l.* 7. *p.* 314. d'Elien *l.* 9. *c.* 40. *p.* 548. *l.* 14. *c.* 23. d'Oppien *l.* 1. *p.* 8. *l.* 2. *p.* 48. Ovide, Pline *l.* 32. *c.* 2. 11. Wotton *l.* 8. *c.* 189. *fol.* 167. Jonſton, Charleton *p.* 124. en parlent ſous le nom de *Xiphias.* Cuba *l.* 3. *c.* 105. *fol.* 94. ſous celui de *Zifius.* Voyez auſſi ſur ce Poiſſon Willughby *p.* 101. Rai *p.* 52. Schoneveld *p.* 35. Pline *l.* 9. *c.* 15. le nomme *Gladius*, ainſi qu'Ambroſ. *Lex. l.* 15. *c.* 10. *p.* 59. Cuba *l.* 3. *c.* 39. *fo.* 80. Salvien *fol.* 126. Aldrovande *l.* 3. *c.* 21. *p.* 332. On le nomme en Suedois *Sward-fish*; en Anglois *Sword-fish*; en Italien *Peſce ſpada*; à Genes *Emperador.* Le *Guebucu* du Breſil, dont parle Marcgrave, eſt un Poiſſon de la même eſpece. On en voit dans la Mer Baltique, mais il y eſt rare, M. LINNÆUS en parle *Syſtem. Nat. edit.* 6. *p.* 47. *n.* 122. & *Faun. Suec. p.* 108. *n.* 288.

## GENRE XIV.

Poiſſon qui a quatre oſſelets à la membrane des ouies. Les premieres arrêtes des nageoires de la poitrine ſont dentelées. Il a la tête ſerrée, & des barbillons à la bouche.

ASPREDO, Poiſſon ainſi nommé par M. LINNÆUS, qui en donne la deſcription dans le Tome I. de ſes *Amœnitates Muſ. Princ. p.* 311. *n.* 43. & la figure *T.* II. *n.* 5. Ce Naturaliſte marque que pour la figure, & peutêtre pour le Genre, il reſſemble à ces Poiſſons du Breſil, decrits ſous le nom de *Bague* par Marcgrave, Piſon, Willughby, Jonſton & les autres. Ce Poiſſon eſt ſingulier par ſes arrêtes, qui ſont très-fortes, & les nageoires de ſa Poitrine, qui ſont mobiles.

## GENRE XV.

Poiſſons qui ont la membrane des ouies garnies de ſix oſſelets, le corps large & couvert d'aiguillons. Les Naturaliſtes leur donnent le nom de *Cottus*, qui vient du Grec Κοττη *caput*, parceque leur tête eſt très-groſſe à proportion de leur corps.

1. GOUJON de Riviere, nommé auſſi CHABOT, par Artedi *Part. V. p.* 76. *n.* 1. *Cottus alepidotus glaber, capite diacantho.* C'eſt le Βοττος d'Ariſtote ou Κοττος, *l.* 4. *c.* 8. le *Cottus* de Gaza, Belon, Rondelet *Part.* 2. *p.* 202. Geſner *p.* 400. 477. Aldrovande *l.* 5. *c.* 27. C'eſt auſſi le *Cottus* ou *Gobio fluviatilis capitatus* de Geſner *p.* 401. Cuba *l.* 3. *c.* 38. Willughby *p.* 137. Rai *p.* 76. Aldrovande *l.* 5. *c.* 28. *p.* 613. Jonſton *l.* 3. *c.* 10. Charleton *p.* 157. On le nomme en Suédois *Sten-ſimpa*, *Sten-laKe*; en Anglois *A Bull-head*, ou *Millers Tumb*; à Rome *Meſſore* & *Capo groſſo.* M. LINNÆUS en parle dans ſa *Fauna Suec. n.* 279.

2. GOUJON de Riviere, qui a quatre groſſeurs en forme de cornes au milieu de la tête, & que les Suedois nomment *Horn-ſimpa*; nommé par Artedi *ibid. n.* 2. *Cottus ſcaber, tuberibus quatuor coniformibus in medio capite*; & par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 278. *Cottus verrucis capitis quatuor oſſeis.*

3. SCORPION marin, Poiſſon nommé par Artedi *ibid. n.* 3. *Cottus alepidotus, capite polyacantho, maxillâ ſuperiore paulo longiore.* C'eſt le *Scorpio marinus* de Schoneveld & de Jonſton, dont parlent auſſi Wil-

lughby *p.* 138. Rai *p.* 145. Aldrovande *l.* 2. *c.* 27. On le nomme en Suedois *Rot-ſimpa*, *Skrabba*, *Skialryta* ; *Ulk* & *Ulka* en Danois ; *Potshoeſt* en Hollandois ; dans la Province de Cornouaille en Angleterre *Father-lasher*. Ce Poiſſon eſt commun dans la mer occidentale. M. LINNÆUS en parle dans ſa *Faunâ Suecicâ. n.* 280.

4. POGGE de la partie Septentrionale d'Angleterre, nomme par Artedi *ibid. n.* 5. *Cottus cirris plurimis, corpore octagono.* C'eſt le *Cataphractus* de Schoneveld *p.* 30. Jonſton *l.* 1. *c.* 9. Charleton *Onom. pag.* 152. Willughby *p.* 121. Rai *p.* 77.

5. DRAGONCULE, ou LÉZARD de mer, ſelon Rondelet *l.* 10. *c.* 12. *p.* 304. nommé par Artedi *ibid. n.* 4. *Cottus pinnâ ſecundâ dorſi albâ.* C'eſt le *Dracunculus* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 51. *p.* 262. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Willughby *p.* 136. de Rai *p.* 79. Le *Dracunculus Aranei ſpecies altera*, & l'*Exocœti tertium genus* de Geſner, ſont la même eſpece de Poiſſon.

## GENRE XVI.

Poiſſons qui ont ſept oſſelets à la membrane des ouies, les yeux voiſins l'un de l'autre, couverts de la même peau, & la tête grande & chargée de piquants.

1. SCORPENO, ſelon Rondelet *l.* 6. *c.* 19. *p.* 201. nommé par Artedi *Genr.* 33. & *Syn. p.* 75. *Scorpæna pinnulis ad oculos & nares.* C'eſt le Σκορπιος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 17. *l.* 5. *c.* 9. 10. *l.* 8. *c.* 13. il nomme la femelle Σορπις. Athenée *l.* 7. *c.* 320. Oppien *l.* 1. *p.* 7. *l.* 2. *p.* 46. en parlent ſous le nom de Σκορπιος. C'eſt le *Scorpius* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 24. *p.* 196. de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. de Willughby *p.* 331. de Rai *p.* 142. de Paul Jove *c.* 2. *p.* 91. Salvien *fol.* 201. Paul Jove *c.* 13, *p.* 91. Pline *l.* 32. *c.* 11. en parlent ſous le nom de *Scorpæna.* Cuba *l.* 3. *c.* 85. *fol.* 90. Wotton *l.* 8. *c.* 178. Geſner *p.* 847. ſous le nom de *Scorpio*, & Charleton

ſous celui de *Scorpides*. On le nomme à Rome *Scrofanello*, dit Salvien.

2. SCORPENO, du triple ou du quadruple plus grand que le précedent, dit Artedi *Genre XXXIII. n.* 2. & nommé par le même *ibid.* & *Synon. p.* 76. *Scorpæna tota rubens, cirris plurimis ad os.* C'eſt le *Scorpius major* de Geſner *p.* 846. Willughby *p.* 331. Rai *p.* 142. Salvien *fol.* 199 200. & Charleton *p.* 142. On le nomme à Rome *Scrofano*, à Marſeille *Scorpena*.

## GENRE XVII.

Poiſſons qui ont ſix oſſelets à la membrane des ouies, les yeux voiſins l'un de l'autre, placés ſur le haut de la tête, & ce qui couvre les ouies eſt garni d'aiguillons. Les Naturaliſtes donnent à ces Poiſſons le nom de *Trachinus*, du Grec τραχεινος *aſper*, *Scaber*, parceque les arrêtes de la nageoire du dos ſont rudes & pointues.

1. DRAGON de Mer, ARAIGNE de Mer ou VIVE, Poiſſon nommé par Artedi *Genre XXXI.* & *Synon. p.* 70. *Trachinus maxillâ inferiore longiore, cirris deſtitutâ.* C'eſt le Δρακων d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 13. d'Elien *l.* 2. *c.* 50. d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. *l.* 2. *p.* 46. le Φαλατλιον d'Elien *l.* 11. *c.* 41. *l.* 14. *c.* 12. *p.* 816. le *Draco marinus* de Pline *l.* 9. *c.* 17. d'Iſidore, Belon, Wotton *l.* 8. *c.* 178. *f.* 158. Salvien *fol.* 71. Rondelet *l.* 10. *c.* 11. *p.* 300. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 50. *p.* 256. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 146. Les Naturaliſtes, comme Rondelet, Geſner, Willughby *p.* 288. Rai *p.* 91. Pline *l.* 9. *c.* 48. Charleton *p.* 149. lui donnent auſſi le nom d'*Araneus*. Un autre *Araneus* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 50. *p.* 258. un *Araneus* ou *Draco marinus* de Schoneveld *p.* 16. un autre nommé *Aranea* par Iſidore *l.* 12. *c.* 6. Cuba *l.* 3. *c.* 3. *fol.* 71. un *Trachurus* de Jove *c.* 19. *p.* 86. ne ſont que des varietés. Le *Draco major* de Geſner, & peutêtre tous ceux dont parle Aldrovande *l.* 2. *c.* 50. & auſſi une autre eſpece d'*Araigne* de Mer, ou de *Dragon marin* de Willughby *p.* 289. & de Rai *p.* 92. appartiennent

à la même eſpece. Les Suedois & les Danois nomment ce Poiſſon *Fiarſing*, les Hilligandois *Schwertfiſch*, les les Anglois *Waver*, les François *Vive*, & les Italiens *Peſce ragno.*

2. RASPECON ou TAPECON, ſelon Rondelet *l.* 10. *c.* 13. *p.* 305. Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 71. *Trachinus cirris multis in maxillâ inferiore.* C'eſt le Καλλιωνυμος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. *l.* 8. *c.* 13. le Καλλυωνυμος d'Elien *l.* 13. *c.* 4. *p.* 753. l'Ουρανοσκοπος d'Athenée *l.* 7. *f.* 142. l'Αγνος d'Athenée *l.* 8. *fol.* 177. & l'Εμεροκοιτης d'Oppien *l.* 2. p. 37. Pline *l.* 32. *c.* 7. en parle ſous le nom d'*Uranoſcopos.* Cuba *l.* 3. *c.* 101. *fol.* 93. Salvien *fol.* 296. Aldrovande *l.* 2. *c.* 51. *p.* 265. Jonſton *l.* 1. *c.* 3. Rai *pag.* 97. ſous celui d'*Uranoſcopus.* Charleton *pag.* 147. l'appelle *Uranoſcopus* ou *Cæliſpeculator.* Pline *l.* 32. *c.* 11. *Callyonymus*, & après lui Geſner *p.* 135. 158. Willughby *p.* 287. Gaza le nomme beau Poiſſon, *Pulcher Piſcis.* A Rome *Meſoro*; à Veniſe *Lucerne*, *Peſce prete*, & *Bocca in capo.*

3. LYRA, Poiſſon nommé dans la *Faunâ Suecicâ* de M. LINNÆUS *p.* 106. *n.* 283. *Trachinus maxillâ ſuperiore longiore, pinnâ dorſali priori altiſſimâ*; par M. Gronovius dans les Actes d'Upſal 1740. *p.* 121. *Tab.* 8. *Cottus oſſiculo pinnæ dorſalis primo longitudine corporis*; par Petitvert *Garz. Tab.* 22. *fig.* 2. *Lyra Harvicenſis, pinnâ dorſali longiſſimâ, maculis cæruleſcentibus.* M. LINNÆUS dit que ce Poiſſon eſt très-rare. On en a pris un en 1743. dans le détroit d'Oreſund, proche de Borſebœck. On ignore, dit ce Savant, le Genre de ce Poiſſon; ceux qui en ont écrit n'ayant parlé ni du Genre, ni de la premiere membrane qui couvre les ouies.

Le même Naturaliſte donne dans ſon *Syſt. Nat. p.* 48. la notice d'un Poiſſon qu'il met du même Genre. Il le nomme *Trachinus capite inermi, maxillâ inferiore longiore*, & dans ſes *Amœnitates Muſ. Princ. Tom. I. p.* 311. *n.* 42. il parle d'un autre, qu'il nomme *Trachinus capite inermi nudo, pinnis pectoralibus adunatis.* Comme ces deux Poiſſons ont les yeux placés proche

l'un de l'autre, M. LINNÆUS les met dans ce Genre, quoique leur tête soit sans aiguillons.

## GENRE XVIII.

Poissons qui ont sept osselets à la membrane des ouies, & une ou deux nageoires au dos. Les Naturalistes leur donnent le nom de *Perca*, du Grec περκος, parcequ'ils ont sur la peau des taches noires.

1. PERCHE de riviere, nommée par Artedi *Genre XXX. & Synop. p. 66. Perca lineis utrinque sex transversis nigris.* C'est le Περκη d'Aristote *l. 6. c.* 14. d'Elien *l.* 14. *c.* 23. *&* 26. d'Athenée *l. 7. p.* 319. Pline *l.* 31. *c.* 9. 10. Ausone *v.* 115. Cuba *l.* 3. *c.* 66. Rondelet *Part. II. p.* 196. & 197. Wotton *l.* 8. Salvien *f.* 224. Gesner *p.* 698. Willughby *p.* 291. Rai *p.* 97. en parlent sous le nom de *Perca*, & de *Perca flaviatilis.* Il y a une grande *Perche* de riviere, *Perca flaviatilis major*, dont fait mention Aldrovande *l.* 5. *c.* 33. *p.* 622. Schoneveld *p.* 55. Jonston *l.* 3. *c.* 1. Charleton *p.* 161. Les Suedois nomment ce Poisson *Abbor*, les Danois *Aborn*, les Allemands *Barff* & *Bersich*, les Anglois *Peark*, les Italiens *Persego.*

2. BROCHET-PERCHE, ou *Nagmaul* des Allemands, Poisson nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 285. *Perca pinnis dorsalibus distinctis, secundâ radiis viginti tribus;* par Artedi *Genre XXXIX. Espec.* 76. *Perca pallidè maculosa, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus.* Gesner *Paral.* 28. 1288. Schoneveld *Ichth.* 43. Willughby *Ichth.* 293. Rai *Pisc.* 98. le Comte de Marsilly *Danub.* 4. *p.* 9. *Tab.* 22. *f.* 2. en parlent sous le nom de *Lucio-Perca.* Aldrovande *Ichth.* 667. Jonston *Pisc.* 174. Charleton *Onom.* 164. en font mention sous le nom de *Schilus* & *Nagemulus.* On en pêche dans les grands Lacs d'Uplande, de Westmannie, de Sudermannie, &c. En Pomeranie & ailleurs on le nomme *Sandat*, en Baviere *Nagmaul*, à Ausbourg *Schindel*, en Suede *Gios.*

3. APRON, selon Rondelet *Part. II. p.* 207. Poisson nommé par Artedi *Genre III. Synon. 67. Perea lineis utrinque octo vel novem transversis nigris.* C'est un petit Poisson, nommé en Latin *Asper* par les Naturalistes, semblable au *Goujon*, disent Gesner *p.* 403. 478. *Paral. p.* 19. & Aldrovande *l.* 5. *c.* 28. *p.* 616. Voyez sur ce Poisson Jonston *l.* 3. *c.* 11. Charleton *p.* 157. Willughby *p.* 294. Rai *p.* 98. On le nomme *Apron* à Lion, & *Strever* à Ratisbone.

4. Petite PERCHE de riviere, ou BUFFE des Anglois, Poisson nommé par Artedi *Perca dorso monopterygio, capite cavernoso*, Esp. 80. C'est le Χοιρος ποταμιος d'Athenée *l.* 8. *c.* 331. le Χοιρος d'Elien *l.* 14. *c.* 23. *p.* 833. nommé *Cernua fluviatilis* par Belon, Gesner *p.* 191. 192. 226. Willughby *p.* 334. Rai *p.* 144. Charleton *p.* 158. Tragus, dans une Lettre à Gesner, le nomme *Aurata fluviatilis.* Voyez sur ce Poisson Schoneveld *p.* 56. Aldrovande *l.* 5. *c.* 34. *p.* 624. 626. Jonston *l.* 3. *c.* 2. On le nomme en Suedois *Giers*; en Danois *Horch*; en Allemand *Kaul harss Stuerbanss* & *Stuer*; en Hollandois *Posch*, *Post*; en Anglois *Ruffe.*

Il y a un Poisson du Danube qui n'est qu'une varieté de cette espece. Les Allemands le nomment *Schrollen* ou *Schroll*, & *Schrolln* à Ratisbone. Voyez sur ce Poisson Gesner, Aldrovande *l.* 5. *c.* 35. *p.* 627. Jonston *l.* 3. *c.* 3. Charleton *p.* 161. Willughby *p.* 335. Rai *p.* 143.

5. SCHRAITSER de Ratisbone, selon Willughby *p.* 335. Rai *p.* 144. Artedi *Synon. p.* 68. nomme ce Poisson *Perca dorso monopterygio, lineis utrinque longitudinalibus nigris.* Ce Poisson a à la nageoire du dos trente osselets ou arrêtes, dont dix-huit sont pointues.

6. PERCHE ds Mer, nommée par Artedi *Genr.* 6. & *Synon.* 68. *Perca lineis utrinque septem tranversis, nigris, ductibus miniaceis caruleisque in capite & antica ventris.* C'est le Περκη d'Aristote *l.* 2. *c.* 13. 17. *l.* 8. *c.* 15. d'Athenée *l.* 7. *fol.* 159. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. En Latin *Perca*, *Perca pelagia*, *Perca marina*; à Rome *Percia.* Voyez sur ce Poisson Pline *l.* 9. *c.* 16. Jove *c.* 24. *p.* 92. Rondelet *l.* 6. *c.* 8. *p.* 182. Salvien *fol.* 224. 225.

Belon, Gesner *p.* 696. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 134. Willughby *p.* 327. Rai *p.* 140.

Aldrovande *l.* 1. *c.* 9. *p.* 47. 48. 49. parle de trois especes de *Perche* de mer, qui ne different de celle-ci que par la couleur, & qui ne sont que des varietés.

7. LUBIN, Poisson de Mer, nommé par Artedi *Genr.* 7. *Synon.* 69. *Perca radiis pinnæ dorsalis secundæ tredecim, ani quatuor.* C'est le Λαβραξ d'Aristote *l.* 1. *c.* 5. *l.* 4. *c.* 8. l. 5. *c.* 9. 10. d'Elien *l.* 1. *c.* 30. *p.* 36. *l.* 9. *c.* 7. *l.* 10. *c.* 2. *l.* 16, *c.* 12. d'Athenée *l.* 7. *p.* 310. 311. *l.* 14. *p.* 662. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. *l.* 2. *c.* 34. 58. C'est le *Lupus* d'Ovide, de Varron *l.* 3. *c.* 3. de Pline *l.* 9. *c.* 16. 17. 51. 54. *l.* 32. *c.* 2. de Macrobe *Saturnal. l.* 3. *c.* 16. d'Ambros. *Hexam. l.* 5. *c.* 23. *p.* 52. de Gaza, Cajus Figula, Wotton *l.* 8. *c.* 172. Belon, Salvien, Gesner *p.* 506. Aldrovande *l.* 4. *c.* 2. *p.* 491. Jonston *l.* 2. *c.* 2. Willughby *p.* 271. Rai *p.* 83. Aldrovande *l.* 4. *c.* 2. *p.* 491. l'appelle *Lupus vulgaris*; Isidore & Cuba *l.* 3. *c.* 53. *Lupus marinus*; Paul Jove *c.* 9. *p.* 64. *Spigola* ou *Lupus*; le Poete Lucius *Cahllo*; à Rome *Spigola*; à Venise *Bronchini*; en Toscane *Araneo*; en Espagne *Lupo.*

## GENRE XIX.

Poissons, qui ont trois osselets ou arrêtes à la membrane des ouies, & le bas ventre couvert de lames osseuses. Les Naturalistes leur donnent le nom de *Gasteroſteus*, du Grec γασηρ *venter*, ventre, & οστεον, os, parceque ces Poissons ont la plus grande partie du ventre osseuse.

1. ORCHERE, Poisson nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 276. Artedi *Genr.* 52. *Synony.* 80. *Espec.* 26. *Gasteroſteus aculeis in dorso tribus.* Rondelet *part.* 2. *p.* 206. le nomme *Piscicali aculeati prius genus*; Gesner *Pisc.* 8. *Piscículus aculeatus, primum genus*; Aldrovande *Ichth.* 628. *Pungitius Piscis*; Jonston *Pisc.*

146. *Pungitius*; Willughby *p.* 341. Rai *p.* 145. *Piſciculus aculeatus.* Les Suedois le nomment *Spigg*; ils en pêchent dans les Lacs d'Uplande. Les Anglois, *Stecklebak*, *Banstikle*, ou *Sharpling.*

2. Autre eſpece d'ORCHERE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. p.* 77. Artedi *Genr.* 52. *Synon.* 80. *Eſpec.* 97. *Gaſteroſteus aculeis in dorſo decem.* Les mêmes Naturaliſtes, ci-deſſus cités en font mention. Voyez Rondelet *part. II. p.* 206. Geſner *Piſc.* 8. Aldrovande *Ichth.* 628. Jonſton *Piſc. Tab.* 22. Willughby *Ichth.* 342. Rai *Piſc.* 145. On en pêche dans les ruiſſeaux d'Uplande, de la Laponie, & ailleurs. Les Suedois le nomment *Benunge*; les Anglois *The leſſer Sticklebak*, *Banſtikle*, ou *Sparling.*

3. Troiſiéme eſpece d'ORCHERE, nommé par Artedi *Genr.* 3. & *Synon. p.* 81. *Gaſteroſteus aculeis in dorſo quindecim.* C'eſt un Poiſſon de Mer, nommé par Schoneveld *p.* 10. Willughby *p.* 340. Rai *p.* 145. *Aculeatus* vel *Pungitius marinus longus*, *Aculeatus marinus major.* Les Allemands le nomment *Steinbicker*, & les Hilliglandois *Erſſkpaper.*

# ORDRE V.

*Poiſſons à nageoires molles*, Piſces Malacopterygii. *Les rayons des nageoires de ces Poiſſons ſont oſſeux, dit M. LINNÆUS & ces rayons ou arrêtes ſont ſans force, & ne font point de mal.*

## GENRE PREMIER.

POiſſons qui ont trois oſſelets à la membrane des ouies, & des dents ſeulement placées à l'orifice du ventricule, des Nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue. Les naturaliſtes leur donnent le nom de *Cyprinus*, du Grec Κυπρος, Venus, dit Artedi; car ces Poiſſons ſont très-féconds.

1. VERON, Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 23. *Cyprinus tridactylus, varius, oblongus, teretiuſculus, pinnâ ani oſſiculorum octo.* C'eſt le Φοξινος d'Ariſtote *l. 6. c.* 13. le *Phoxinus* de Wotton *l.* 8. *c.* 190. de Gaza, de Belon, d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 10. *p.* 582. Geſner *p.* 715. Charleton *p.* 160. Schoneveld *p.* 57. Aldrovande *l. ibid.* Jonſton *l.* 3. *c.* 2. Willughby *p.* 258. Rai *p.* 125. parlent d'un *Phoxinus lævis*, Poiſſon de la même eſpece, ainſi que le *Piſciculus varius* de Rondelet *Part. II. c.* 29. *p.* 205. On le nomme en Allemand *Elritz*, *Elderitze*; en Anglois *Pink*, ou *Minim*, ou *Minow*; en Italie *Sanguinerola*; à Rome *Morelle.*

2. BARBEAU, Poiſſon nommé par Artedi *Genr. II. Synon.* 14. *p.* 8. *Cyprinus oblongus, maxillâ ſuperiore longiore, cirris quatuor, pinnâ ani oſſiculorum ſeptem.* C'eſt le *Barbulus* de Platin *l.* 10. le *Barbus* d'Auſone, de Figula de Wotton *l.* 8. *c.* 190. Rondelet *part. II. p.* 194. Salvien *fol.* 85. Geſner *p.* 123. d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 16. *p.* 598. Jonſton *l.* 3. *c.* 5. Charleton *p.* 156. Willughby *p.* 259. Rai *p.* 121. Schoneveld *p.* 29. le nomme *Barbus*, *Barbo*, *Barbatulus*, *Mugil barbatus*, *Mullus fluviatilis*, & Belon *Mullus fluviatilis.* Les Allemands le nomment *Barbe* & *Barble*; les Anglois *Barbell*; les Italiens *Barbio* & *Barbo.*

BAMBELE nom qu'on donne à Zurich à un Poiſſon, dont parlent Geſner *p.* 158. & *Paral. p.* 8. Willughby *p.* 267. Rai *p.* 125. C'eſt le *Phoxinus ſquammoſus* de Jonſton *l.* 3. *c.* 13. Artedi *Synon.* 22. *p.* 12. le nomme *Cyprinus quadruncialis, iride croceâ, maculâ atrâ ad initium caudæ.*

APHYS de Schoneveld, nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 331. *Cyprinus pinnâ ani radiis novem, iridibus rubris*; par Artedi *Genr. IV. Syn.* 13. *Eſp.* 30. *Cyprinus biuncialis, iridibus rubris, & pinnâ ani oſſiculorum novem.* Ce peut être le *Cobitis fluviatilis* du Comte de Marſilly *Danub.* 4. *p.* 24. *Tab.* 9. *fig.* 1. Les Suedois le nomment *Mudd* & *Budd*, les Dalekarliens *Quidd*, *Iggling*, les Veſtrobothniens *Glirr*, *Glirren*; les Lapons *Solſenſodg.* On en trouve dans tous les ruiſſeaux & les lacs de Suede, dans la Province

vince Dalekarlie, dans la Laponie, l'Uplande, & ailleurs.

5. Poiſſon d'Hambourg, *Hamburgerus*, du même Genre. M. LINNÆUS ne ſait s'il eſt différent de celui que nous allons faire connoître ci-deſſous, *n.* 8. c'eſt tout ce que nous en apprend ce ſavant *Syſt. Nat. p.* 49 *n.* 129-5.

6. CARPE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 317. & par Artedi *Genr. IV. Cyprinus cirris quatuor, oſſiculo tertio pinnarum dorſi anique uncinatis.* C'eſt le Κυπρινος & Κυπριανος d'Ariſtote *l.* 4. *c.* 8. *l.* 6. *c.* 14. *l.* 8. *c.* 20. *l.* 2. *c.* 13. d'Athenée *l.* 7. d'Oppien *l.* 1. & 4. le Κυπρινος μελας d'Elien *l.* 14. *c.* 23, & 26. en Latin *Carpo*, *Carpa*, & *Carpio*, par Heldegarde *l.* 4. *p.* 1. *c.* 11. *p.* 90. Figula *fol.* 4. *Carpera* par Cuba, *Carpanus* par Platin, *Rayna* ou *Barbatus* par Jove *c.* 38. *p.* 129. *Cyprinus* par Pline *l.* 32. *c.* 11. Wotton *l.* 8. *c.* 190. *f.* 169. Rondelet *p.* 2. *c.* 4. *p.* 150. Salvien *fol.* 91. 92. 93. Belon, Geſner *p.* 309. & 164. Aldrovande *l.* 5. *c.* 40. *p.* 637. Jonſton *l.* 3. *c.* 6. Charleton *p.* 162. Willughby *p.* 245. Rai *p.* 115 parlent de ce Poiſſon. Schoneveld *Cyprinus*, *Cyprianus*, *Carpa nobilis*; Albert *l.* 24 *Caperon*; les Suedois & les Allemands *Karp*; les Anglois *Carp*; les Venitiens *Rayna*; ſur les bords du Pô *Carpena*. C'eſt le meilleur de tous les Poiſſons de ce genre, ce qui fait qu'il eſt nommé *Cyprinus nobilis* par pluſieurs.

7. MEUNIER, VILAIN, & TETARD, ſelon Rondelet *part.* 2. *fluv. c.* 15. *p.* 190. Poiſſon de Riviere nommé par Artedi *Synon.* 10. *p.* 7. *Cyprinus oblongus macrolepidotus, pinnâ ani oſſiculorum undecim.* C'eſt le *Squalus* de Varron de *Re Ruſt. l.* 3. *c.* 3. de Columelle *l.* 8. *c.* 16. de Salvien *fol.* 84. le *Capito* d'Auſone *Moſ. v.* 85. de Figula, de Wotton *l.* 8. *c.* 190. *f.* 169. le *Cephalus fluviatilis* de Rondelet, de Geſner *p.* 182. le *Capito* d'Auſone & le *Squalus* des anciens, dit Aldrovande *l.* 5. *c.* 17. *p.* 600. de Jonſton *l.* 3. *c.* 6. le *Capito fluviatilis ſimpliciter dictus* de Geſner *Paralip.* 1. *pag.* 8. où il eſt encore nommé *Dobula*; d'Aldrovande *pag.* 601. le *Capito fluviatilis* de Charleton

*pag.* 156. le *Capito* ou *Cephalus* de Willughby *pag.* 255. de Rai *p.* 119. On le nomme à Rome *Squaglia*; en Angleterre *Chub* ou *Chevin*; en Allemagne *Alet* & *Alat*, selon Gesner; par Figula *Ein Keuling*; par Kentmann *Diebel*; ailleurs *Elte* & *Alte*; à Cologne *Munne*.

Salvien dit que ce Poisson est de la même espece que l'*Alburnus* d'Ausone, que nous nommons en François *Ablette*; mais il se trompe, comme le remarque Artedi.

8. KARASS & KARAYSCHE, nom que les Allemands donnent à un Poisson de riviere, que les Suedois nomment *Ruda*. Artedi *Synon.* 5. *p.* 5. & M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 322. le nomment *Cyprinus pinnâ dorsi ossiculorum viginti, lineâ laterali rectâ.* C'est le Χαραξ d'Elien *l.* 12. *c.* 25. d'Oppien *l.* 1. le *Charax* de Belon, de Gesner *p.* 222. & *Paralip. p.* 16. nommé aussi *Carassius* chez le même Auteur, par Willughby *p.* 249. par Rai *p.* 116. On le nomme *Gorais* à Ratisbone, dit Willughby. C'est encore le *Cyprinus latus alius* d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 43. *p.* 644. & de Jonston *l.* 3. *c.* 9.

9. ROTELE, nom que Baltner donne à un Poisson nommé par Artedi *Synon.* 8. *p.* 6. *Cyprinus Orfus dictus.* C'est le *Capito fluviatilis subruber*, ou *Orfus* de Gesner *Paralip. p.* 10. d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 21. *p.* 605. de Charleton *p.* 156. de Jonston *l.* 3. *c.* 6. le *Rutilus latior, vel Rubellio fluviatilis* de Willughby *p.* 252. de Rai *p.* 118. Les Anglois le nomment *Rudd*; dans quelques endroits *Finscale*; les Allemands *Orff*, *Urff*, *Oerve*, *Nersling*, *Wyrsling*, & *Elst*, dit Gesner.

10. GARDON, Poisson nommé par Artedi *Synon.* 15. *p.* 9. *Cyprinus Sargus dictus.* C'est le *Gardus* de Cuba *l.* 3. *c.* 39. *f.* 80. nommé par Belon & Gesner *p.* 26. *Sargus*, *Sargo*, *Cephalus*, & *Gardo*; par Rondelet *Part. II. c.* 16. *p.* 191. *Leuciscus*, & par Aldrovande *l.* 5. *c.* 23. *p.* 609. & Gesner *p.* 25. qui le nomme *Schwal* en Allemand, *Furn* & *Rotang*. Voyez sur ce Poisson Willughby *p.* 260. Rai *p.* 121. Schoneveld *p.* 42. qui le nomme *Leuciscus seu Alburnus*, *Mugilis fluviatilis prima species.*

11. GRISLAGINE, nom qu'on donne à Ausbourg, à

un Poiſſon de riviere, eſpece de *Goujon*, nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 325. *Cyprinus pinnæ ani radiis undecim, pinnis albentibus*; par Artedi *Genre V. Cyprinus oblongus, iride argenteâ, pinnis albentibus*; par le même *Synon.* 4. *Cyprinus oblongus, figurâ Rutili, pinnâ ani oſſiculorum decem.* Willughby *Ichth. p.* 263. Rai *Piſc. p.* 123. en parlent. On le nomme *Stuem* en en Angermanie, où il eſt commun, ainſi qu'en Weſtrobothnie.

12. TENCHE, excellent Poiſſon, nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 321. *Cyprinus pinnâ ani oſſiculis undecim, caudâ integrâ*; par Artedi *Genre IV.* & *Synon. p.* 5. *n.* 7. *Cyprinus mucoſus totus nigreſcens, extremitate caudæ æquali.* C'eſt le Φυλλων d'Ariſtote *l.* 6. *c.* 14. le *Fullo* de Gaza, le Γναφευς de Dorion dans Athenée *l.* 7. *c.* 297. en Latin *Tencha* par Cuba *l.* 3. *c.* 91. *f.* 91. *Tinca* par Auſone, Pline *l.* 10. Jove *p.* 124. Figula, Wotton *l.* 8. *c.* 190. Rondelet *Part. II. c.* 10. *p.* 157. Salvien, Geſner *p.* 984. Aldrovande *l.* 5. *c.* 45. *p.* 646. Jonſton *l.* 3. *c.* 10. Charleton *p.* 162. Willughby *p.* 251. Rai *p.* 117. Schoneveld *p.* 76. Ce dernier en parle auſſi ſous le nom de *Phycis* ou *Merula fluviatilis.* Les Suedois nomment ce Poiſſon *Linnare*, *Sutare*, & *Skomakare*; les Danois *Sydere*; les Allemands *Schley* & *Schleyen*: les Hollandois & les Saxons *Schomaker*; les Italiens *Tenca*; les Anglois *Tench.* Il a au coin de la bouche de chaque côté un barbillon très-court & rond.

13. La treizieme eſpece de ce Genre de Poiſſon eſt chez M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 49. le *Cephalus*, en François *Meunier.* Nous trouvons dans Artedi que le *Dobula* eſt le même que le *Meunier.* Voyez plus haut *n.* 7.

14. GOUJON, VERON, & GOIFON à Lyon, Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 20. *p.* 11. *Cyprinus quincuncialis maculoſus, maxillâ ſuperiore loniore, cirris duobus ad os*; *Gobio* par Auſone *Moſ. v.* 132. Cuba *l.* 3. *c.* 40. *Gobius* par Figula; *fluviatilis Gobio* par Salvien *f.* 214. Rondelet *Part. II. p.* 206. Geſner *p.* 399. Charleton *p.* 157. qui le nomme auſſi *Gobio non capitatus*,

ainſi que Jonſton *l. 3. c.* 10. *Gobio fluviatilis* par Aldrovande *l. 5. c. 27. p. 612.* Willughby *p.* 264. Rai *p.* 123. C'eſt auſſi le *Fundulus* de Schoneveld *p.* 35. Les Danois le nomment *Grumpel* & *Sandheſt*; les Allemands *Greſling*, *Grandling*, *Grundole*, & *Ein Gobe*; & les Anglois *Gudgeon*.

15. ROSSE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 329. *Cyprinus pinnæ ani radiis duodecim rubicundis*; par Artedi *Genre III. Synon.* 18. *p.* 10. *Cyprinus iride, pinniſque ventris ac ani plerumque rubentibus.* Figula *f.* 5. le nomme *Rubiculus*; Belon *Roſſe*; Rondelet *Part. II. p.* 205. *Phoxinus Roſſe.* Geſner *p.* 820. Willughby *p.* 262. Rai *p.* 122. Charleton *p.* 158. Aldrovande *l. 5. c.* 32. *p.* 621. Jonſton *l. 3. c.* 14. *p.* 130. *Rutilus* ou *Rubellus fluviatilis.* Schoneveld *p.* 63. en parle ſous les mêmes noms. Les Suedois l'appellent *Mort*; les Danois *Rudſchallig*; les Allemands *Rotaug*, *Rotoge*, & *Rotel*; & les Anglois *Roche.*

16. VANDOISE, DARD, SUISSE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 16. *p.* 9. *Cyprinus novem digitorum, Rutilo longior, & anguſtior, pinnâ ani radiorum decem*; par Belon, Charleton *p.* 156. Jonſton *l. 3. c.* 7. Willughby *p.* 260. Rai *p.* 121. *Leuciſcus.* C'eſt la ſeconde eſpece de Rondelet *Part. II. c.* 17. *p.* 192. dont parlent auſſi Geſner & Aldrovande *l. 5. c.* 22. *p.* 607. Les Allemands nomment ce Poiſſon *Laïck*, *Laügele*, *Digünen*, &c. les Anglois *Duce* ou *Dare.* Geſner donne la figure de ce Poiſſon dans ſes *Paralipomenes p.* 37.

17. VANDOISE de Suede, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 320. *Cyprinus pinnâ ani oſſiculis tredecim rubrâ*; & par Artedi *Genre V. Synon. p.* 14. *Cyprinus iride ſubluteâ, pinnis ventralibus anique rubris.* C'eſt un Poiſſon fort eſtimé en Suede; on en pêche beaucoup en Uplande & en Sudermanie.

18. ROOTAUG, nom que Willughby *p.* 249. & Rai *p.* 116. donnent à un Poiſſon nommé par M LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 324. *Cyprinus pinnæ ani radiis quatuordecim, pinnis omnibus rubris*; par Artedi *Synon. 3. p.* 4. *Cyprinus iride, pinnis omnibus, caudâque rubris.* Les Suedois le nomment *Sarf*; en Weſtrobothnie *Iſarf.* Il eſt commun dans ces Païs.

19. NASE ou NASEN, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. 9. p. 6. Cyprinus roſtro naſiformi prominente, pinnâ ani oſſiculorum quatuordecim*; Albert le Grand, Geſner, Aldrovande *l. 5. c. 26. p. 611.* Schoneveld *p. 52.* Charleton *p. 156.* Jonſton *l. 3. c. 9.* Willughby *p. 254.* Rai *p. 19.* en parlent. Il eſt nommé *Naſus*, à cauſe du bout de ſa machoire ſupérieure, qui a la figure d'un nez. Les Italiens le nomment *Sevetta*; à Ferrare *Sueta.*

20. ROI des Poiſſons, du Genre des *Carpes. Rex Cyprinorum.* C'eſt un Poiſſon décrit par Gronovius dans les Actes d'Upſal.

21. ASP des Suedois, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n. 319. Cyprinus pinnâ ani oſſiculorum quindecim, maxillâ inferiore longiore incurvâ*; par Artedi *Genre VI. Syn. 31. p. 14. Cyprinus maxillâ inferiore longiore, cum apice elevato, pinnâ ani oſſiculorum quindecim.* Ce Poiſſon ſe pêche proche d'Upſal; & entre tous, il eſt le premier de ſon Genre pour la bonté, dit Artedi.

22. NASTERLING, en Latin *Naſterlingius*, Poiſſon décrit dans les Actes d'Upſal par M. Gronovius.

23. Poiſſon du Genre des *Carpes*, à nageoires couleur de ſang. *Cyprinus pinnis ſanguineis*, dit M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p. 49. n. 129-23.* C'eſt un Poiſſon du Nord.

24. ABLE ou ABLETTE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n. 330. Cyprinus pinnæ ani radiis viginti*; par Artedi *Genre VI. Synon. 19. p. 10. Cyprinus quincuncialis, pinnâ ani oſſiculorum viginti.* C'eſt l'*Alburnus* des Naturaliſtes. Voyez ſur ce Poiſſon Auſone *Moſ. v. 126.* Figula, Wotton *l. 8. c. 190.* Rondelet *Part. II. p. 208.* Geſner *p. 23.* Aldrovande *l. 5. c. 37. p. 628. & 629.* Jonſton *l. 3. c. 4.* Charleton *p. 161.* Willughby *p. 263.* Rai *p. 123.* Schoneveld *p. 11.* le nomme *Albula minor*; les Suedois *Loïa & Benloïa*; les Danois *Lüyer*; les Anglois *Bleack*; les Allemands *Weisfiſch, Zumbelfiſchlein & Bliegg*; à Francfort *Ablen*; à Hambourg & ailleurs *Witinck, Witeke & Blicke.*

28. WIMBA, nom que les Suedois donnent à un Poiſſon, nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n. 326. Cyprinus pinnæ ani radiis viginti quatuor, roſtro naſi-*

*formi ;* par Artedi *Genre VI. Synop.* 32. *p.* 14. *Cyprinus roſtro naſiformi , dorſo acuminato , pinnâ anâ oſſiculorum viginti quatuor.* Ce Poiſſon , dit M. LINNÆUS , ſe pêche dans le Lac *Mælerus* & la Riviere d'Upſal.

26. BIORKA ou BIORKNA , ou BIORKFISK , nom que les Suedois donnent à un Poiſſon que M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 328. nomme *Cyprinus pinnæ ani radiis viginti quinque ,* & Artedi *Genre III. Synon.* 27. *p.* 13. *Cyprinus quincuncialis, pinnâ ani oſſiculorum viginti quinque.* On pêche de ces Poiſſons dans le Lac *Melerus* , & la Riviere d'Upſal en Suede.

27. BREME , Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 318. *Cyprinus pinnâ ani radiis viginti ſeptem pinnis fuſcis ;* par Artedi *Genre VI. Synon.* 2. *p.* 4. *Cyprinus pinnis omnibus nigreſcentibus , pinnâ ani oſſiculorum viginti ſeptem.* C'eſt le *Cyprinus latus* ou *Brama* de Rondelet *Part. II. p.* 154. de Geſner 316. 317. d'Aldrovande 641. de Jonſton 165. de Schoneveld 33. de Charleton *Onom.* 162. de Willughby 248. de Rai *p.* 116. Les Suedois nomment ce Poiſſon *Brax* ou *Braxen* ; les Allemands *Braſſem* & *Praſem ;* les Anglois *Bream.*

28. FAREN , nom que les Suedois donnent à un Poiſſon , nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 327. *Cyprinus pinnæ ani radiis triginta ſeptem ;* & par Artedi *Genre III. Synon.* 28. *p.* 13. *Cyprinus iride flavâ pinnâ ani oſſiculorum viginti ſeptem.* Ce Poiſſon ſe pêche en Suede dans le Lac *Mælerus* , principalement proche le Pont *Oreſundſber.*

29. BORDELIERE , Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 323. *Cyprinus pinnâ ani oſſiculorum quadraginta ;* par Artedi *Genre III. Synon.* 24. *p.* 12. *Cyprinus admodum latus & tenuis , pinnâ ani oſſiculorum quadraginta.* C'eſt le Βαλερος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 20, nommé en Latin *Ballerus* par Rondelet *Part. II. c.* 8. *p.* 154. Schoneveld *p.* 28. Aldrovande *l.* 5. *c.* 44. *p.* 645. Jonſton *l.* 3. *c.* 9. Rai *p.* 117. Charleton *p.* 162. Les Suedois le nomment *Blicca , Braxenpanka , Braxnaſlicka ;* les Allemands *Hoüerke ;* d'autres *Blick.*

30. ZERTE ou BLICKE, nom que l'on donne en Allemagne , diſent Geſner , Willughby *p.* 257. Rai *p.*

120. à un Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 13. *p.* 8. *Cyprinus Capito anadromus.* Aldrovande *l.* 4. *c.* 7. *p.* 513. Jonſton *l.* 2. *c.* 5. Charleton *p.* 151. en parlent ſous le nom de *Capito anadromus.* On en voit la figure dans Geſner *Paral. p.* 11. ſuivant la deſcription qu'en donne Willughby ; ce pourroit bien être le même que le *Naſen.*

31. RAPPE, RAPE, & RAUBALET, nom que les Allemands donnent à un Poiſſon nommé par Artedi *Synon. n.* 12. *p.* 8. *Cyprinus magnus craſſus argenteus, longitudine ad latitudinem quintuplâ.* C'eſt, dit Geſner *Paral. p.* 9. un *Capito fluviatilis*, nommé auſſi *Corvus* ; par les Allemands *Ein Rapen* ; & *Capito fluviatilis rapax* par Aldrovande *l.* 5. *c.* 20 *p.* 604. Jonſton *l.* 3. *c.* 6. Willughby *p.* 256. Rai *p.* 120. Schoneveld *p.* 30.

32. BUBULCA, nom que Belon, Geſner *p.* 23. Willughby *p.* 267. Rai *p.* 125. donnent à un Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 33. *p.* 14. *Cyprinus triuncialis, corpore lato orbiculari, ſquamis magnis.*

33. JESES, nom que les Suedois donnent à un Poiſſon nommé par Artedi *Synon. II. p.* 7. *Cyprinus cubitalis, pinnâ ani oſſiculorum quatuordecim.* C'eſt le *Capito fluviatilis cæruleus* de Geſner *Paralip. p.* 9. Aldrovande *l.* 5. *c.* 19. *p.* 603. Willughby *p.* 256. Rai *p.* 120. Les Allemands le nomment *Scheert* & *Koppen*, les Saxons *Jeſen*, les Dantzicois *Jeſus* ; d'autres *Jeſe* ; à Vienne *Jentling* ; proche de l'Oder *Jeſitz.*

34. MEUNIER de la petite eſpece, Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 17. *p.* 10. *Cyprinus pedalis, gracilis, oblongus, craſſiusculus, , dorſo craſſo, pinnâ ani oſſiculorum novem* ; par Geſner *p.* 28. *Mugilis* ou *Cephali fluviatilis genus minus* ; par le même *Capito* ou *Squalus fluviatilis minor* ; par Aldrovande *l.* 5. *c.* 18. *p.* 603. Jonſton *l.* 3. *c.* 6. *Capito fluviatilis* ou *Squalus minor* ; par Schoneveld *p.* 30. *Capito minor* ; par Willughby *p.* 261. Rai *p.* 122. *Mugilis* ou *Cephali fluviatilis ſpecies minor.* On le nomme à Zurich *Haſſle, Haſſer, Haſela* ; d'autres *Heſſling, Vyſfiſch* ; en Alſace *Schnot, Schnotfiſch*, & *Meifiſch.*

35. PICHO ou PIGO de Salvien, *Cyprinus Piclo, Pigo*

& *Pigus dictus*, dit Artedi *Synon.* 25. *p.* 13. Ce Poisson a la queue fourchue, & de grandes écailles.

35. RUSVORN de Gronovius, selon M. LINNÆUS *Syst. Nat. p.* 49.-36. Il en est parlé dans les Actes d'Upsal.

37. REXVON-RUY, autre Poisson dont parle M. Gronovius, & cité par M. LINNÆUS. *Syst. Nat. ibid.* 37.

38. Autre Poisson du même Genre, cité par M. LINNÆUS *ibid.* & nommé dans les Actes de Stokolm *Deaurata.*

39. VROW-FISCH, Poisson ainsi nommé à Ratisbone, disent Willughby *p.* 253. & Rai *p.* 118. & par Artedi *Synon. p* 5. *n.* 6. *Cyprinus Vrow-fisch dictus.*

40. WAPER des Allemands, nommé *Gobius fluviatilis minor* par Willughby *p.* 264. Rai *p.* 123. & par Artedi *Cyprinus quadriuncialis, maxillâ superiore productiore, ano medio inter pinnas ventrales & ani.*

41. ALBO des Italiens, *Albus Piscis* par Salvien, nommé par Artedi *Synon. p.* 13. *n.* 26. *Cyprinus Albo Italis dictus.* Quelques-uns confondent ce Poisson avec l'*Able.* Il est différent.

## GENRE II.

Poissons qui ont à la membrane des branchies ou ouies six osselets, & deux ou trois nageoires au dos. Les Naturalistes leur ont donné le nom de *Gadus*, qui vient du Grec. Mais on en ignore l'origine, dit Artedi. Ces Poissons ont des nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue.

1. MERLAN, Poisson nommé par Artedi *Genre XVI. Synon. p.* 34. *n.* 1. *Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxillâ superiore longiore.* Rondelet *l.* 9. *c.* 10. *p.* 276. Gesner *p.* 85. 99. nomment ce Poisson *secunda Asellorum species*; Schoneveld *p.* 17. *Asellus candidus primus*; Aldrovande *l.* 3. *c.* 3. *p.* 287. *Asellus minor alter*; Charleton *p.* 121. *Asellus minor & mollis*; Willughby *p.* 178. & Rai *p.* 55. *Asellus major seu albus.* Les Suedois le nomment *Hwitling*; les Anglois *Whiting.*

2. CHARBONNIER, *Carbonarius*, espece de *Morue*, nommée par Artedi *Synon. p.* 34. *n.* 2. *Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, maxillâ inferiore longiore, & lineâ laterali rectâ.* C'est le *Colfish* des Anglois; l'*Asellus niger, Carbonarius*, de Schoneveld *p.* 19. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 7. *p.* 289. de Willughby *p.* 568. Rai *p.* 54. Charleton nomme ce Poisson *Asellus niger, sive mollis nigricans.*

3. POLACK des Anglois, espece de *Morue*, nommée par Willughby *p.* 167. & Rai *p.* 53. *Asellus Fluitingo-Pollachius*; par Artedi *Synon. p.* 35. *n.* 3. *Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, maxillâ inferiore longiore, lineâ laterali curvâ.* Artedi pense que la *Morue* verte de Schoneveld, Willughby & Rai, en est une varieté; mais M. LINNÆUS *Syst. Nat.* & *Faun. Suec.* en fait une espece différente, comme on le peut voir plus bas *n.* 15.

4. EGLEFIN, ou ÆGREFIN, ou ÆGLEFIN, espece de *Morue*, nommée par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 297. & Artedi *Genre XX. Synon.* 7. *p.* 36. *Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxillâ superiore longiore, caudâ subbifidâ*; par le même *Espece* 64. *Gadus cirratus albicans, maxillâ superiore longiore, caudâ parum bifurcâ.* C'est le *Callaris* de Pline *l.* 9. *c.* 17. le *Callaris, Galerida* & *Galaxia, Piscis capitosus*, de Charleton *p.* 121. l'*Æglefinus* & *Ægrefinus* de Belon, la *tertia Asellorum species* de Rondelet *l.* 9. *c.* 11. *p.* 227. de Gesner *p.* 86. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 1. *p.* 282. l'*Asellus minor* de Schoneveld *p.* 18. l'*Onos* ou *Asinus* des Anciens, disent Turnerus dans une Epître à Gesner, & Willughby *p.* 170. & Rai *p.* 55. Les Suedois nomment ce Poisson *Kallior*, les Danois *Koll*, les Anglois *The Hadock.* On le pêche dans la Mer Occidentale.

5. POUTING, POUT, & WHITING-POUG des Anglois, espece de *Morue*, nommée par Artedi *Synon.* 12. *p.* 37. *Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem triplâ, pinnâ ani primâ ossiculorum triginta.* C'est l'*Asellus mollis*, dont Lister parle dans Willughby *p.* 22. & Rai *p.* 55. & l'*Asellus barbatus* de Charleton

*p.* 121. Artedi penſe que l'*Aſellus luſcus* de Rai *p.* 54. appartient à cette eſpece.

6. TORSK des Suedois, ou *Morue* variée, nommée par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 293. & Artedi *Synon.* 4. *p.* 35. *Gadus dorſo tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxillâ ſuperiore longiore, caudâ æquali.* C'eſt l'*Aſellus varius* ou *ſtriatus* de Schoneveld *p.* 19. Willughby *p.* 172. Rai *p.* 54. Jonſton 46. Les Anglois la nomment *Cod* & *Codfiſh.* On en pêche beaucoup dans la Mer Baltique & Occidentale, aux environs de la Gotlande & de l'Œlande.

7. MERLAN de la petite eſpece. M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 50. diſtingue le grand & petit *Merlan.* Il appelle le premier *Merlangus*, le ſecond *Merlanus.* Artedi ne fait qu'une même eſpece du *Merlangus* de Geſner & de Belon, & du *Merlanus*; & M. LINNÆUS lui-même *Faun. Suec. n.* 294. appelle le *Merlanus*, *Gadus dorſo tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxillâ ſuperiore longiore.* Artedi *Genre I. Synon.* 1. ne déſigne pas autrement le *Merlangus.* Voyez ci-deſſus MERLAN *n.* 1. pour les Auteurs qui en ont écrit.

8. MERLU, *Merluccius*, Poiſſon nommé par Artedi *n.* 10. *p.* 37. *Gadus dorſo dipterygio, maxillâ inferiore longiore.* C'eſt l'Ονος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 15. *l.* 9. *c.* 37. d'Athenée *l.* 7. *p.* 315. d'Elien *l.* 9. *c.* 38. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. *l.* 2. *p.* 59. le Θαλατιος d'Elien *l.* 5. *c.* 20. *p.* 276. le Γαδος de Dorion dans Athenée *l.* 7. *p.* 315. le *Bacchus* de Pline *l.* 9. *c.* 17. le *Merluccius* de Belon & de Geſner *p.* 84. nommé *Aſellus* par Ovide, Varron *l.* 4. Pline *l.* 9. *c.* 16. 17. Jove *c.* 20. *p.* 87. Rondelet *l.* 9. *c.* 9. *p.* 272. *Aſellus minor* par Salvien 73. *Aſellus ater* par Aldrovande *l.* 3. *c.* 2. *p.* 286. *Aſellus fuſcus* par Charleton *p.* 122. *Aſellus primus* par Willughby *p.* 174. & Rai *p.* 56. C'eſt le *The Hake* des Anglois, & le *Merluzo* des Italiens.

9. MORUE ou CABILIAU, *Morhua* en Latin, Poiſſon nommé par Artedi *Synon.* 6. *p.* 35. *Gadus dorſo tripterygio, ore cirrato, caudâ æquali fere cum radio primo ſpinoſo.* Ce Naturaliſte comprend ſous ce titre la *Mor-*

*hua vulgaris* de Belon, qui eſt la plus grande des *Morues*, dont parle Rondelet *l.* 9. *c.* 14. *p.* 280. Aldrovande *l.* 3. *c.* 6. *p.* 289. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Geſner *p.* 88. qui l'appellent *Molva* & *Morrhua*. C'eſt auſſi l'*Aſellus major* de Schoneveld *p.* 18. de Charleton *p.* 121. l'*Aſellus major* de Willughby *p.* 165. & de Rai *p.* 53. que les Hollandois nomment *Cabiliau*, les Suedois *Cablia*, & les Danois *Kablag*.

10. Autre grande MORUE, qui eſt le *Langa* des Suedois, nommé *Eine Lenge* par les Allemands, *Ling* par les Anglois. Artedi *Genre IX.* & *Synon. n.* 9. *p.* 36. nomme ce Poiſſon *Gadus dorſo dipterygio, ore cirrato, maxillâ ſuperiore longiore*. C'eſt la *Molva major* de Charleton *p.* 121. l'*Aſellus longus* de Schoneveld *p.* 18. de Willughby *p.* 175. de Rai *p.* 56.

11. LOTE, Poiſſon de riviere, nommé par Artedi *Synon. n.* 13. *p.* 38. *Gadus dorſo tripterygio, ore cirrato maxillis æqualibus*. C'eſt la *Lota* de Rondelet *Part. II. p.* 164. d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 46. *p.* 648. de Willughby *p.* 125. de Rai *p.* 68. de Geſner *p.* 599. Jonſton *l.* 3. *c.* 11. Belon & Geſner nomment auſſi ce Poiſſon *Strinſia* ou *Botatriſſa*; Iſidore & Cuba *l.* 3. *c.* 12. *Barbotha*; Olaus Magnus *l.* 20. *c.* 20. *Barbocha*; Salvien 213. *Bottatria* & *Triſeus*; Hildegarde *l.* 1. *Part. IV. c.* 25. *p.* 92. *Altropa*. C'eſt encore la *Muſtela fluviatilis* de Jonſton *l.* 3. *c.* 6. Kentmann dans Geſner *Paral.* 27. Schoneveld *p.* 49. Willughby *p.* 125. Rai *p.* 67. Roberg *Piſc. p.* 9. Charleton 159. Aldrovande *l.* 5. *c.* 7. *p.* 577. Les Suedois nomment ce Poiſſon *Lake*; les Allemands *Alraupe*, *Olruppe*, *Truſch*, *Treiſchen*, *Rutten*; les Hollandois *Putael*; les Anglois *Eelpout*.

12. MUSTELE vulgaire ou *Donzelline*, ou *Sorge marine*, de l'Italien *Donzellina*, & *Sorge marina*, noms que les Vénitiens donnent à cette eſpece de *Morue*. C'eſt le *Gadus dorſo dipterygio, ſulco magno ad pinnam dorſi primam, ore cirrato. Genre II.* & *Synon* 2. *p.* 37. C'eſt la *Galea* des Vénitiens, ſelon Belon & Geſner *p.* 90. la *Muſtela vulgaris* de Rondelet *l.* 9. *c.* 15. *p.* 281. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 8. *p.* 290. de Willughby 121. de Rai *p.* 67. de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. la *Muſtela altera* de

Schoneveld On nomme ce Poiſſon dans la Province de Cornouaille en Angleterre *Wiſtlefish.* Rondelet en donne deux eſpeces.

13. SILURE, Poiſſon nomme par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 291. *Gadus dorſo monoterygio, cirreis maxillæ ſuperioribus duobus, inferioris quatuor;* par Artedi *Append. p.* 110. *Silurus cirris quatuor in mento.* C'eſt le Σιλυρος d'Elien *l.* 12. *c.* 29. *l.* 14. *c.* 25. *p.* 838. 840. d'Athenée *l.* 7. *c.* 287. le Γλανις d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 13. 15. *l.* 6. *c.* 14. *l.* 8. *c.* 20. 30. *l.* 9. *c.* 37. nommé *Glanus* par Pline *l.* 32. *c.* 10. & *Glanis l.* 9. *c.* 43. par Salvien 210. 211. Aldrovande *l.* 5. *c.* 5. *p.* 569. Jonſton *l.* 3. *c.* 4. Pline en parle encore ſous le nom de *Silurus l.* 9. *c.* 15. 51. *l.* 5. *c.* 9. & Solin *c.* 60. Ambroſ. *in Hexaëm. l.* 5. *c.* 5. Auſone *Moſ. v.* 135. Hildegarde *l.* 4. *Part. I. c.* 10. *p.* 90. Gaza, Caius, Figula, Rondelet *Part. II. p.* 180. Geſner *p.* 867. 872. 1047. Schoneveld *p.* 69. Willughby *p.* 128. Rai *p.* 70. Roberg *Piſc. p.* 11. C'eſt encore le Poiſſon barbu de Salvien, que les Suedois nomment *Mâl;* les Allemands *Scheid, Schoiden, Wals, Waller;* les Polonois *Sum*, les Pannoniens *Harcha*, à Conſtantinople *Glano*, en Angleterre *The Sheatfish.*

14. Poiſſon qui ſe trouve dans les rivieres, que M. LINNÆUS *Syſt. Nat. p.* 51. *n.* 130.-14. nomme *Molenarius*, parcequ'il frequente autour des Moulins.

15. MORUE verte, *Aſellus vireſcens*, nommée par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 296. *Gadus dorſo tripterygio, ore imberbi, dorſo vireſcente.* Schoneveld & Rai *p.* 53. *n.* 2. en parlent, & on la nomme en Norvege *Sey.*

16. BIB ou BLINDS des Anglois. On nomme ainſi dans la Province de Cornouaille une eſpece de *Morue*, qui eſt l'*Aſellus luſcus* de Willughby *p.* 169. & de Rai *p.* 54. qu'Artedi *Synon.* 5. *p.* 35. nomme *Gadus dorſo tripterygio, ore cirrato, colore vario, oſſiculo pinnarum ventralium primo in longam ſetam producto.*

7. CAPELAN, ſeconde eſpece d'*Anthie*, dont parle Rondelet *l.* 6. *c.* 12. *p.* 191. & Geſner *p.* 56. & qu'Artedi *Synon.* 8. *p.* 36. met dans le Genre des *Morues.* Il nomme ce Poiſſon *Gadus dorſo trypterygio, ore cir-*

*vato, corpore ſeſcunciali, ano in medio corporis.* C'eſt l'*Aſellus mollis minor* ou *Aſellus omnium minimus*, la plus petite de toutes les *Morues*, de Willughby *p.* 171. Rai *p.* 56. On la nomme *Mollo* à Veniſe.

18. Rondelet ne parle que du *Merlu*, qui eſt l'Ονος des Anciens; du *Merlan*, qu'il appelle la ſeconde eſpece de *Morue*; de l'*Egleſin*, qui eſt la troiſieme; d'une quatrieme, qu'il nomme *Goberge*, & que l'on pêche dans l'Ocean; d'une cinquieme, qu'il nomme *Muſchebout*, & *Leopard* à cauſe de ſes taches; & enfin de la Molue, *Molva*, qu'il diſtingue de la Morue, *Morrua.*

Il y a pluſieurs autres eſpeces de *Morues*, ſurtout pluſieurs eſpeces de *Cabiliau.* Voyez le détail où nous entrons ſur ces Poiſſons, d'après M. Anderſon, dans le *Dictionnaire des Animaux* au mot MORUE.

## GENRE III.

Poiſſons qui ont ſept oſſelets à la membrane des ouies, les deux yeux d'un même côté, des nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue. Les Naturaliſtes leur ont donné le nom de *Pleuronectes*, du Grec πλευρα ou πλευρον, *latus*, côté, & νηκτης, *natator*, nageur, parceque ces Poiſſons nagent couchés ſur un côté.

1. PLIE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 30. *n.* 1. *Pleuronectes oculis & tuberculis ſex à dextrâ capitis, lateribus glabris, ſpinâ ad anum; & Eſpec.* 57. *Pleuronectes utrinque glaber, tuberculis ſex à dextrâ capitis.* C'eſt le Ψηττα d'Athenée *l.* 7. *p.* 329. le *Plais* de Cuba *l.* 3. *c.* 69. *f.* 86. la *Plateſſa* de Belon, Rondelet *l.* 11. *c.* 7. *p.* 316. Geſner *p.* 664. & 670. de Schoneveld *p.* 61. de Willughby *p.* 96. de Rai *p.* 31. le *Paſſer lævis* d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 47, *p.* 243. de Jonſton *l.* 1. *c.* 3. de Charleton *p.* 318. Le *Quarrelet* de Rondelet *l.* 11. *c.* 8. *p.* 318. & de Geſner *p.* 665. en eſt une varieté. Les Danois nomment la *Plie*, *Schickpleder*; les Allemands *Scholle* & *Pladiſe*; & les Anglois *Plaiſe.* M. LINNÆUS en parle *Faun. Suec. n.* 301. & on en trouve

auſſi la deſcription dans le voyage de W-ogthie 179.

2. LIMANDE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. n. 9. p.* 33. *Pleuronectes oculis à dextrâ, ſquamis aſperis, ſpinâ ad anum, dentibus obtuſis ;* & *Eſp.* 58. *Pleuronectes ſquamis aſperis, ſpinâ ad anum.* C'eſt le *Paſſer aſper, ou ſquammoſus* de Rondelet *l.* 11. *c.* 9. *p.* 319. de Schoneveld *p.* 61. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 46. *p.* 242. de Willughby *p.* 97. de Rai *p.* 32. & la *Limanda* de Belon, Geſner *p.* 665. le *Citharus* de Charleton *p.* 145. Les Anglois nomment ce Poiſſon *Dab.* Il en eſt parlé dans le voyage de W-gothie.

3. FLETAN, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun-Suec. n.* 302. & Artedi *Synon.* 31. *n.* 3. *Pleuronectes oculis à dextris, totus glaber.* C'eſt l'*Hippogloſſus* de Rondelet *l.* 11. *c.* 16. *p.* 325. de Rai *p.* 33. Ce Poiſſon devient très-grand dans l'Ocean, & eſt nommé par Geſner *p.* 669. 787. & par Willughby *p.* 99. *Hippogloſſus* ou *Bugloſſus maximus in Oceano.* Aldrovande *l.* 2. *c.* 43. *p.* 238. le nomme *Hippogloſſus ;* Charleton *p.* 146. *Paſſer Brittannicus ;* Schoneveld *p.* 62. *Paſſerum genus majus*, le plus grand des Poiſſons plats. Les Suedois le nomment *Halgflandra ;* les Anglois de la partie Méridionale *Holibut*, & ceux de la partie Septentrionale *Turbot.*

4. FLEZ, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 300. & Artedi *Genre XVII. Synon.* 31. *n.* 2. *Pleuronectes oculis à dextris, lineâ laterali aſperâ, ſpinulis ſupinè ad radices pinnarum, dentibus obtuſis*, & *Eſpec.* 59. *Pleuronectes lineâ laterali aſperâ, ſpinulis ad radices pinnarum in latere oculato.* C'eſt le *Paſſer fluviatilis* ou *Fleſus* de Belon, Willughby *pag.* 98. Rai *p.* 32. la troiſieme eſpece de *Paſſer* de Rondelet *l.* 11. *c.* 10. *p.* 319. de Geſner p. 666. le *Paſſer niger* de Charleton *p.* 145. Les Anglois le nomment *Flounder*. ou *Bul*, ou *Fluke ;* les Suedois *Flundra ;* dans le Païs de Bahus, Province de Norwege, *Slaettskaedda.* On pêche le *Flez* dans la Mer Occidentale.

5. POLE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 31. *n.* 4. *Pleuronectes oculis à dextrâ, ano ad latus ſiniſtrum, dentibus acutis.* C'eſt la *Pola* de Belon, qu'on nomme *Linguatula* à Rome, diſent Willughby *p.* 101. Rai *p.*

33. Le *Cynogloſſus* de Rondelet *l.* 11. *c.* 13. *p.* 313. de Geſner *p.* 668. 785. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 43. *p.* 237. en eſt une varieté, dit Artedi.

6. SOLE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 299. Artedi *Genre XVIII. Synon.* 8. *p.* 32. *Pleuronectes oculis à ſiniſtrâ, corpore oblongo, maxillâ ſuperiore longiore, ſquamis utrinque aſperis.* & *Eſpec.* 60. *Pleuronectes oblongus, maxillâ ſuperiore longiore, ſquammis utrinque aſperis.* C'eſt le Βύγλοσσος d'Athenée *l.* 7. *p.* 288. le Βύγλοσση d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. la *Solea* d'Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 16. 20. de Cuba *l.* 3. *c.* 84. Jove *c.* 26. *p.* 98. Belon, Geſner *p.* 671. Jonſton *l.* 1. *c.* 2. Charleton *p.* 145. Wotton *l.* 8. *c.* 150. Rondelet *l.* 11. *c.* 11. *p.* 320. Geſner *p.* 666. Rai *p.* 33. Willughby *p.* 100. Aldrovande *l.* 2. *c.* 43. *p.* 235. Schoneveld *p.* 63. Varron & Plaute nomment la Sole, *Lingulaca*, parcequ'elle a la forme d'un langue. Rondelet appelle la *Lingulaca*, petite *Sole*, & la diſtingue de la grande; les Suedois *Tunga*; les Danois *Tungpleder*; les Anglois *A Sole* & *Soul.*

7. Poiſſon plat d'Amboïne, du même Genre, nommé par Artedi *Genre VII.* & *Synon.* 10. *p.* 33. *Pleuronectes oculis à dextrâ, corpore aſpero caneſcente, pinnis lateralibus vix conſpicuis*; & *Eſp.* 60. *Pleuronectes aſper caneſcens, pinnis lateralibus vix conſpicuis.*

8. TURBOT ſans piquans, nommé par Artedi *Synon. n.* 5. *p.* 31. *Pleuronectes oculis à ſiniſtris, corpore glabro.* C'eſt le *Rhombus non aculeatus ſquammoſus* de Willughby *p.* 95. de Rai *p.* 31. Le Ῥόμβος d'Elien *l.* 14. *c.* 3. dont parlent Ovide, Pline, Cuba *l.* 3. *c.* 76. & le *Rhombus lævis* de Rondelet *l.* 11. *c.* 3. *p.* 312. de Geſner *p.* 662. 779. de Schoneveld *p.* 60. de Willughby *p.* 96. de Rai *p.* 32. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 48. *p.* 249. paroiſſent n'être qu'une varieté du *Rhombus non aculeatus ſquammoſus*; ainſi qu'une autre eſpece de *Turbot* de France, *Rhombus alter Gallicus*, dont parlent Belon & Geſner *p.* 670. Les Anglois à Londres nomment le Turbot *The Pearl*; dans la Province de Cornouaille *Lug-aleaf*; à Veniſe *Scatto* ou *Soagia.* Le *Rhombus lævis* ſe nomme auſſi en François *Barbue* & *Panſar*, à cauſe de ſon large ventre, dit Rondelet.

9. Grand TURBOT non écailleux, dont la peau eſt rude nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 298. & Artedi *Genre VIII. Synon.* 7. *p.* 32. *Pleuronectes oculis à ſiniſtrâ, corpore aſpero.* C'eſt le *Rhombus aſper, non ſquammoſus, maximus*, de Willughby *Ichth. p.* 94. de Rai *p.* 31. Il en eſt parlé dans le voyage de Gotlande *p.* 208. où il eſt nommé *Butta.* On le pêche dans la Mer Baltique.

10. TURBOT piquant. Artedi *Synon. 6. p.* 32. le nomme *Peuronectes oculis à ſiniſtrâ, lineâ laterali, utrinque aculeatâ.* C'eſt le Ψηττα d'Ariſtote, l. 4. *c.* 11. *l.* 5. *c.* 9. *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 14. *c.* 3. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. le *Paſter* d'Ovide, de Pline *l.* 9. *c.* 20. de Jove *c.* 25. *p.* 95. 96. de Wotton *l.* 8. *c.* 167. le *Rhombus aculeatus* de Rondelet *l.* 11. *c.* 2. *p.* 310. de Geſner *p.* 661. 778. de Schoneveld *p.* 60. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 48. *p.* 248. Charleton *p.* 149. Willughby *p.* 93. Rai *p.* 32. Les Vénitiens le nomment *Rhombo.*

11. A ce Genre de Poiſſons ajoutons le *Rhomboïde* de Rondelet *l.* 11. *c.* 4. *p.* 313. *Rhomboïdes*, que l'on vend à Rome ſous le nom de Turbot, *Rhombus*; le *Citharus* nommé *Folio* par Rondelet, qu'Artedi fait de la même eſpece que la *Limande*; il eſt aſſez commun à Rome; un autre *Folio* de couleur jaune, *Citharus flavus ſive aſper*, dit Rondelet *ibid. c.* 5. & 6. la *Pegouſe*, eſpece de *Sole*, qui a des figures d'yeux ſur la peau, *Solea aculeata*, dit Rondelet *ibid. c.* 12. l'*Arnogloſſus*, nommé *Perpeire* par Rondelet *ibid. c.* 14. autre eſpece de *Sole.*

## GENRE IV.

Poiſſons qui ont cinq oſſelets à la membrane des ouies, une nageoire ſur le dos, qui va de la tête à la queue, & d'autres nageoires à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue. Artedi leur donne le nom de *Coryphæna.*

1. LAMPUGO, nommé par Artedi *Genre I. Synon. p.* 28. *n.* 1. *Coryphæna caudâ bifurcâ.* C'eſt l'Ιππουρος d'Ariſtote *l.* 8. *c.* 15. d'Oppien *l.* 1. *p.* 8. d'Athenée *l.* 7. *p.* 305. l'*Hippurus* d'Ovide, de Pline *l.* 9. *c.* 16. *l.* 32.

*c.*

*c.* 11. de Rondelet *l.* 8. *c.* 19. *p.* 255. de Gesner *p.* 501. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 17. *p.* 306. de Jonston *l.* 1. *c.* 1. de Charleton *p.* 124. de Willughby *p.* 213. de Rai *p.* 100. le Poisson dont parle Aristote *l.* 4. *c.* 10. *l.* 8. *c.* 15. nommé *Equisele* & *Equiselis* est le même. Le *Guaracapema* du Bresil de Marcgrave, dont parlent Willughby *p.* 214. Rai *p.* 100. peut appartenir à cette espece de Poisson, ainsi que la *Dorado* ou *Aurantius Piscis* de Nieremberg.

2. RASOIR, Poisson nommé par Artedi *Genre I. Synon.* 2. *p.* 29. *Coryphæna palmaris, pulchrè varia, dorso acuto.* C'est la *Novacula* de Pline *l.* 32. *c.* 2. de Rondelet *l.* 5. *c.* 17. *p.* 146. de Gesner *p.* 628. 629. & 721. de Willughby *p.* 214. de Rai *p.* 101. Aldrovande *l.* 2. *c.* 27. *p.* 205. Jonston *l.* 1. *c.* 1. Salvien 217. Gesner *Paralip. p.* 24. disent qu'on le nomme à Rome *Pesce Pettine*, en Latin *Pecten.*

3. POMPILE, Poisson nommé par Artedi *Genre III. Synon.* 3. *p.* 29. *Coryphæna caudâ æquali, lineâ laterali curvâ.* C'est le Πομπιλος d'Elien *l.* 2. *c.* 15. *l.* 15. *c.* 23. d'Athenée *l.* 7. *p.* 282. 283. 284. d'Oppien *l.* 1. *p.* 8. le *Pompilus* d'Ovide, de Pline *l.* 32. *c.* 11. de Rondelet *l.* 8. *c.* 14. *p.* 250. de Gesner *p.* 881. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 19. *p.* 325. de Jonston *l.* 1. *c.* 2. de Charleton *p.* 124. de Willughby *p.* 215. de Rai *p.* 101.

## GENRE V.

Poissons qui ont huit osselets à la membrane des ouies, le ventre pointu & dentelé. Les Naturalistes, d'après Pline, leur donnent le nom de *Clupea.*

1. HARENG, Poisson nommé par Artedi *Synon. p.* 14. *Clupea maxillâ inferiore longiore, maculis nigris carens.* C'est le Χαλκις d'Aristote *l.* 4. *c.* 9. *l.* 6. *c.* 14. *l.* 8. *c.* 20. *l.* 9. *c.* 37. d'Elien *l.* 10. *c.* 11. *p.* 582. d'Athenée *l.* 7. *p.* 328. d'Oppien *Hal. l.* 1. *p.* 10. que Gaza a traduit par *Erica* ou *Ærica :* C'est le *Chalcis* de Pline *l.* 32. *c.* 11. de Wotton *l.* 8. *c.* 183. nommé *Allec* par Hildegarde *l.* 4. *Part. I. c.* 20. *p.* 91. *Halec* par Isidore

*Orig. l.* 12. *c.* 6. par Cuba *l.* 3. *c.* 42. & par Charleton *p.* 122. *Aringa* sur les rivages de l'Ocean Germanique, dit Jove *p.* 143. *Harengus* par Rondelet *l.* 7. *c.* 15. *p.* 222. Gesner, Schoneveld *p.* 36. & 37. Jonston *l.* 1. *tit.* 1. *c.* 1. Willughby *p.* 219. Rai *p.* 103. & Aldrovande *l.* 3. *c.* 10. *p.* 294. Les Suedois nomment ce Poisson *Sill*; les Allemands *Hering*, & *Haring*.

Le CELERIN de Rondelet *l.* 7. *c.* 13. *p.* 220. nommé Αφυς par Aristote *l.* 6. *c.* 15. *Chalcis* & *Celerinus* par Belon, *Membras* par Rondelet, Aldrovande *l.* 2. *c.* 31. *p.* 212. Gesner, Jonston *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. Charleton *p.* 143. & *Stromlingus* par Roberg *Pisc. p.* 4. 18. & 25. & *Stromming* en Suedois; le *Celerin*, dis-je, est de la même espece que le *Hareng*, & il n'en differe que par la petitesse. Voyez dans le *Dictionnaire des Animaux* l'histoire détaillée de la pêche des *Harengs*.

3. HWASSBUK des Suedois, Poisson nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 316. Artedi *Genre VII. Synon. p.* 17. *n.* 4. *Esp.* 33. *Clupea quadriuncialis, maxillâ inferiore longiore, ventre acutissimo.* Rai le nomme *Spratti Synop. Pisc. p.* 105.

3. ALOSE, Poisson nommé par Artedi *Genre III. Esp.* 34. *Synon.* 15. *n.* 2. *Clupea apice maxillæ superioris bifido, maculis nigris utrinque*, nommé Θρισσα par Aristote *l.* 9. *c.* 32. Elien *l.* 6. *c.* 32. *p.* 357. Athenée *l.* 4. *p.* 131. *l.* 7. *p.* 328. Oppien *Hal. l.* 1. *p.* 10. & Strabon; en Latin *Trissa*, selon Wotton *l.* 8. *c.* 183. *fol.* 162. Rondelet *l.* 7. *c.* 14. *p.* 220. Aldrovande *l.* 4. *c.* 4. *p.* 500. *Alosa* par Gaza, Salvien, Jonston *l.* 2. *tit.* 1. *c.* 3. Charleton *p.* 150. 151. Schoneveld *p.* 13. 14. Gesner *p.* 19. Ausone & Figula. L'*Alose* est encore nommée *Clupea* par Pline *l.* 9. *c.* 15. Salvien 103. Willughby *p.* 227. Rai *p.* 105. Aldrovande parle de l'*Alose* du Tibre *l.* 4. *c.* 4. *p.* 501. On la nomme à Venise & en Toscane *Clupea*; *Laccia* à Rome; en Espagne *Saccolos*; en Angleterre *Ashad*, *The mother*, ou *The Herrings*; en différens endroits de l'Allemagne, comme à Cologne, *Alfen*; ailleurs *Meyfisch*.

L'*Agone* ou *Agonus* de Salvien & des Naturalistes

plus modernes, paroît appartenir à l'eſpece des *Aloſes*, ainſi que le *Sarachus* ou *Sarachinus* de Charleton *p.* 165. qui paroiſſent être de jeunes *Aloſes*. C'eſt la remarque d'Artedi.

L'*Aloſa minor* du même Charleton *Onom. p.* 151. & le *Harengus minor* ou *Pilchardus* de Willughby *p.* 223. de Rai *p.* 104. & que les Anglois appellent *The Pilchard*, paroît auſſi appartenir à l'eſpece des *Aloſes*.

La *Sardine*, dont parle Columelle *l.* 8. *c.* 17. Rondelet *l.* 7. *c.* 12. *p.* 217. 218. Geſner *p.* 822. Willughby *p.* 224. Rai *p.* 104. Schoneveld *p.* 66. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Aldrovande *l.* 2. *c.* 38. *p.* 221. paroît auſſi ne differer du *Pilchard* que par la grandeur.

Nous avons un Poiſſon qu'on nomme à Paris *Pucelle*, *Feine* du côté de Rouen, *Demoiſelle* ailleurs. La multitude de ſes petites arrêtes fait qu'il n'eſt pas ſi eſtimé que l'*Aloſe*; il n'en a pas auſſi la bonté: il eſt du même Genre. Peutêtre eſt-ce celui que Belon & Geſner nomment *Pulchella*.

4. ANCHOIS, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 17. *n.* 3. *Clupea maxillâ ſuperiore longiore*; Ενκραυλος par Ariſtote *l.* 6. *c.* 15. Athenée *l.* 4. *c.* 148. *l.* 7. *p.* 285. 300. Εγγραυλεις ou Εγκεμβιχολοι par Elien *l.* 8. *c.* 18. *p.* 497. Λυκασομοι par le même *ibid.* *Halecula* par Belon; *Engraulis* par Wotton *l.* 3. *c.* 182. *fol.* 161. *Encraſicholi* par Rondelet *l.* 7. *c.* 4. *p.* 211. *Encraſicholus* par Aldrovande *l.* 2. *c.* 33. *p.* 214. Jonſton *l.* 1. *c.* 1. Charleton *p.* 144. Willughby *p.* 225. Rai *p.* 107. Les Anglois, les Suedois, & les autres, le nomment *Anchovies*.

## GENRE VI.

Poiſſons qui ont dix ou douze oſſelets à la membrane des ouies, la nageoire graſſe, & le corps tacheté. Ces Poiſſons ſont connus par les Naturaliſtes ſous le nom de *Salmo*.

1. SAUMON, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 306. par Artedi *Genre II. Synon. p.* 22. *n.* 1. *Eſp.* 48. *Salmo roſtro ultra inferiorem maxillam ſæpe*

*prominente.* C'eſt le *Salmo* de Pline *l. 9. c.* 18. d'Auſone, d'Hildegarde *l. 4. Part. I. c. 6. pag.* 89. d'Albert le Grand *Anim. l.* 24. de Cuba *l. 3. c.* 78. de Jove *p.* 143. de Wotton *l.* 8. *p.* 190. de Rondelet *part. II. p.* 167. de Salvien *fol.* 100. de Geſner *p.* 824. de Jonſton *l.* 2. *tit.* 1. *c.* 1. *p.* 106. de Charleton *p.* 150. de Willughby *p.* 189. 190. 191. 192. de Rai *p.* 63. Schoneveld *p.* 64. le nomme *Salmo nobilis.* Aldrovande *l.* 4. *c.* 1. *p.* 483. *Salmo vulgaris ;* Caſſiodore *l.* 3. *c.* 33. *Anchorago.* Albert & Cuba *l.* 3. *c.* 33. *Eriox* ou *Erox*, les Suedois *Lax*, les Finlandois *Lohi*, les Allemands *Lachs*, les Anglois *Salmon.* Salvien obſerve qu'on ne pêche point de *Saumon* dans la Méditerranée.

2. SAUMON gris, Poiſſon qui differe à peine du précédent ; nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 307. Artedi *Genr. XII. Synon. p.* 14. *n.* 2. *Salmo maculis cinereis, caudæ extremo æquali.* C'eſt le *Salmo cinereus* ou *griſeus* de Willughby *Ichth.* 193. Rai 63. que les Suedois nomment *Gaolax*, les Anglois *The Grey.*

3. TRUITE ſaumonée, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 308. & Artedi *Genre XII. Synon. p.* 24. *n.* 5. *Salmo latus, maculis rubris nigriſque, caudâ æquali ;* par Charleton *Onom.* 155. *Trutta Taurina ;* par Willughby *Ichth.* 193. *Trutta Salmonata*, & par Rai *p.* 63. en Suedois *Œrlax*, & *Boerting.*

4. TRUITE de riviere, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 309. & Artedi *Genre XII Synon. p.* 23. *n.* 3. *Salmo maxillâ inferiore paulo longiore, maculis rubris ;* par Cuba *l.* 3. *c.* 94. *f.* 91. *Tructa ;* par Iſidore *l.* 12. *c.* 6. *Trutta & Varius ;* par Figula *Thedo Truta, Forella ;* par Belon, Rondelet *Part. II. p.* 169. Geſner *p.* 1002. 1006. 1007. Aldrovande *l.* 5. *c.* 12. *p.* 589. Jonſton *l.* 3. *c.* 1. Willughby *p.* 199. Rai *p.* 65. Charleton *p.* 155. *Trutta fluviatilis.* Schoneveld en parle ſous le nom de *Forina* & de *Forio.* Les Suedois nomment la Truite *Forell*, *Stenbit*, & *Backro*, ſelon Artedi ; *Laxoering*, ſelon M. LINNÆUS.

5. Autre TRUITE de riviere, qui eſt le *Huch* des Allemands, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 25. *n.* 8. *Salmo oblongus, duabus dentium lineis in palato,*

*maculis tantummodo nigris.* C'eſt la *Trutta piſcinaria* de Geſner *p.* 1075. 1213. la *Trutta fluviatilis altera* d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 13. *p.* 572. de Jonſton *l.* 3. *tit.* 1. *c.* 2. de Willughby *p.* 199. Rai *p.* 65.

6. TRUITE ou SAUMON du Lac de Garde, ſelon Geſner; Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 24. *n.* 4. *Salmo pede minor, quinque dentium ordinibus in palato*; par Jove *p.* 122. *Carpio Benacinus*; par Belon Willughby *p.* 197. Rai *p.* 66. *Carpio lacus Benaci*; *Carpio* par Salvien 99. Rondelet *Part. II. p.* 158. Jonſton *l.* 3. *c.* 3. Charleton *p.* 164. Aldrovande en parle *l.* 5. *c.* 50. *p.* 656. en Italien *Carpione*, ſelon Salvien; en Anglois *Gilt charre.*

7. OMBRE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 310. *Salmo dorſo nigro, lateribus cæruleis, ventre fulvo*; & par Artedi *Genre XIII. Synon. p.* 25. *n.* 10. *Salmo vix pedalis, pinnis ventris rubris, maxillâ inferiore paulo longiore.* C'eſt l'*Umbla minor* de Geſner *p.* 1201. d'Aldrovande *p.* 650. de Charleton *Onom. p.* 163. de Willughby *p.* 196. de Rai *p.* 65. en Suedois *Rotele* & *Roding*; en Lapponie *Raud*, ſuivant M. LINNÆUS. Voyez Belon *de Aquat. l.* 2.

8. SALVELIN des Allemands, ſelon Rai *p.* 64. & M. LINNÆUS *Syſt. Nat.* autre eſpece d'*Ombre*, nommée par Artedi *Genre* 10. & *Synon. p.* 26. *n.* 11. *Salmo pedalis, maxillâ ſuperiore longiore*, à qui peutêtre l'eſpece ſuivante appartient.

9. SAUMON ou OMBRE du Lac de Genêve; Poiſſon nommée par Artedi *Synon. p.* 25. *n.* 7. *Salmo lineis lateralibus ſurſum recurvis, caudâ bifurcâ*; nommé par Rondelet *Part. II. p.* 160. *Salmo Lemani lacus ſive Umbla*; par Geſner 1004. & 1201. *Umbla major, ſive Salmo Lemani lacus*; par Jonſton *p.* 168. *Umbla vulgaris*; par Aldrovande *l.* 5. *c.* 47. *p.* 650. *Umbla minor prior*; & par Willughby *p.* 195. & Rai *p.* 64. *Umbla prior.*

10. TRUITE ou SAUMON du Lac de Genêve, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 25. *Salmo caudâ bifurcâ, maculis ſolum nigris, ſulco longitudinali in ventre.* Geſner *p.* 1003. & 1210. marque que quelques-uns nomment ce Poiſſon *Truite ſaumonnée.* Aldrovande *l.* 5. *c.* 49. *p.*

653. Jonſton *l.* 3. *tit.* 4. *c.* 2. Willughby *p.* 198. Rai *p.* 64. *n.* 4. en parlent. Charleton *p.* 155. le nomme *Truite ſaumonée & petit Saumon.* Il y a apparence que c'eſt le même Poiſſon dont Rondelet fait auſſi mention *Part. II. p.* 161.

11. Petit SAUMON. Il eſt ſemblable au *Saumon vulgaire n.* 1.

12. SALMARIN; en Latin *Salmerinus*; en Italien *Salmarino*, & *Salamandrino*, ſelon Salvien 101. & 102. nommé par Artedi *Synon. p.* 24. *n.* 6. *Salmo dorſo fulvo, maculis luteis, caudâ bifurcatâ.* Ce Poiſſon eſt connu à Trente dans le Tirol.

## GENRE VII.

Poiſſons qui ont ſept ou huit oſſelets à la membrane des ouies, la nageoire graſſe, des dents aux machoires, & la langue au palais. Artedi en parle ſous le nom *Oſmerus.*

1. ÉPERLAN, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 21. *n.* 1. *Oſmerus radiis pinnæ ani ſeptemdecim; Eperlanus* par Rondelet *Part. II. p.* 136. Geſner *p.* 362. 430. Aldrovande *l.* 4. *c.* 12. *p.* 536. Jonſton *l.* 4. *tit.* 2. *c.* 2. Charleton *p.* 153. Willughby *p.* 202. Rai *p.* 66. Geſner *Paralip. p.* 29. 30. Jonſton, Schoneveld *p.* 70. Roberg *Piſc. p.* 21. en parlent ſous le nom de *Spirinchus.* Les Suedois le nomment *Nars*, les Danois *Smelte*; les Allemands *Stint*, *Stinckfiſch*; les Hollandois *Spiring*, les Friſons *Spirinch*, les Anglois *Smel.* L'*Eperlan* de Rouen eſt fort eſtimé, ſurtout celui qui ſe pêche aux environs de Caudebec.

2. SAURE ou LÉZARD étranger, nommé par Artedi *Oſmerus radiis pinnæ ani undecim.* Ce peut être le Σαυρος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 2. d'Elien *l.* 12. *c.* 25. *p.* 718. le *Sauris* de Speuſippe dans Athenée *l.* 7. *fol.* 161. le *Lacertus peregrinus* de Rondelet *l.* 15. *c.* 9. *p.* 428. de Geſner *p.* 468. le *Saurus* de Salvien *fol.* 239. 242. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 56. *p.* 277. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. On nomme ce Poiſſon *Tarantola* à Rome, diſent Willughby *app. p.* 29. & Rai *p.* 66.

## GENRE VIII.

Poiſſons qui ont huit oſſelets à la membrane des ouies, la nageoire graſſe, les dents très-petites, & paroiſſant à peine. Artedi leur donne le nom de *Coregonus*, du Grec κορη, *pupilla oculi*, & γωνια, *angulus*, parceque ces Poiſſons ont la prunelle de l'œil formée en angle pointu.

1. LAVARET, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 312. & Artedi *Genre X.* & *Synon. p.* 19. *n.* 2. *Coregonus maxillâ ſuperiore longiore planâ, pinnâ dorſi oſſiculorum quatuordecim.* C'eſt le *Lavaretus* de Belon, Geſner, Rondelet *Part. II. p.* 162. le *Lavaret* des Allobroges ou Savoyards, dont parlent Aldrovande *l.* 5. *c.* 51. *p.* 657. Jonſton *l.* 3. *tit.* 4. *c.* 4. *p.* 171. Charleton *p.* 163. Willughby *p.* 183. Rai *p.* 61. Les Allemands le nomment *Gangfiſch*, les Bavarois *Rhingau*, les Suedois *Sijk*, *Stor-Sijk*.

L'*Albula nobilis* de Geſner *p.* 33. de Schoneveld *p.* 12. de Jonſton & de Rai *p.* 60. & l'*Albula major* & *nobilis* & *lautus* de Schoneveld, celui que Roberg *Piſc. p.* 23. nomme *Abbula* & *Sicus p.* 24. ſont, dit Artedi, de la même eſpece que le *Lavaret*, & ce ne ſont proprement que des noms ſynonymes que les Auteurs lui ont donnés. Les Suedois nomment l'*Albula nobilis* en leur langue *Sik*; les Danois *Snebbel* & *Helte*; à Conſtance *Adelfiſch oder ein weiſſer Blawling*; à Zurich *Wyſſfiſch*; ailleurs *Snepel*.

La BEZOLE du Lac de Genêve paroît auſſi être le même Poiſſon que l'*Albula nobilis*, dit Artedi, qui marque que ce ſont noms ſynonymes. Rondelet *Part. II. p.* 163. Geſner 31. Aldrovande *l.* 5. *c.* 52. *p.* 658. Jonſton *l.* 3. *tit.* 4. *c.* 4. *p.* 171. Charleton *p.* 164. parlent de la *Bezole*, nommée *Albula cærulea* par Willughby *p.* 185. Rai *p.* 61. On nomme ce Poiſſon *Blawling* & *Felchen* à Zurich, & *Bezole* en Savoye.

Le petit *Albula* du Lac de Zurich paroît auſſi appartenir à la même eſpece, dit Artedi. Geſner *p.* 34.

Aldrovande *l.* 5. *c.* 53. Jonſton *l.* 3. *tit.* 4. *c.* 5. *p.* 173. Charleton *p.* 164. Rai *p.* 61. Willughby *p.* 184. parlent de ce petit *Albula*, qu'on nomme à Zurich *Albelen*, & *Weiſsgangfiſch*.

Il y a un autre petit Poiſſon du Lac de Genêve, dont parle Rondelet *Part. II. p.* 164. Geſner *p.* 31. & 35. Aldrovande *l.* 5. *c.* 56. *p.* 663. Charleton *p.* 164. Jonſton *l.* 3. *c.* 6. *p.* 174. Willughby *p.* 185. Rai *p.* 62. Il eſt nommé par ces Naturaliſtes *Farra* ou *Ferra*, ou *Pala*. Artedi ne ſait ſi c'eſt un Poiſſon d'une eſpece différente de celle des précédents. Rai penſe que le petit *Albula* appartient plutôt au *Farra* qu'au *Lavaret*.

Le *Curimata* du Breſil, dont parle Marcgrave, peut bien être de la même eſpece que le *Farra*.

Le *Guiniad* de la Province de Galles en Angleterre, dont parle Willughby *p.* 183. paroît auſſi, ſelon Artedi, être le même Poiſſon que le *Farra*.

2. Très-petit *Albula*, Poiſſon nommée par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 312. & par Artedi *Genre IX. Syn. p.* 18. *n.* 1. *Eſp.* 40. *Coregonus maxillâ inferiore longiore*. C'eſt l'*Albula minima* de Geſner 34. d'Aldrovande 660. de Jonſton 173. de Charleton *Onom.* 164. de Willughby 186. de Rai 61. Les Suedois le nomment *Sijkloeja*, *Smaoſijk*; en Dalekarlie, Province de Suede, *Blikta*; en Norlande *Stint*; en Finlande *Moiku*. Ce Poiſſon fraye au commencement de l'hiver, & on en pêche beaucoup dans les Lacs de Suede, dit M. LINNÆUS.

3. TOMELO, Poiſſon que M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 314. & Artedi *Genre X. Synon. p.* 20. *n.* 3. & *Eſp.* 41. nomment *Coregonus maxillâ ſuperiore longiore, pinnâ dorſi oſſiculorum viginti trium*. C'eſt le Θυμαλλος d'Elien *l.* 14. *c.* 22. *pag.* 831 qu'il nomme auſſi Θυμος *l.* 12. *c.* 49. en Latin *Thymus* par Rondelet *Part. II. p.* 187. *Thymus* & *Thymallus* par Salvien 81. Geſner 978. Aldrovande 594. Jonſton, Charleton *Onom.* 155. Willughby 187. Rai 62. le Comte de Marſilly *p.* 75. en Suedois *Harr*; en Allemand *Aſch*; en Anglois *Grayling*; en Italien *Temolo*.

L'*Ombre de riviere* de Wotton *l.* 8. *c.* 173. de Belon,

Rondelet *Part. II. p.* 172. de Gesner 1032. 1033. d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 15. *p.* 596. de Jonston *l.* 3. *tit.* 1. *c.* 4. de Willughby *p.* 188. & de Rai, est de la même espece.

4. HAUTIN ou OUTIN, nom qu'on donne à Anvers & dans toute la Flandre, à un Poisson nommé par Artedi *Synon. p.* 21. *n.* 4. *Coregonus maxillâ superiore longiore conicâ.* C'est l'*Oxyrhynchus* de Gesner *p.* 771, de Willughby *p.* 187. de Rai *p.* 62. de Rondelet, d'Aldrovande *l.* 5. *c.* 24. *p.* 609. de Jonston *l.* 3. *c.* 9. de Charleton *p.* 156.

5. ALBULA d'Amboïne, nommé par Artedi *Esp. p.* 44. & *Synon. p.* 21. *n.* 5. *Coregonus Amboïnensis.* La largeur de sa tête & de son corps est plus perpendiculaire que transversale, dit Artedi.

6. WIMBA, Poisson du même Genre, dont il est parlé dans le voyage de W-gothie *p.* 231. dit M. LINNÆUS *Syst. Nat. p.* 51. *n.* 136.-6.

## GENRE IX.

Poissons qui ont douze ou quatorze osselets à la membrane des ouies, des nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, & à la queue. Les Naturalistes leur donnent le nom d'*Esox*, qui vient du verbe *esitare*, manger.

1. BROCHET, Poisson nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 304. & Artedi *Genre XIV. Synon. p.* 26. *n.* 1. *Esp.* 53. *Esox rostro plagioplateo.* Pline *l.* 9. *c.* 15. le nomme *Esox.* Elien *l.* 10. *c.* 46. *p.* 623. & *l.* 11. *c.* 24. *p.* 669. le nomme Οξυρυγχος, ainsi qu'Athenée *l.* 7. *c.* 312. Elien parle de celui qui se pêche dans la Mer rouge, du *Brochet* du Nil, & du *Brochet* de la Mer Caspienne. Le Σφυραινα d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. peut être le même Poisson. Le *Brochet* est le *Lucius* de Cuba *l.* 3. *c.* 52. de Figula, de Wotton *l.* 8. *p.* 190. de Belon, de Rondelet *Part. II. p.* 188. Salvien *fol.* 94. Gesner *p.* 500. 501. Schoneveld *p.* 44. Aldrovande *l.* 5. *c.* 39. *p.* 630. 635. Jonston *l.* 3. *tit.* 3. *c.* 5. Charleton *p.* 162.

Willughby *p.* 236. Rai *p.* 112. Les Suedois le nomment *Giad*, les Danois *Gedde*, les Allemands *Hecht*, les Hollandois *Snoeck*, les Anglois *The Pike* ou *Pickerell*, les Italiens *Luzzo* & *Lucio.*

2. ÉGUILLE, premiere eſpece, nommée par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 305. & par Artedi *Genre XIV. Synon. p.* 27. *n.* 2. *Eſox roſtro cuſpidato gracili ſubtereti & ſpithamali.* C'eſt le Βελονη d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 15. *l.* 5. *c.* 11. l. 6. *c.* 13. 17. *l.* 9. *c.* 14. le Βελονη Θαλαττια d'Elien *l.* 9. *c.* 60. *p.* 565. le Ραφις d'Oppien *l.* 1. *p.* 7. & d'Athenée *l.* 7. *p.* 319. Pline *l.* 9. *c.* 51. *l.* 32. *c.* 11. le nomme *Belone* & *Acus.* Albert le Grand *l.* 4. *de Anim.* Cuba *l.* 3. *c.* 8. *Ahaniger.* Wotton *l.* 8. *c.* 166. *p.* 166. Gaza, Jove, Salvien, Charleton, en parlent ſous le nom d'*Acus.* C'eſt la premiere eſpece d'*Eguille* de Rondelet *l.* 8. *c.* 3. *p.* 227. de Geſner *p.* 9. & 10. de Schoneveld *p.* 11. d'Aldrovande *l.* 1. *c.* 23. de Willughby *p.* 231. de Rai *p.* 109. & de Jonſton *l.* 1. *tit.* 2. *c.* 1. Les Suedois le nomment *Nabbgiadda*, les Hambourgeois *Hornfisk*, les Anglois *Garfish* ou *Hornfish*, à Rome *Acuella*, à Veniſe *Anguſicula.*

3. Très-grande ÉGUILLE écailleuſe, nommée par Liſter *Append.* Willughby *p.* 22. & Rai 109. *Acus maxima ſquammoſa*, & par Artedi *Eſox maxillâ ſuperiore longiore, caudâ quadratâ.*

## GENRE X.

Poiſſon qui a environ neuf oſſelets à la membrane des ouies, le haut de la tête plat, avec des ſtries rudes qui traverſent.

REMORA. C'eſt l'Εχενηις d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 14. d'Elien *l.* 2. *c.* 17. *p.* 95. d'Oppien *Hal. l.* 1. *p.* 9. *Echeneis* par Pline *l.* 9. *c.* 25. *l.* 32. *c.* 1. Ambroſ. *in Hex. l.* 5. *c.* 10. *p.* 59. Wotton *l.* 8. *c.* 166. Cuba *l.* 3. *c.* 34. *Remora* par Gaza, Aldrovande *l.* 3. *c.* 22. *p.* 336. Rai *p.* 71. Rondelet *l.* 15. *c.* 18. *p.* 436. Jonſton *l.* 1. *tit.* 1. *c.* 2. Geſner *p.* 345. Charleton *p.* 125. On en trouve la deſcription dans les *Amœnitates* de M. LINNÆUS *Tom.* 1. *Muſ. Princ. p.* 320. *n.* 54.

C'eſt auſſi l'*Iperuguiba* & *Piraguiba* du Breſil, ſelon Marcgrave *l.* 4. *c.* 18. & Willughby *p.* 119.

Cuba *l.* 3. *c.* 1. nomme ce Poiſſon *Achandes*, les Anglois *Sucking-fish*, les Hollandois *Suyger*, les Portugais *Piexe Pogador* & *Pioltho*.

## GENRE XI.

Poiſſon qui a dix oſſelets à la membrane des ouies, les nageoires de la poitrine de la longueur du corps.

EXOCET, Poiſſon nommé Ἀδωνις & Ἐξωκοιτος par Elien *l.* 9. *c.* 36 *p.* 544. Oppien *l.* 1. *p.* 7. Athenée *l.* 1. *p.* 325. C'eſt l'*Exocætus* & *Adonis* de Pline *l.* 9. *c.* 19. de Jonſton *l.* 1. *c.* 1. de Willughby *p.* 135. de Rai *p.* 13. Rondelet *l.* 6. *c.* 15. *p.* 193. Charleton *p.* 135. Geſner *p.* 13. 15.

Le *Muge volant* de Rondelet *l.* 9. *c.* 6. *p.* 267. de Willughby *p.* 233. de Geſner *p.* 553. l'*Hirondelle* de Pline *l.* 9. *c.* 26. 51. *l.* 32. *c.* 11. de Salvien *fol.* 185. 186. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 6. *p.* 144. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. de Charleton *p.* 139. ſont du même Genre. Les Anglois le nomment *Fling-fish*; les Italiens *Peſce Rondine*. Salvien ſoutient que ce Poiſſon, c'eſt-à-dire le *Muge volant* ou l'*Hirondelle*, eſt le Χελιδων des Anciens.

## GENRE XII.

Poiſſons qui ont dix oſſelets à la membrane des ouies, le corps rond, l'anus voiſin de la queue, des dents à la langue & au Palais.

HAUTIN, nom que Belon & Rondelet *l.* 8. *c.* 2. *p.* 227. donnent à la ſeconde eſpece de *Sphyrene*. C'eſt un petit Poiſſon, nommé *Argentina* à Rome. Geſner *p.* 883. Willughby *p.* 229. Rai *p.* 108. en parlent ſous le nom de *Sphyræna parva*, ou *Sphyræna ſecunda ſpecies*.

M. LINNÆUS *Tom. I. des Amœnit. Muſ. Princ. p.* 321. *n.* 55. parle d'une eſpece de Poiſſon de ce Genre, qu'il nomme *Argentina pinnâ dorſali, pinnæ ani oppoſitâ*.

## GENRE XIII.

Poiſſons qui ont cinq oſſelets à la membrane des ouies, dont le premier eſt le plus large, le corps ſerré, & deux barbillons.

1. LOCHE à piquants, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 333. *Cobitis aculeo bifurco infra utrumque oculum*; & par Artedi *Genre IV. Synon. p.* 3. *n.* 2. *Eſp.* 4. C'eſt le *Cobitis aculeata altera* de Rondelet *Part. II. p.* 204. Geſner *p.* 404. & 482. Charleton *p.* 157. Jonſton *l.* 3. *tit.* 1. *c.* 12. Willughby *p.* 265. Rai *p.* 124. La *Tania cornuta* de Schoneveld *p.* 74. de Willughby *p.* 266. de Rai *p.* 124. eſt du même Genre, & peutêtre le *Steinbiza* de Hildegarde *l.* 4. *Part. I. c.* 22. *p.* 92. Les Suedois, proche du Lac Melerus, le nomment *Taonglake*, les Allemands *Steinbeiſſer*, *Schneerputte* ou *Steimpicker.*

2. LOCHE franche, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun Suec. n.* 332. & par Artedi *Genr. II. Syn. p.* 2. *n.* 1. *Cobitis tota glabra maculoſa, corpore ſubtereti.* C'eſt le *Cobitis barbatula* de Rondelet *part. II. p.* 204. de Geſner *p.* 404. d'Aldrovande *p.* 618. de Jonſton *l.* 3. *tit.* 1. *c.* 12. de Charleton *p.* 157. de Schoneveld *p.* 31. de Willughby *p.* 265. de Rai *p.* 124. Figula le nomme *Fundulus* ou *Grundulus*; les Allemands *Grundel*, *Grundling*, *Smerle*, *Smerling*; les Anglois *The Loche* ou *Grounling.*

3. MISGURN ou FISGURN des Allemands, Poiſſon de la figure d'une *Lamproie*, qu'on voit à Nieremberg & à Ratiſbone, diſent Willughby *p.* 118. & Rai *p.* 70. nommé par Artedi *Synon. p.* 3. *n.* 3. *Cobitis cæruleſcens, lineis utrinque nigris longitudinalibus.* La *Muſtela foſſilis*, que les Allemands nomment *Peiſcher* ou *Beiſsher*, diſent Geſner, Willughby *p.* 124. Rai *p.* 69. Aldrovande *l.* 5. *c.* 7. *p.* 579. eſt du même Genre; c'eſt peutêtre la *Pœcilia* de Schoneveld *p.* 56.

## GENRE XIV.

Poiſſons qui ont cinq oſſelets à la membrane des ouies, point de nageoires au ventre, celles du dos ſont de la longueur du dos.

FIATOLA, Poiſſon ſemblable à la *Saupe*, qui eſt le Στρωματευς d'Athenée *l.* 7. *p.* 322. C'eſt le *Stromateus* de Rondelet *l.* 5. *c.* 24. *p.* 157. de Geſner *p.* 925. & 1109. d'Aldrovande *l.* 2. *c.* 22. *p.* 192. de Willughby *p.* 156. de Rai *p.* 50. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. de Charleton *Onom. p.* 142.

Le *Callichthys* de Belon, Geſner *p.* 134. & d'Aldrovande; un autre Poiſſon qu'on nomme auſſi *Fiatola* à Rome, & dont parlent Belon, Geſner *p.* 925. Rondelet *l.* 8. *c.* 21. *p.* 257. Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 1. ſont du même Genre, & ne different que par quelques varietés. Le *Stromateus* eſt nommé *Licette* à Veniſe, & *Lampuga* à Rome.

On trouve le *Tamoata* du Breſil dans le *Syſtême* de M. LINNÆUS *p.* 52. ſous le nom de *Stromateus*, & le même Naturaliſte le place auſſi dans l'Ordre des Poiſſons à nageoires épineuſes, ſous le nom de *Callichthys*. Sont-ce deux *Tamoata*? C'eſt ce que j'ignore. Celui dont le Savant Suedois donne la deſcription dans ſes *Amœnitates Tom. I.* a les nageoires épineuſes.

## GENRE XV.

Poiſſon qui ont cinq oſſelets à la membrane des ouies, & point de nageoires au dos & au ventre.

CARAPO du Breſil, dont parle Rai *p.* 41. d'après Marcgrave *p.* 110. & Piſon *p.* 72. M. LINNÆUS en donne la deſcription dans ſes *Amœnitates Tom. I. p.* 318. *n.* 52. & la figure *Tab. II. n.* 6.

## GENRE XVI.

Poiſſon qui a environ ſix oſſelets à la membrane des ouies, la queue carrée, & des nageoires au dos, à la poitrine, au ventre, à l'anus, & à la queue.

LOUP marin, *Lupus marinus*, ſelon Schoneveld *p.* 45. Jonſton, Willughby *p.* 130. Rai *p.* 40. nommé *Anarrhichas*, *Scanſor* par Geſner, *Rheinfish* en Allemand, *Sea-wolf* en Anglois.

## GENRE XVII.

Poiſſon qui a ſept oſſelets à la membrane des ouies, & qui eſt ſans nageoires au ventre.

AMMODYTES, *Ammodytes*, ou ANGUILLE de ſable des Anglois; *Piſcis Sanditz Anglorum*, ſelon Salvien 70. Aldrovande *l.* 2. *c.* 49. *p.* 252. 254. Jonſton *l.* 1. *tit.* 3. *c.* 3. Geſner *Paralip. p.* 3. Willughby *p.* 113. Rai *p.* 38. en parlent ſous le nom *Ammodytes*. Charleton *p.* 146. ſous celui de *Anguilla de arenâ*. Schoneveld *p.* 76. appelle ce Poiſſon *Tobianus*. Les Anglois le nomment *Sand-Eels* ou *Launces*; les petits *Grigs*. Les Suedois *Tobis*. Salvien eſt le premier qui nous ait donné la deſcription de ce Poiſſon; mais la figure qu'il en donne n'eſt pas exacte. Il lui donne deux nageoires ſur le dos, & il n'en a qu'une. M. LINNÆUS en parle *Faun. Suec. n.* 303. Artedi *Genre XVI. Synon. p.* 29. *Eſp.* 55.

## GENRE XVIII.

Poiſſons qui ont dix oſſelets à la membrane des ouies, les trous des narines en forme de tubes, & placés au bout de la machoire ſupérieure.

1. ANGUILLE, Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 290. par Artedi *Genr.* 24. *Syn. p.* 39. *n.* 1.

& *Espec. 66. Murœna unicolor, maxillâ inferiore longiore.* C'est l'Εγχελυς d'Homere *Iliad. l.* 21. d'Aristote *l.* 5. *c.* 5. *l.* 2. *c.* 13. 15. 17. *l.* 4. *c.* 8. 11. *l.* 6. *c.* 13. 16. *l.* 8. *c.* 2. d'Athenée *l.* 7. *p.* 297. 298. 299. d'Elien *l.* 14. *c.* 8. *p.* 809. d'Oppien *Hal. l.* 1. *p.* 6. 19. en Latin *Anguilla* par Plaute, Varron *l.* 4. Juvenal, Pline *l.* 9. *c.* 20. 21. 22. 51. *l.* 32. *c.* 2. Ambrof. *in Hexam. l.* 5. *c.* 2. *p.* 52. Macrob. *Satur. l.* 3. *c.* 15. Isidore, Hildegarde *l.* 4. *Part. I. c.* 24. *p.* 92. Cuba *l.* 3. *c.* 2. *f.* 71. Paul Jove *c.* 33. *p.* 106. Cajus Figula, Wotton *l.* 8. *c.* 166. Belon, Rondelet *Part. II. p.* 198. Salvien *fol.* 64. Gesner *p.* 40. Schoneveld *p.* 14. Aldrovande *l.* 4. *c.* 14. *p.* 544. Jonston *l.* 2. *tit.* 2. *c.* 4. *p.* 114. Charleton *p.* 153. Willughby *p.* 109. Rai *p.* 37. Roberg *Pisc. p.* 4. Les Suedois nomment l'*Anguille* en leur langue *Al*, les Allemands *Ahl*, les Anglois *Eel.*

2. CONGRE, Poisson nommé par Artedi *Synon. p.* 40. *n.* 2. *Murœna supremâ margine pinnæ dorsalis nigrâ.* C'est le Κογγρος d'Aristote *l.* 1. *c.* 5. *l.* 2. *c.* 3. 15. 17. *l.* 3. *c.* 10. *l.* 6. *c.* 17. *l.* 8. *c.* 12. 13. 15. *l.* 9. *c.* 2. d'Athenée *l.* 7. *p.* 288. d'Oppien *l.* 1. *p.* 5. & 20. en Latin *Conger* par Plaute, Terence, Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 16. 20. Isidore, Albert le Grand, Cuba *l.* 3. *c.* 22. Paul Jove *c.* 30. *p.* 102. Belon, Wotton *l.* 8. *c.* 166. Rondelet *l.* 14. *c.* 1. *p.* 394. Salvien *fol.* 66. Gesner *p.* 290. Jonston *l.* 1. *tit.* 1. *c.* 2. Charleton *p.* 125. Willughby *p.* 111. Rai *p.* 37. Aldrovande *l.* 3. *c.* 25. *p.* 349. en Anglois *Conger Eel*, à Rome *Bronco.*

3. MYRUS, espece de Murene, nommée par Artedi *Synon. p.* 40. *n.* 3. *Murœna rostro acuto lituris albidis vario, margine pinnæ dorsalis nigrâ.* C'est le Μυρος d'Aristote *l.* 5. *c.* 10. d'Elien *l.* 14. *c.* 15. *p.* 810. d'Athenée *l.* 7. *p.* 312. en Latin *Smyrus* par Pline *l.* 32. *c.* 11. & *Myrus l.* 9. *c.* 3. Voyez sur ce Poisson Rondelet *l.* 14. *c.* 6. *p.* 407. Gesner *p.* 577. 680. Jonston *l.* 1. *tit.* 1. *c.* 2. Charleton *p.* 126. Willughby *p.* 109. Rai *p.* 37.

Artedi observe que le *Serpens marinus alter* de Willughby *p.* 108. & de Rai *p.* 36. est de la même espece

que le *Myrus*, & que tous les deux ne ſont que des varietés.

4. SERPENT marin, Poiſſon nommé par Artedi *Syn. p.* 41. *n.* 4. *Muræna exactè teres, caudâ acutâ apterygiâ.* C'eſt l'Οφις θαλαττιος d'Ariſtote *l.* 2. *c.* 14. *l.* 9. *c.* 37. le *Serpens marina* & *marinus* de Salvien *fol.* 57. & 58. de Belon, Rondelet *l.* 14. *c.* 7. *p.* 409. de Geſner *p.* 862. 864. 1037. d'Aldrovande *l.* 3. *c.* 24. *p.* 346. de Jonſton *l.* 1. *tit.* 1. *c.* 2. *Serp. l.* 1. *tit.* 2. *c.* 2. Charleton *Onom. p.* 125. Willughby *p.* 107. Rai *p.* 36.

5. SERPENT marin tacheté, nommé par Artedi *Syn. p.* 41. *n.* 5. *Muræna teres gracilis maculoſâ, caudâ tereti cuſpidatâ apterygiâ.* C'eſt le *Serpens marinus maculoſus* de Liſter, dont parlent Willughby *Append. p.* 91. Rai *p.* 37.

Seba *Theſ. II. Tab.* 69. *n.* 1. 2. 3. 4. 5. & *Tab.* 70. *n.* 1. 2. 3. donne le nom de *Serpens marins* à pluſieurs eſpeces de *Congres* & de *Murenes*. Le même Auteur parle *Theſ. II. Tab.* 40. *n.* 3. & 4. d'une *Anguille* monſtrueuſe, qui a la figure d'un *Serpent*, & qu'il prend pour tel. Il en parle ſous le nom d'*Anguina*.

6. MURENE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 41. *Muræna pinnis pectoralibus carens* C'eſt le Μυραινα d'Ariſtote *l.* 1. *c.* 5. *l.* 2. *c.* 13. 15. *l.* 3. *c.* 10. *l.* 5. *c.* 10. *l.* 8. *c.* 2. 13. 15. *l.* 9. *c.* 2. d'Elien *l.* 1. *c.* 32. 50. *l.* 9. *c.* 40. 66. d'Athenée *l.* 7. *p.* 312. d'Oppien *l.* 1. *p.* 21. *l.* 8. *p.* 39. en Latin *Muræna* par Plaute, Columelle *l.* 8. *c.* 16. Ciceron, Varron *Ruſt. l.* 2. *c.* 6. Ovide, Pline *l.* 9. *c.* 16. 19. 20. 23. 54. 55. *l.* 32. *c.* 2. 5. 7. 8. Ambroſ. Macrobe, Cajus Figula, Belon, Rondelet *l.* 14. *c.* 5. *p.* 402. Salvien *fol.* 59. 60. Geſner *p.* 575. Jonſton *l.* 1. *tit.* 2. Charleton *p.* 126. Willughby *p.* 103. Rai *p.* 34. Cuba *l.* 3. *c.* 58. Paul Jove *c.* 31. *p.* 103. Wotton *l.* 8. *c.* 166. Aldrovande *l.* 3. *c.* 27. *p.* 357. qui parle du mâle & de la femelle.

GENRE

## GENRE XIX.

Poiſſons qui ont ſix oſſelets à la membrane des ouies ; une ſeule petite nageoire à l'extrémité de la queue.

ANABLEPS, Poiſſon qui ſe trouve décrit dans Seba.

## GENRE XX.

Poiſſons auſquels Artedi *Nom. Gen. p.* 73. donne le nom de *Syngnatus*, du Grec συν, *unâ*, enſemble ; & γναθος, *maxillâ*, parce qu'ils ont les deux machoires tellement unies enſemble, que l'ouverture de la bouche ne paroît qu'au bout.

1. HIPPOCAMBE, Poiſſon nommé par Artedi *Synon. p.* 1. *n.* 1. *Syngnatus corpore quadrangulo, pinnâ caudæ carens.* C'eſt l'Ιπποκαμπος d'Elien *l.* 14. *c.* 14. en Latin *Hippocampus* par Belon, Rondelet *Inſect. c.* 9. *p.* 114. Geſner *p.* 114. Charleton *Inſect. p.* 59. Willughby 157. Rai *p.* 45. Cuba *l.* 3. *c.* 103. le nomme *Zidrach*, les Italiens *Cavallo marino.*

2. VIPERE marine de Willughby *p.* 160. nommée en Anglois *Sea-Adder* dans la Province de Cornouaille ; petit Poiſſon du Genre de l'*Eguille* d'Ariſtote, qui a la figure d'un *Ver*, & nommé par Rai 47. *Ophidion lumbriciforme* par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 334. & Artedi *Synon. p.* 2. *n.* 4. *Syngnatus teres, pinnis pectoralibus caudâque carens.* Les Suedois nomment ce petit Poiſſon *Hafsnaohl.*

3. TIPHLE de Geſner 1025. qui, ſelon Willughby *Ichth. p.* 159. & Rai *Piſc.* p. 46. eſt une grande eſpece d'*Eguille* d'Ariſtote, que M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 335. & Artedi *Syn. p.* 2. *n.* 3. nomment *Syngnatus corpore medio heptagono, caudâ pinnatâ* ; en Suedois *Kantnaohl.* Ce Poiſſon, ainſi que le précédent & le ſuivant, ſe trouvent dans la Mer Baltique.

4. TROMPETTE de Mer, & *Gagnola* à Marſeille,

dit Rondelet *l.* 8. *c.* 4. *p.* 229. Poiſſon nommé par M. LINNÆUS *Faun. Suec. n.* 336. & Artedi *Genre I. Syn. p.* 1. *n.* 2. *Syngnatus corpore medio hexagono, caudâ pinnatâ.* C'eſt l'*Acus* d'Ariſtote, ſelon Aldrovande *Ichth. p.* 105. Jonſton *Piſc.* 52. Willughby *Ichth.* 158. Rai *Piſc.* 46. Geſner *p.* 9. & 11. le *Piſcis ſeptimus* de Salvien *Piſc.* 68. Schoneveld *p.* 11. le nomme *Nerophidion*; Belon & Geſner *p.* 11. *Triphle marina*; Pline *l.* 31. *c.* 11. *Sphondylus*; Gillius *Nom. c.* 65. *Serpens marinus.*

*Fin du premier Volume.*

# TABLES
## DU PREMIER VOLUME.

## TABLE DE LA CLASSE DES QUADRUPEDES,

*Suivant les Ordres, les Genres, & les Eſpeces, où M. KLEIN les a mis, & ceux de M. LINNÆUS.*

A.


ABADA, nom qu'on donne dans l'Iſle de Java au Rhinoceros. *Ord. I. Fam. III. pag.* 19.
Acuti ou Aguti, Lapin du Breſil. *Ordr. II. Fam. III. n.* II-2. *p.* 28.
Ægipanes. *Ord. II. Fam. IV. p.* 62.
Agneau. *Ord. I. Fam.* II. *n. II. p.* 7.
Ai, Bradype, ou Pareſſeux. *Ord. II. Fam. II. n. I. p.* 23.
Alcé ou Elan. *Ord. I. Fam. II. n. IV.*-D. *p.* 16.
Alco. Voyez *Chien p.* 50.
Algazel, Gazelle d'Afrique *p.* 11.
Alicorne, nom du Rhinoceros. *p.* 19.
Andira-Guacu, eſpece de Chauve Souris. *p.* 41.
Ane. *Ord. I. Fam. I. n. II.*-A. *p.* 4.
Ane ſauvage. *ibid. n. II.*-C. *p.* 4.
Ante chez les Portugais du Breſil, le même que le Dante des Eſpagnols, Animal ſans cornes. Voyez *Dante.*
Antilope. Voyez Gazelle *p.* 11.
Aparea, eſpece de Lapin *p.* 28.
Armandille ou Tatou *p.* 25. ou 26.
Aytotchtly, Tatou de l'Amérique *p.* 26.

## B.

BABOON ou Babuin, *Ord. II. Fam. IV. p. 65. n. 13.*
Babyrouſſa, Sanglier de l'Iſle de Bouro aux Indes Orientales, *Ord. I. Fam. III n. V.-C p. 18.*
Baris ou Barris, Singe, *Ord. II. Fam. IV. n XII. p. 62.*
Behemot ou Hippopotame, ſelon Bochard & Grew, *Ord. I. Fam. IV. p. 19.*
Belette vulgaire, *Ord. II. Fam. IV. n. III.-1. p. 44.*
Belette vulgaire blanche, *ibid.-2. p. 44.*
Belier, *Ord. I. Fam. II. n. II. p. 7.*
Belier d'Orient, *ibid. p. 8.*
Belier de Candie, *ibid. p. 8.*
Belier d'Italie, *ibid p. 8.*
Belier blanc, *ibid. p. 8.*
Beſchet. Voyez *Chameau. Ord. II. Fam. I. n. I.-1. p. 21.*
Bête à la grande dent, ou Roſmarus, *Ord. II. Fam. V. n. III. p. 67.*
Bievre ou Caſtor, *Ord. II. Fam. V. n. II. p. 67.*
Biſon, Uron Biſon, *Ord. I. Fam. II. n. I.-B. p. 6.*
Biſon de l'Amérique, *Ord I. Fam. II. n. I.-B. p. 7.*
Blaireau, *Ord. II. Fam. IV. VIII. p. 54. n. 6.*
Bonaſus, *Ord. I Fam. II. n. I.-B. p. 7.*
Bœuf, Ord. I. Fam. II n. I-A. p. 5.
Bœuf marin, Lamentin, ou Manati, *Ord. II. Fam. V. n. V. p. 68.*
Bouc. *Ord. I. Fam. II. n. III. p. 9.*
Boucs ſauvages, *ibid. p. 9.*
Bouc-Etain, *ibid. p. 9.*
Bouc-Cerf; ou Tragelaphe, *ibid. G. p. 9.*
Boucs de Guinée, *ibid. H. p. 13.*
Bouc de Goa, *Ord. II. Fam. II. p. 12.*
Bradype, ou Pareſſeux, ou Ai, *Ord. II. Fam. II. n. I. p. 23.*
Brebis. Voyez *Belier, p. 7.*
Brebis d'Afrique *p. 7.*
Brebis d'Orient *p. 8.*
Brebis d'Arabie *p. 8.*
Brebis d'Andalouſie *p. 8.*
Bufle, *Ord. I. Fam. II. n I-4. p. 5.*
Bugée. Voyez *Cebus Ord II. Fam. IV. n. XII.-11. p. 65.*
Burrol, Taureau du Mexique, *Ord I. Fam. II. n. I. p. 7.*

## C.

CABORRO-Domato. Voyez Tlaquatzin, eſpece de Philander; *Ord* II. *Fam* IV. *n.* II.-34.
Caitaia. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII.-5. *p.* 64.
Callitriches. Voyez Singes à queue, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-1. *p.* 64.
Came-Léopard, ou Giraffe, *Ord.* I. *Fam.* II *n.* III.-1. *p.* 4.
Carigueia ou Philander, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n* II.-33.
Carigui-beju, Loutre du Breſil, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* I. 2. *p.* 67.
Caſtor, *Ord.* II. *Fam.* 5. *n.* II. *p.* 67.
Cavia-Cabaya ou Cochon d'Inde, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II.-1. *p.* 28.
Cavia-Aguti, *ibid.* 2. *p* 28.
Cavia Paca, *ibid.* 3. *p.* 28,
Cavia Aparea, *ibid.* 4. *p.* 28.
Cavia de Surinam, *ibid.* 5. *p.* 29.
Cavia de Baham, *ibid.*-6. *p.* 29.
Cavia de Java, *ibid.*-7. *p.* 29.
Cavia de la Baye de Hudſon, *ibid.*-8. *p.* 29.
Cay. Voyez Singes à queue, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII.-1. *p.* 63.
Cebus ou Cercopitheque. Voyez Singes à queue. *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII.-1. *& ſuiv p.* 63.
Cercopitheques ou Singes à queue, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII. au mot Cebus *p.* 63.
Cerf ordinaire, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV. *p.* 15.
Cerf de Groenland, *ibid.*-B. *p.* 15.
Cerf palmé de Joſſelin, Wampoſe des Indiens, eſpece d'Elan, *ibid*-D. *p.* 15.
Petits Cerfs de Guinée, d'Afrique, de Surinam, du Genre des Boucs, *ibid. n.* III-H. *p.* 13.
Petit Cerf de Guinée ſans cornes, *ibid. p.* 14. *n.* 3.
d'Afrique, *ibid. n.* 4.
de Surinam, *ibid n* 5.
de Guinée, *ibid. n.* 6.
Chameau, *Ord.* II. *Fam.* I. *n.* I. *p.* 21.
Chameau Beſchet de Bactriane, *ibid.*
Chameau d'Arabie, *ibid.*
Chameau ou Dromadaire, *ibid.*
Chameau du Perou, *ibid.*
Chamois, *Ord.* I *Fam.* II. *n.* III-B. *p.* 10.

Chat volant de l'Amérique. Voyez Chauve-Souris, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-42.
Chat épineux. Voyez Hériſſon blanc de l'Amérique, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IV-2. *p.* 47.
Chat Civette, *Ord.* II. *Fam* IV. *n.* VIII-5. *p.* 54.
Chat domeſtique, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-1. *p.* 56.
Chat ſauvage, *ibid*-2. *p.* 56.
Chat Tygre, *ibid*-3. *p.* 56.
Chat Tygre de la Nouvelle Eſpagne, *ibid*-4. *p.* 56.
Chat volant de Ternate, *ibid*-4. *p.* 56.
Chat de la Nouvelle Eſpagne, *ibid*-6. *p.* 56.
Chat de montagne, *ibid*-7. *p.* 56.
Chat Pard, *Ord.* II. *Fam.* IV. *p.* 59. *n.* 2.
Chauve-Souris vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-41. *p.* 41.
Chauve-Souris ou Chat volant de l'Amérique, *ibid*-42. *p.* 42.
Chauve-Souris vulgaire de l'Amérique, *ibid*-43. *p.* 42.
Chauve-Souris de Surinam, *ibid*-44. *p.* 43.
Chauve-Souris ou Loir volant de Ternate, *ibid* 45. *p.* 42.
Chauve-Souris ou Chien volant de Ternate, *ibid*-46. *p.* 42.
Chauve-Souris de la Nouvelle Eſpagne, *ibid*-47. *p.* 43.
Chauve-Souris de l'Iſle de Madagaſcar, *ibid*-48. *p.* 43.
Cheval, *Ord.* I. *Fam.* I. *n.* I-A. *p.* 3.
Cheval marin ou Hippopotame, *Ord.* I. *Fam.* IV. *p.* 19.
Chevre. Voyez Bouc, *p.* 9.
Chevre ſauvage, *Ord.* I. *Fam,* II. *n.* III-E. *p.* 12.
Chevre à Bezoard, *ibi*-F. *p.* 12.
Chevreuil, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV-C. *p.* 15.
Chevreuil marin, *p.* 16.
Chien volant de l'Amérique. Voyez Chauve-Souris, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-46. *p.* 42.
Chien, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* V-I. *p.* 49.
Chien du Mexique, *ibid*-2. *p.* 50.
Chien d'Afrique, *ibid*-3. *p.* 50.
Chien du Cap de Bonne-Eſpérance, *ibid.* *p.* 50.
Chien de la Laponie, *ibid.* *p.* 50.
Chiens ſauvages de l'Amérique, *ibid*-4. *p.* 50.
Chiens à tête ramaſſée, *ibid*-5. *p.* 51.
Civette. Voyez Coati, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VIII-5. *p.* 54.
Cliche. Voyez Putois de l'Amérique, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-8. *p.* 45.
Coati du Breſil, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VIII-1. *p.* 53.
Coati-Mondi, *ibid*-2. *p.* 54.
Coati d'Hernandez, *ibid*-3. *p.* 54.

Goati Genette, *ibid*-4. *p.* 54.
Coati-Civette, *ibid*-5. *p.* 54.
Coati-Taiſſon ou Blaireau, *ibid*-6. *p.* 54.
Très-grand Coati de l'Amérique & de la Baye de Hudſon, *ibid*-7. *p.* 55.
Cobaya ou Cochon d'Inde, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II-1. *p.* 28.
Cochon ou Porc domeſtique. Voyez Porc, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* V-4. *p.* 17.
Cochon d'Inde. Voyez Cavia, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II-1. *p.* 28.
Conepalt. Voyez Coati d'Hernandez, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VIII-3. *p.* 54.
Cricetus, eſpece de Loir, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-14. *p.* 35.
Cuandu. Voyez Porc-Epic ſingulier, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IV-6. *p* 49.
Cuguacu-Ete, Cuguacu-Apara, eſpeces de Chevreuils, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV-C. *p.* 16.
Cuguacuarana, eſpece de Tygre du Breſil, au mot Tygre, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX. *p.* 59.

## D.

Daim des Anciens. Voyez Chamois, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III B. *p.* 10.
Daim des Modernes, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV-E. *p.* 16.
Danta, grand Quadrupede ſans cornes, dont il eſt parlé dans la Relation de la Riviere des Amazones.
Diable de Tajovan ou Tatou, *Ord.* II. *Fam.* III. *p.* 25.
Didelphe. Voyez Philander, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-33.
Dorcas *p.* 10.
Dorcas de Lybie, ou Chevre de Lybie, *p.* 11.
Dromadaire. Voyez Chameau, *Ord.* II. *Fam.* I-3. *p.* 21.

## E.

Ecureuil vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II. *p.* 31.
Ecureuil noir, *ibid. n.* 2. *p.* 32.
Grand Ecureuil gris *ibid. n.* 3. *p.* 32.
Ecureuil de terre *ibid. n.* 4. *p.* 32.
Ecureuil rare de la Nouvelle Eſpagne, *ibid. n.* 5. *p.* 32.
Ecureuil de l'Amérique, *ibid. n.* 6. *p.* 32.
Ecureuil cendré de Pruſſe, *ibid. n.* 7. *p.* 32.
Ecureuil de Barbarie, *ibid. n.* 8. *p.* 33.

Ecureuil volant, *ibid. n.* 9. *p.* 33.
Ecureuil volant de la Virginie, *ibid. n.* 10. *p.* 33.
Ecureuil roux d'Edouard *p.* 11. *p.* 33.
Elan ou Alcé, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV-D. *p.* 16.
Elephant *Ord.* I. *Fam.* V. *p.* 20.
Elkerkedom, nom qu'on donne en Perse au Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Exquima. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-7. *p.* 65.

F.

FOUINE, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III 6. *p.* 45.
Fourmillier ou Tamandua, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 24.
Furet, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-4. *p.* 44.
Furet de Java, *ibid-9. p.* 46.

G.

GARIBA. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-4. *p.* 64.
Gazelle, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-C. *p.* 11.
Gazelle d'Afrique. *ibid.*
Gazelle des Indes, *ibid.*
Genette. Voyez Coati, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VIII-4. *p.* 54.
Giraffe ou Cameleopard, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-1. *p.* 14
Glama. Voyez Chameau, *Ord.* II. *Fam.* I. *n.* I-4. *p.* 21.
Gomela, nom qu'on donne aux grandes Indes au Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Goulu, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XI. *p.* 61.

H.

HERMINE, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-3. *p.* 43.
Hériſſon, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IV-1. *p.* 47.
Hériſſon blanc, *ibid-2. p.* 47.
Hériſſon de Siberie, *ibid-3. p.* 47.
Hippopotame ou Cheval marin, *Ord.* I. *Fam.* IV. *p.* 19.
Homme, *p.* 1.
Homme ſauvage ou Homme des bois. Voyez Satire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-2. *p.* 62.
Hyene. Voyez Goulu, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XI. *p.* 61. & *p.* 65. *n.* 13.

I.

JAGUARA, Tigre de l'Amérique, au mot Tigre, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-3. *p.* 59.
Jaquerete, autre eſpece de Tigre, *ibid*-4. *p.* 59.
Ibex. Voyez Bouc-Etain, *p.* 9.
Ichneumon, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-10. *p.* 46.
Ichneumon de l'Iſle de Ceylan, *ibid*-11. *p.* 46.
Imel, Voyez Chameau, *Ord.* II. *Fam.* I. *n.* I-2. *p.* 21.
Jyratakacin, Voyez Giraffe, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-1. *p.* 143.

K.

KOGER-AGAN. Voyez Furet de Java, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-9.

L.

LAMANTIN, *Ord.* II. *Fam.* V. *n* V. *p.* 68.
Lambin ou pareſſeux, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* 1. *p.* 23.
Lapins & Lievre de l'Amérique. Voyez Cavia, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II. *p.* 28.
Lapin de Baham, *ibid*-6. *p.* 29.
Lapin de Java, *ibid*-7. *p.* 29.
Lapin de la Baye de Hudſon, *ibid*-8. *p.* 29.
Lapin vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* I-5. *p.* 30.
Lapin du Breſil, nommé Tapeti, *ibid*-6. *p.* 30.
Lapin de Siberie, *ibid*-7. *p.* 30.
Lemming ou Rat de Norvege, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II-13. *p.* 34. & 38. *n.* 32.
Autre Lemming de Norvege, *ibid*-32.
Léopard, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* 1. *p.* 58.
Lerot, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* 7. *p.* 32.
Lezard écailleux *p.* 68. *n.* VII.
Lievre vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* 1. *p.* 30.
Lievre blanc, *ibid*-2. *p.* 30.
Lievre noir, *ibid*-3. *p.* 30.
Lievres cornus, *ibid*-4. *p.* 30.
Lion, *Ord.* II. *Fam.* IV. *p.* 59.
Lion marin, *Ord.* II. *Fam.* V. *p.* 68
Loir, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-2. *n* 12. *p.* 33. 34.
Loir. Voyez Ecureuil cendré, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II. *p.* 33.

Loir volant de l'Amérique, ou Chauve-Souris, *Ord.* I. *Fam.* IV. *n.* II-45.
Loup vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VI-1. *p.* 51.
Loup doré, *ibid*-2. *p.* 51.
Loup marin, *ibid*-3. *p.* 53.
Loup de l'Amérique, *ibid*-4. *p.* 52.
Loup de la Caroline, *ibid. p.* 52.
Loup du Mexique, *ibid. p.* 52.
Loup Cervier ou Linx, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-1. *p.* 57.
Loup marin ou Phocas, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* IV. *p.* 68.
Loutre, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* I. *p.* 66.
Loutre du Bresil, *ibid. p.* 66.
Linx ou Loup Cervier, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX 1. *p.* 57.
Lynx-Chat, *ibid. p.* 57.
Lynx d'Afrique, *ibid*-2. *p.* 57.
Linx blanc, *ibid*-3. *p.* 58.
Linx à queue de veau, *ibid*-4. *p.* 58.

M.

MAcaque. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-6. *p.* 65.
Mamonet. Voyez Singes, *Ord.* II. *Fam* IV. *n.* XII-5. *p.* 63.
Manati, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* V. *p.* 68.
Mangeurs de Fourmis, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 24.
Manicou. Voyez Philander, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-33.
Marmotte, Ord. II. *Fam* IV. *n.* II-15. *p.* 35.
Marmote de l'Amérique, *ibid*-16. *p.* 35.
Marte, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-6. *p.* 45.
Mazame, petit Bouc de la nouvelle Espagne, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III H-2. *p.* 14. *n.* 2.
Mebbiæ, Chiens d'Ethiopie, *Ord.* II *Fam.* IV. *n.* V-3. *p.* 50.
Moschus ou Animal portant le musc, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-D. *p.* 11 & 12.
Mouton, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 7.
Mulet, *Ord.* I. *Fam.* I. *n.* II-B. *p.* 4.
Mulot, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-23. *p.* 37.
Mungo. Voyez Furet, *Ord. Fam.* IV. *n.* III-4. *p.* 46.
Musaraigne, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-30. *p.* 38.
Musaraigne des Indes Orientales, *ibid.* p. 30.
Musk-hog. ou Tajacu. Voyez Porc sentant le musc, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* V-B. *p.* 18.
Myrmicophage ou Tamandua, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 24.

## N.

NABBA, nom qu'on donne au Cap de Bonne-Eſpérance au Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Nabin, le même que Giraffe, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-1. *p.* 14.
Naſchorn, nom que les Allemands donnent au Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Noemba, nom qu'on donne au Rhinoceros dans l'Iſle de Java, *ibid. p.* 19.
Nozorozec, nom que les Polonois donnent au Rhinoceros, *ibid. p.* 19.

## O.

OPASSUM. Voyez Philander, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-33.
Oryx, Gazelle des Anciens, ſelon Belon, *p.* 11.
Ouran ou Outang, Voyez Singe, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-2. *p.* 62.
Ouvico Cochiero, Porc-Epic ſingulier, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IV-6. *p.* 49.
Ours, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* X-1. *p.* 60.
Ours blanc de Martens, *ibid*-2. *p.* 60.
Ours à queue, *ibid. p.* 61.
Oxycephalon. Voyez Chat Tygre de la Nouvelle Eſpagne, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-6. *p.* 56.

## P.

PACO, grand Rat du Breſil. Voyez Cavia, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II-3. *p.* 28.
Pacos. Voyez Chameau, *Ord.* II. *Fam.* I. *n.* I-5. *p.* 22.
Papio, Singe, *p.* 65. *n.* 13.
Pareſſeux, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* I. *p.* 23.
Pareſſeux de l'Amérique, *ibid.*
Pareſſeux de Marcgrave, *ibid.*
Autre Pareſſeux de l'Amérique, *ibid.*
Pareſſeux des Indes Orientales, *ibid.*
Papio. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-13.
Pazan & Pazard, Chevre à Bezoard, *Ord.* II. *Fam.* II. *p.* 12.
Pecaris, Porc du Mexique, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* V-B. *p.* 18.
Philander, *Ord.* I. *Fam.* IV. *n.* II-33. *p.* 39.
Philander, Tlaquatzin, *ibid*-34. *p.* 39.

Grand Philander, *ibid*-35. *p.* 39.
Très-grand Philander, *ibid*-36. *p.* 39.
Phocas, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* IV. *p.* 67.
Pigmée de Guinée, *Ord.* II. *Fam.* IV. *p.* 62. *n.* 2.
Porc domestique, *Ord* I. *Fam.* II. *n.* V-A-1. *p.* 17.
Porc à ongles simples, *ibid. n.* 2. *p.* 17.
Porc d'Afrique, *ibid. n* 3. *p.* 17.
Porc de la Chine. *ibid. n.* 4. *p.* 17.
Porc sauvage ou Sanglier, *ibid. n.* 5. *p.* 17.
Porc sentant le musc, ou Tajacu, *ibid* B. *p.* 18.
Porc Babyroussa, *ibid*-C. *p.* 18.
Porc de Guinée, *ibid*-D. *p.* 18.
Porc-Epic de Malaca, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IV.4. *p.* 48.
Porc-Epic hupé, *ibid*-5. *p.* 48.
Porc-Epic singulier, *ibid*-6. *p.* 48.
Porte-Corne ou Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Putois, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-5. *p.* 45.
Putois de l'Amérique, *ibid*-8. *p.* 45.
Pygmée de Guinée. Voyez Singes, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-2; *p.* 62.

## Q

QUANHPECOTLI, ou Chat de Montagne, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-7. *p.* 56.
Quile & Quirle, Furet, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-4. *p.* 44.

## R.

RAGUAHIL ou Ebamari, Dromadaire, *p.* 21.
Rat musqué, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II.-17 *p.* 35.
Rat aquatique, *ibid*-19. *p.* 36.
Rat domestique, *ibid*-18. *p.* 36.
Rat de terre & d'eau d'Upsal, *ibid*-24. *p.* 36.
Rat de bois de l'Amérique, *ibid*-25. *p.* 38.
Rat d'Afrique, *ibid*-26. *p.* 38.
Rat de l'Amérique, *ibid*-27. *p.* 38.
Rat de bois de l'Amérique, *ibid*-28. *p.* 38.
Grand Rat sauvage de l'Amérique, *ibid*-29. *p.* 38.
Rat d'Egypte ou Ichneumon, *ibid. n.* III-10. *p.* 46.
Renne, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* IV-B. *p.* 15.
Renard, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VII-1. *p.* 52.
Renard gris de l'Amérique, *ibid*-2. *p.* 52.
Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.

Roſmare, *Ord* I. *Fam.* III. *p.* 67.

S.

SAGOUIN, Singe. Voyez Cebus, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-1. *p.* 63.
Sanglier, Porc ſauvage, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* V. 4-5. *p.* 17.
Sanglier du Mexique, Tajacu, *ibid*-B. *p.* 17.
Sanglier de l'Iſle de Bouro aux Indes Orientales, *ibid*-C. *p.* 17.
Satyre, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII. *p.* 61.
Scalopes, Rat de bois de l'Amérique, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-25.
Siah-Ghush ou Linx à queue de Veau, *Ord.* II. *Fam* IV. *n.* IX-4.
Silene ou Pareſſeux de l'Iſle de Ceylan, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 22.
Silenes, Singes, *p.* 62.
Singes ſans queue, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII-1. *p.* 62.
Singe nommé Ourang, *ibid*-2. *p.* 62.
Singe de l'Iſle de Ceylan, *ibid*-3. *p.* 63.
Singe au muſeau de Chien, *ibid*-4. *p.* 63.
Singe nommé Mamonet, *ibid*-5. *p.* 63.
Singes à queue ou Cercopitheques, *ibid.* Voyez Cebus *p.* 63.
Souris, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-20. *p.* 36.
Souris des champs, *Ord.* II *Fam.* IV. *n.* II-20. *p.* 36.
Souris de l'Amérique, *ibid*-22.
Strepſiceros, eſpece de Brebis, *p.* 8.
Sylvains, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XI. *p.* 62.

T.

TAJACU, Sanglier du Mexique, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* V-B. *p.* 18.
Taibi, eſpece de Philander, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-34. *p.* 39.
Tamandua, Tamandua Guacu, Tamandua-j, Tamandua-Coati, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* II. *p.* 24.
Tamandua blanc *p.* 25.
Tamandua du Mexique. Voyez Chien, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* V-5.
Tapeti, Lapin du Breſil, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* I-6.
Tatou ou Armandille, *Ord.* II. *Fam.* III. *n.* II. *p.* 25. 26.
Tatou à tête de Porc, *ibid.*

Tatou à tête de Chien, *ibid.*
Tatu-Apara, espece de Tatou, *p.* 26.
Tatuete, autre espece de Tatou, *p.* 27.
Taupe vulgaire, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-37. *p.* 40.
Taupe rouge de l'Amérique, *ibid.*-38. *p.* 40.
Taupe de Siberie, *ibid.*-39. *p.* 41.
Taupe d'Oosfrisse, *ibid.*-40. *p.* 41.
Taureau, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* I-4. *p.* 5.
Taur-Eléphant, *ibid.*
Taureau sauvage, *ibid. p.* 6.
Taureau du Mexique, *ibid. p.* 7.
Temamaca, petit Bouc de la nouvelle Espagne, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-H-1. *p.* 13.
Tepe Maxtloton, Chat-Tygre de la nouvelle Espagne, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX-4.
Tête de mort, Singe à queue, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII. *p.* 61. *& suiv.*
Tlaquatzin ou Taibi, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* II-34. *p.* 39.
Tlaquatzin, espece de Porc-Epi, *p.* 40.
Tragelaphe, Bouc-Cerf, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* III-G. *p.* 13.
Tricorne ou Renne, *p.* 15.
Toras-Elber, nom Egyptien de l'Hippopotame *p.* 19.
Tuaba Rhinoceros du Cap de Bonne-Espérance, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Tigres, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* IX. au mot Tigre, I. *p.* 59.
Tigre d'Asie, *ibid.*-2. *p.* 59.
Tigre de l'Amérique, nommé Jaguara, *ibid.*-3. *p.* 59.
Tigre nommé Jaguerete, *ibid.*-4. *p.* 59.
Tigre nommé Cuguacuarana, *ibid.*-5. *p.* 59.

## V.

Vache, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* I-A. *p.* 5.
Vache marine, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* III. *p.* 67.
Vautour Quadrupede ou Goulu, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XI *p.* 61.
Veau, *Ord.* I. *Fam.* II. *n.* I-A. *p.* 5.
Veau marin ou Phocas, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* 4. *p.* 67. & *n.* V. *ibid.*
Verrat, mâle de la Truie, *p.* 17.
Unau ou Paresseux, *Ord.* II. *Fam.* II. *n.* I. *p.* 23.
Urus, *Ord.* I. *Fam.* II. B. *p.* 6.
Wampose des Indiens, ou Cerf palmé, *Ord.* I. *Fam.*

II. *n.* IV-D. *p.* 16.
Wandaru. Voyez Cebus, 12. *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* XII. *p.* 65.

Y.

YIYA, Loutre du Breſil, *Ord.* II. *Fam.* V. *n.* I-2. *p.* 67.
Yſquiepatl, Chien du Mexique, *Ord.* II. *Fam.* IV *n.* V-5. *p.* 51.
Yſquiepatl, Coati d'Hernandez, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* VIII-3. *p.* 54.
Yſard. Voyez Chamois, *Ord.* I. *Fam.* II. n. III-B. *p.* 10.

Z.

ZEBATI, nom que les Polonois donnent au Rhinoceros, *Ord.* I. *Fam.* III. *p.* 19.
Zebre, *Ord.* I. *Fam.* I. *n.* I-B. *p.* 3.
Zibeline, *Ord.* II. *Fam.* IV. *n.* III-7. *p.* 45.

---

## TABLE DE LA CLASSE DES OISEAUX.

*Suivant les Familles, les Genres, Tribus ou Eſpeces, dans leſquels M. KLEIN les a rangés, & les Ordres de M. LINNÆUS.*

A

ABOYEUR des Anglois d'Albin, eſpece de petit Courlieu; *Famille* IV. *Genre* XII. N°. 12. *p.* 143.
Acocolin, eſpece de Lanier, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* III. *n.* 26. *p.* 94.
Aigles, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* I. *p.* 86.
Aigle royale, *ibid. n.* 1. *p.* 86.
Aigle Pyagargos, de la Virginie & de la Caroline, *ibid. n.* 2. *p.* 86.
Aigle Chryſaetos, *ibid. n.* 3. *p.* 87.
Aigle Valeria, *ibid. n.* 4. *p.* 87.
Aigle Orfraie, ou Balbuzard des Anglois, *ibid. n.* 5. *p.* 87.
Aigle à Canards, *ibid. n.* 6. *p.* 87.
Aigle blanche, *ibid. n.* 7. *p.* 87.
Aigle du Breſil, nommée Uruturaüna, *ibid. n.* 8. *p.* 87.

Aigle Vautour, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* II. *n.* 7. *p.* 89.
Aigle du Soleil d'Albin, espece de Vautour, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* II. *n.* 4. p 89.
Albatross d'Edouard, *Fam.* VII. *n.* 13. & 14. p. 192.
Alchata, espece de Perdrix, *n.* 5. p. 157.
Alcyons, *Fam.* III. *Genre* IV. p. 83 & 84.
Alcyon muet, ou Martinet pêcheur, *ibid. n.* 1. p. 84.
Alcyon de Bengale, *ibid. n.* 2. *p.* 84.
Alcyon hupé des Indes Orientales, *ibid. n.* 3. p. 84.
Alcyon de l'Amérique, *ibid. n.* 4. p. 84.
Alcyon hupé d'Amboine, *ibid. n.* 5. p. 84.
Alcyon de Catesby à queue courte, *ibid. n.* 6. p. 84.
Alcyon de Gambia, *ibid n.* 7. *p.* 84.
Alcyon blanc & noir, *ibid. n.* 8. p. 85.
Alcyon de Surinam, *ibid. n.* 9. p. 85.
Alhautel, Onocrotale, ou grand Gosier, *Fam.* VI. *n.* 1. p. 187 & 188.
Alka, ou Oiseau à bec tranchant d'Albin, *Fam.* VII. *n.* 5. p. 191.
Alouette de Mer, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 6. p. 74.
Alouette de Mer de Catesby, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 9. p. 75.
Alouettes de terre, *Fam.* IV. *Genre* VI. p. 112.
Alouette simple, *ibid. n.* 1. p 112.
Alouette d'arbre ou de bois, *ibid. n.* 2. p. 112.
Alouette hupée, *ibid. n.* 3. p. 112 & 113.
Alouette blanche, *ibid. n.* 4. p. 113.
Alouette de la Virginie & de la Caroline, *ibid. n.* 5. p. 113.
Grande Alouette de Catesby, *ibid. n.* 6. 113.
Alouette ou Calandre de Belon, *ibid. n.* 7.
Ani de Marcgrave, espece de Corneille, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 100. *n.* 7.
Ani, Oiseau du Mexique, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Trib.* I. *n.* 3. p. 148.
Anhinga du Bresil, *Fam.* VI. *n.* 8. p. 190.
Aracaranga de Marcgrave, espece de Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 3. p. 76.
Ararauna, autre espece de Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 4. p. 76.
Arlequin, petit Oiseau du Genre des Ossignols, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Trib.* I. *n.* 16. p. 116.
Atotolt, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Trib.* I. *n.* 9. p 149.
Avosetta. *Fam.* V. *Genre* II. *Esp.* IV. *n.* I. 187.
Aura, Vautour du Bresil, *Fam.* IV, *Genre* I. *Trib.* II. 8. p. 89.

Autruche, *Fam.* I. *n.* I. p. 71.
Autruche de l'Amérique, *Fam.* II. *Genre* I *n.* I. p. 71.
Azul-Lexos au Mexique, *Fam.* IV. *Genre* X. *Trib.* V. *n.* 8. p. 136.
Ayoquantotolt, Eſpece de Lanier, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* III. *n.* 26. p. 94.

B.

Balbuzard des Anglois, ou Aigle Orfraie, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* I. *n.* 5. p. 87.
Baltimore de Cateſby, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 14 p. 108. & *n.* 15. p. 109.
Baniahbow de Bengale, eſpece de Grive, *Fam.* V. *Genre* V. *n.* 30. p. 110.
Barge de Belon, *Fam.* IV. *Genre* XI. *n* 5. p. 141.
Barge d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 9. p. 143.
Barker d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 10. p. 142.
Bartavelle, Perdrix blanche, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 4. au mot Coq de Bruyere, p. 159.
Bec croiſé ou Loxia, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 13. p. 135.
Bec à ſpatule, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* III. *n.* 6. p. 169.
Bécaſſes, *Fam.* IV. *Genre* XI. p. 139.
Bécaſſe ordinaire; *ibid. n.* 1. p. 140.
Bécaſſe moyenne, *ibid. n.* 2. p. 140.
Bécaſſe nommée *Capella Cælipeta*, *ibid. n.* 3. p 146.
Très-petite Bécaſſe, *ibid. n.* 4. p. 140.
Bécaſſe de campagne, *ibid. n.* 5. p. 141.
Bécaſſe blanche, *ibid n.* 6. p. 141.
Bécaſſines, *Fam.* IV. *Genre* XII. p. 143.
Bécaſſine de Belon, *ibid. n.* 4. p. 143.
Autre Bécaſſine, *ibid* Voyez le mot Glareola, p. 142.
Becfigue ordinaire d'Olina, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. *n.* 2. p. 114.
Becfigue de Chanvre, *ibid. n.* 3. p. 114.
Bergeronette, Lavandiere, ou Hochequeue; *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III *n.* 6. p. 118.
Bergeronette jaune, *ibid. n.* 7. p. 118.
Bergeronette à poitrine noire, *ibid n.* 6. p. 118.
Bergeronette ou Meſange à queue longue d'Albin, *ibid. n.* 8. p. 118.
Biſet, eſpece de Pigeon, *Fam.* IV. *Genre* XVII. p. 161.
Bitarde d'Albin, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 4. p. 74.

Bourguemeſtre de Groenland, ou grande Mouette griſe, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 6. p. 181. *n.* 7. p. 192.
Bourguemeſtre, ou Préconſul de Martens. Voyez Préconſul, p. 192.
Bouvreuil, Pivoine, ou gros Bec, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 9. p. 134.
Bruant griſâtre, *Fam.* IV. *Genre* V. *Tribu* II. *n.* 1. p. 129.
Bruant de neige, *ibid. n* 4. p. 129.
Bruant jaune, *ibid. n.* 5. p. 130.
Petit Butor de Cateſby, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *n.* 6. p. 166.
Butor brun du même, autre eſpece de Heron, *ibid. n.* 8. p. 166.
Butor hupé du même, *ibid. n.* 9. p. 166.
Buſtard d'Arabie, eſpece d'Outarde, *Fam.* II. *Genre* III. *n.* 3. p. 73.
Buzard d'Albin, eſpece de Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 12. & *n.* 15. p. 93.

## C.

CABARE, eſpece de Hulote du Breſil, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. *n.* 8. p. 98.
Caille, *Fam.* IV. *Genre* XVI. p. 158.
Caille vulgaire, *ibid. n* 2. au mot Caille, *ibid.* p. 158.
Caille du Cap de Bonne Eſpérance, *ibid. n.* 2. p. 158.
Cakatoan, Perroquet, ou Kakatoeha, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 5. p. 77.
Callatti, Ortolan d'Amboïne, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* II. *n.* 7. p. 130.
Canards, *Fam.* V. *Genre* I. p. 174.
Canard domeſtique, *ibid. n.* 1. p. 174.
Canard d'Inde, *ibid n* 2. p. 175.
Canard ſauvage, *ibid. n.* 3. p. 175.
Petit Canard, *ibid. n* 4. p. 175.
Canard ſauvage à tête brune, *ibid. n.* 5. p. 175.
Canard ſauvage ou Trembleur, *ibid. n.* 6. p. 175.
Canard ou Cane de Mer, *ibid. n.* 7. p. 176.
Canard ſauvage ou petite Cercelle, *ibid. n.* 8. p. 176.
Canard preneur de Mouches, *ibid. n.* 9. p. 176.
Canard à large bec, *ibid. n* 10. p. 177.
Canard ou Cane à tête noire, *ibid. n.* 11. p. 177.
Canard noir, *ibid. n.* 12. p. 177.
Canard, Sargon d'Albin, *ibid. n.* 13. p. 177.

Canard ou Cercelle de France, *ibid. n.* 14. p. 177.
Canard, Faiſan de Mer d'Albin, *ibid. n.* 15. p. 177.
Canard d'Iſlande, *ibid. n.* 16. p. 177.
Canard à bec crochu, *ibid. n.* 17. p. 177.
Canard de Bahama, *ibid. n.* 18. p. 177.
Petit Canard à tête purpurine, *ibid. n.* 19. p. 178.
Canard au grand bec de l'Amérique, *ibid. n.* 20. p. 178.
Canard hupé de l'Amérique, *ibid. n.* 21. p. 178.
Petit Canard brun de Cateſby, *ibid. n.* 22. p. 178.
Canard Cercelle brune de l'Amérique, *ibid. n.* 23. p. 178.
Canard, autre Cercelle de l'Amérique, *ibid. n.* 24. p. 178.
Canard ſauvage gris de l'Amérique, *ibid. n.* 25. p. 178.
Canard hupé jaune, *ibid. n.* 26. p. 178.
Canard Qu'attr'Occhi des Italiens, *ibid. n.* 27. p. 178.
Canard verd, *ibid. n.* 28. p. 179.
Canard étoilé, *ibid. n.* 29. p. 179.
Canard, Plongeon de Mer d'Albin, *ibid n.* 30. p. 179.
Canard, Cercelle ſeconde d'Aldrovande, *ibid. n.* 31. p. 179.
Canard ſauvage de Sloane, *ibid. n.* 32. p. 179.
Petit Canard noir & blanc d'Edouard, *ibid. n.* 33. p. 179.
Canard de la Chine, *ibid. n.* 24. p. 179.
Canard hupé de Cateſby, *Fam.* V. *Genre* II. *eſp.* II. *n.* 3. p. 184.
Cane, femelle du Canard.
Cane Petiere de Belon, *Fam.* II. *Genre* II. *n.* 11. p. 72.
Cane à tête noire, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 11. p. 177.
Carah, Lanier de Bengale, *Fam.* IV. p. 94.
Cardinal, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n* 17. p. 119.
Cardinal de Cateſby, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III. *n.* 3. p. 137.
Caſſenoiſette, ou Geay de Montagne, *Fam.* IV. *Genre* III. *n.* 4.
Caſoard ou Emeu, *Fam.* II. *Genre* II. *n.* 1. p. 72.
Cercelle, eſpece de Canard ſauvage. *Fam.* V. *Genre* I. n. 8. Voyez Canard, p. 176. *n.* 14. p. 177. & *n* 24. p. 178. *n.* 31. p. 179.
Cercerelle ou Quercerelle, Oiſeau de proie, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tab.* 3. *n.* 7. & 14. p. 91.
Chardonneret, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 4. p. 136.
Chardonneret de l'Amérique, *ibid. n.* 6. p. 136.
Chardonneret de la Chine, *ibid. n.* 13.
Chat-huant, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. *n.* 1. & *ſuiv.* p. 185.
Chevalier rouge, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 1. p. 142.

Chéveche, Oiſeau de nuit. Voyez Chat-huant, p. 96.
Cheveche-Vautour, *n.* 9. p. 98.
Chevrette volante, eſpece de Bécaſſe, *Fam.* IV. *Genre* XI. p. 140. *n.* 3.
Chichiltotolt, *Fam.* IV. *Genre* X. *n.* 7. p. 152.
Choucas, Corneille, *Fam* IV. *Genre* II. *n.* A. p. 100.
Chouette, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. *n.* 4. p. 97.
Chouette blanche, *ibid. n* 5. p. 97.
Chouette d'Albin, *ibid. n.* 6. p. 98.
Cigogne, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* II. p. 168.
Cigogne blanche, *ibid. n.* 1. p. 168.
Cigogne noire, *ibid. n.* 2. p. 168.
Cigogne de l'Amérique, *ibid. n.* 3. p. 168.
Colibris, ou Oiſeaux Mouches. *Fam.* IV. *Genre* XIV p. 146.
Colibri de la Caroline, *ibid. n.* 1. p. 146.
Colibri de l'Amérique, *ibid, n.* 2. p. 146.
Colibri, nommé Ronckje, *ibid. n.* 3. p. 147.
Colibri hupé, *ibid. n.* 4. p. 147.
Colibri à poitrine rouge, *ibid. n.* 5. p. 147.
Colibri à ailes brunes, *ibid. n.* 6. p. 147.
Colibri de la Nouvelle Eſpagne, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. n. 5. p. 149.
Colibri de l'Iſle de Ceylan, *ibid. n.* 8. p. 149.
Colibri des Indes Orientales, *ibid. n.* 12. p. 150.
Colibri au goſier verd, *ibid. n* 15. p. 150.
Colibri à queue & tête bleue, *ibid. n.* 16. p. 150.
Colibri à queue longue, *ibid. n.* 17. p. 150.
Colibri à queue courte, *ibid. n.* 18. p. 150.
Colombe, le même que Pigeon, p. 160.
Colombe de Portugal, *n.* 14. p. 161.
Colombe de Groenland, *Fam.* VII. *n.* 1. p. 190.
Colymbes, *Fam.* VIII. p. 194.
Colymbe blanc, *ibid. n.* 1. p. 194.
Grand Colymbe hupé, *ibid. n.* 2. p. 194.
Grand Colymbe d'Aldrovande, *ibid. n.* 3. p. 194.
Petit Colymbe, *ibid. n.* 4. p. 195.
Colymbe brun, *ibid. n.* 5. p. 195.
Très-grand Colymbe, *ibid. n.* 6. p. 195.
Conckotlatelli d'Hernandez, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 29. p. 110.
Contra de Bengale, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 16. p. 109.
Coq domeſtique, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 1. p. 154.
Coq de Curaſſeau, *ibid. n.* 3. p. 154.
Coq du Breſil, *ibid. n.* 4. p. 155.

Coq d'Inde, *ibid. n.* 1. p. 155
Coq d'Inde hupé, *ibid. n.* 11. p. 155.
Coq de Bruyere, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 1. p. 158.
Petit Coq de Bruyere, *ibid. n.* . p. 158.
Coq de marais d'Albin, *ibid. n.* 5. p. 159.
Coq de marais de la Baye de Hudſon, *ibid. n.* 6.
Petit Coq de Bruyere de l'Amérique, *ibid. n.* 7.
Coquantotolt, Moineau hupé, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* I. *n.* 16. p. 128.
Corbeau, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 98.
Corbeau noir, *ibid. n.* 1. p. 98.
Corbeau à collier, *ibid. n.* 2. p. 99.
Corbeau hupé, *ibid. n.* 3. p. 99.
Petit Corbeau, c'eſt la Corneille, *ibid. n.* 4. p. 99.
Corbeau de nuit, ou Nycticorax, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *n.* 5. p. 166.
Corlis ou Courlieu de rocher, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 4. p. 74.
Petit Corlis, ou Aboyeur des Anglois, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 12. p. 143.
Grand Corlis, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* II. *n.* 1. p. 151.
Petit Corlis, *ibid. n.* 2. *p.* 151.
Corlis blanc, *ibid. n.* 3. p. 151.
Corlis brun, *ibid. n.* 4. p. 151.
Corlis rouge, Guara de Marcgrave, *ibid. n.* 5. p. 152.
Corlis noir, *ibid. n.* 6. p. 152.
Corlis à face de Heron, *ibid. n.* 7. p. 152.
Corlis brun de Marſilly, *ibid. n.* 8. p. 152.
Corlis de Beſler, *ibid. n.* 9. p. 152.
Cormoran, Corbeau aquatique, *Fam.* VI. *n.* 5. p. 189.
Petit Cormoran, ou petit Corbeau aquatique, *ibid. n.* 6. p. 189.
Corneille, *Fam.* IV. *Genre* II. *n.* 4. p. 99.
1. Corneille noire, *ibid.* p. 99.
2. Corneille cendrée de Royſton, *ibid.*
3. Corneille noire, mangeuſe de grains, *ibid.*
4. Choucas, ou la Corneille apprivoiſée, *ibid.* p. 100.
5. Corneille criarde, *ibid.*
6. Petite Corneille d'un grand noir, *ibid.*
7. Grande Corneille criarde, *ibid.*
8. Corneille jaune, *ibid.*
9. Autre Corneille jaune, *ibid.*
10. Corneille, eſpece de Corbeau de la nouvelle Eſpagne,

nommé Yrzquaohtli, *ibid.*
11. Corneille à bec rouge, ou Choucas de Cornouaille, *ibid.*
12. Petite Corneille des Indes Orientales, nommée Mineur, *ibid.* p. 101.
13. Corneille pourprée, ou Choucas, *ibid.* p. 101.
14. Corneille de bois des Cantons Suisses, *ibid.*
Coucous, *Fam.* III. *Genre* III. p. 81.
Coucou vulgaire, *ibid. n* 1. p. 82.
Coucou de la Caroline, *ibid. n.* 2. p. 83.
Coucou aux ailes dorées, ou grand Picvert de Catesby, *ibid. n.* 3. p. 83.
Coucou du Bresil, *ibid. n.* 4. p. 83.
Coucou d'Andalousie, *ibid. n.* 5. p. 83.
Coucou de Bengale, *ibid. n.* 6. p. 83.
Autre Coucou de Bengale, *ibid.* n. 7. p. 83.
Grand Coucou de la Jamaïque, *ibid. n.* 8. p. 83.
Courlieu, *Fam.* IV. *Genre* XV. *n.* 1. p. 151.
Coupeur d'eau de Catesby, *Fam.* V. *Genre* II. *esp.* IV. *n.* 2. p. 187.
Courrier ou Messager, espece de Pigeon, *Fam.* IV. *Genre* XVII. p. 160. *n.* 4.
Crabier de Labat, espece de Héron, p. 165. *n.* 3.
Cravan, *Fam.* V. p. 173. *n.* 8.
Cuckel, Coucou de Bengale, *Fam.* III. *n.* 6.
Cul blanc à poitrine jaune de l'Amérique, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 26. p. 110.
Cul blanc, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 9. p. 118.
Cul blanc d'Edouard, *ibid. n.* 26 & 27 p. 120.
Cuntur, espece de Vautour, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* II. *n.* 9. p. 89.
Curucui, espece de Picvert de Marcgrave, *Fam.* III. *Genre* II. *n.* 16. p. 81.
Cygne, *Fam.* V. *Genre* 1. *n.* 1. au mot Oie, p. 171.

## D.

DEMOISELLE, ou Grue de Numidie, *Fam.* IV. *Genre* XVIII. *n.* 6. p. 164.
Diable de mer, ou Macreuse, *Fam.* VIII. au mot Foulque, *n.* 2. p. 196.
Dotterel des Anglois, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 5. p. 74.
Autre Dotterel, *ibid. n.* 7. p. 74.
Duc, Oiseau nocturne, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. *n.* 1. *& suiv.* p. 96.

Moyen Duc, ou Hibou cornu, *ibid.*
Duc, ou petit Hibou à oreille, *ibid.*
Duntergooſe, eſpece d'Oie, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 13. p. 174.

E.

Ecorcheur à tête rouge d'Albin, Lanier IV. *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 26. p. 94.
Egledon, *Fam.* V. n. 18. p. 173.
Emerillon, Oiſeau de proye, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 10. p. 92.
Ema, nom que les Portugais donnent à l'Autruche, *Fam.* I. p. 71.
Embergooſe, eſpece d'Oie, *Fam.* V. n. 12. p. 174.
Emeu ou Caſoard, *Fam.* II. *Genre* II. p. 72.
Epervier, eſpece de Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 11. p. 92.
Epervier de la Caroline, *ibid. n.* 16 & 23. p. 92 & 93.
Etourneaux, *Fam.* IV. *Genre* IV. p. 104.
Etourneau vulgaire, *ibid. n.* 1. p. 104.
Etourneau noir à ailes rouges de Cateſby, *n.* 2. p. 105.
Etourneau à crins cendrés d'Edouard, *ibid. n.* 3. p. 105.
Etourneau à queue diviſée, nommée Grive par Seba, *ibid. n.* 4. p. 105.
Evêque, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 9. p. 134.

F.

Faisans, *Fam.* IV. *Genre* XVI. p. 156.
Faiſans, *ibid. n.* 1. au mot Faiſan, *ibid.*
Faiſan brun du Breſil, *ibid. n.* 2.
Mâle du Faiſan rouge de la Chine, *ibid. n.* 3.
Faiſan blanc de la Chine, *ibid. n* 4.
Faiſan Paon, *ibid. n* 5.
Faiſan brun, *ibid. n* 6. p. 157.
Faiſan de mer d'Albin, eſpece de Canard, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 15. au mot Canard, p. 177.
Falcinelles du Mexique, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 3. p. 148.
Faucons, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. p. 90.
Faucon Vautour, *ibid. n.* 1. p. 90.
Faucon ſacre, *ibid. n.* 2. p. 91.
Faucon gentil, *ibid. n.* 3. p. 91.

Faucon Tunitien, *ibid. n.* 4. p. 91.
Faucon Lanier, *ibid. n.* 5. p. 91.
Faucon blanc de Moscovie, *ibid. n.* 6. p. 91.
Faucon Cercerelle, *ibid. n.* 7. p. 91.
Faucon de muraille, *ibid. n.* 7. p. 91.
Faucon varié, ou d'Alouette, *ibid. n.* 9. p. 92.
Faucon Emerillon, *ibid. n.* 10. p. 92.
Faucon de Colombier, ou Epervier, *ibid. n.* 11. p. 92.
Faucon Buzard d'Albin, *ibid. n.* 12. p. 92.
Faucon à queue fourchue, ou Milan royal, *ibid. n.* 13. p. 92.
Faucon du Perou, *ibid. n.* 14. p. 92.
Faucon, Buzard d'Aldrovande, *ibid. n.* 15. p. 93.
Faucon, petit Epervier, *ibid. n.* 16. p. 93.
Faucon, Epervier de la Caroline, *ibid. n.* 17. p. 93.
Faucon bleu-azur, *ibid. n.* 18. p. 93.
Faucon pêcheur de Catesby, *ibid. n.* 19. p. 93.
Faucon montain, *ibid. n.* 20. p. 93.
Faucon doré, *ibid. n.* 21. p. 93.
Faucon, Henrarrier, ou Perturbateur des Poules d'Albin, *ibid. n.* 22. p. 93.
Faucon Epervier mâle d'Albin, & femelle, *ibid. n.* 23. p. 93.
Faucon mâle de la Cercerelle, *ibid. n.* 24. p. 94.
Faucon aux mains dorées, *ibid. n.* 25. p. 94.
Petits Faucons Laniers, *ibid. n.* 26. p. 94.
1. Le grand Lanier cendré, *ibid.*
2. Le Lanier à tête & col cendrés, *ibid.*
3. Le petit Lanier roux, *ibid.*
4. Le Lanier ou Ecorcheur à tête rouge d'Albin, *ibid.*
5. Le petit Lanier cendré, *ibid.*
6. Lanier étranger, nommé Acocolin, *ibid.*
7. Lanier, nommé Ayoquantolt, *ibid.*
8. Lanier de Bengale, *ibid.*
9. Autre Lanier de Bengale, *ibid.*
10. Lanier, ou Moineau de jonc, *ibid.*
Lauperdrieux, Oiseau de proie, espece de Vautour, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* II. *n.* 3. p. 89.
Fauvette, petit Oiseau, du Genre des Rossignols, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. *n.* 13. p. 119.
Fauvette à sommet noir, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Trib.* III. *n.* 14. p. 119.
Flambant, ou Flamant, ou Phœnicoptere, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* III. *n.* 4. p. 169.

Grand Fou, espece d'Oie, *Fam.* VI. *n.* 3. p. 189.
Petit Fou, *ibid. n.* 4. *p.* 189.
Foulque à bec varié de Catesby, *n.* 5. p. 195.
Foulque ou Poule d'eau, *Fam.* VIII. au mot Foulque, *n.* 1. p. 196.
Foulque de Belon, ou Macreuse, ou Diable de Mer, *ibid. n.* 2. p. 196.
Foulque brune d'Edouard, *ibid. n.* 3. p. 196.
Francolin d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 11. p. 143.
Fresaye, *Fam.* IV. *Genre* VIII. *Tribu* I. *n.* 1. p. 121.
Fresaye de la Caroline, *ibid. n.* 2. p. 121.
Fresaye de la Jamaïque, *ibid. n.* 3. p. 121.
Fresaye, Guiraquerea de Marcgrave, *ibid. n.* 4. p. 121.

## G.

GARROT, espece de Canard, *Fam.* V. *n.* 10. p. 177.
Gavindas, grande Mouette, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 2. p. 180.
Geai, *Fam.* IV. *Genre* III. *n.* 2. p. 101.
Geai bleu hupé de Catesby, *ibid. n.* 3. p. 102.
Geai de Strasbourg, *ibid. n.* 7. p. 102.
Geai du Cap de Bonne-Espérance, *ibid.* p. 102.
Geai de Bengale, *ibid. n.* 8. p. 103.
Geai de Boheme, espece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 34. p. 111.
Gelinote, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 3. au mot Coq de Bruyere, *n.* 3. p. 158.
Gentil, espece de Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Trib.* III. n. 3. p. 91.
Gerfault, Faucon, *ibid. n.* 1. p. 90.
Gerfault marin, Vautour marin, Hirondelle de Mer, espece de Mouette, ou de Lare, *Fam.* IV. *Genre* II. *n.* 3. p. 180.
Glareola, nom que M. KLEIN donne à différentes especes d'Oiseaux, qui fréquentent les bords des étangs & des rivieres, & autres lieux sabloneux, *Fam.* IV. *Genre* XII. n. 1. *& suiv.* p. 142. *& suiv.*
Goncokilatelli, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 29. p. 110.
Gorge rouge, ou Rouge gorge, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. p. 117.
Gorge bleue, *ibid. n.* 3. p. 117.
Grand Gosier, Onocrotale, ou Pelican, *Fam.* VI. *n.* 1. p. 187. p. 188.

Grand Rouge queue d'Albin, eſpece de Grive, le même que le Merle de rocher, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 32. p. 110.
Petit Grimpereau noir d'Albin, *Fam.* III. *Genre* II. *n.* 4. p. 80.
Grimpereaux, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. p. 147.
Grand & petit Grimpereau d'arbres, *ibid. n.* 1. p. 147.
Grimpereau du Mexique, nommé Nochtotolt, *ibid. n.* 2. p. 147.
Grimpereau à ailes noires, *ibid. n.* 13. p. 150.
Grimpereau brun, *ibid. n.* 14. p. 150.
Grimpereau de Bengale, *ibid. n.* 19. p. 151.
Griſole d'Aldrovande, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 12. p. 118.
Grives, *Fam.* IV. *Genre* V. p. 105.
Grande Grive, *ibid. n.* 1. p. 105.
Simple Grive, *ibid. n.* 2. p. 106.
Grive, *Turdus Iliacus*, *ibid. n.* 3. p. 106.
Petite Grive, ou Mauvis, *ibid. n.* 4. p. 106.
Grive noire, ou Merle, *ibid. n.* 5. p. 106.
Grive ou Merle à collier, *ibid n.* 6. p. 107.
Grive dorée, ou Merle doré, *ibid. n.* 7. p. 107.
Grive, ou l'Oiſeau jaune de Bengale, *n.* 7. p. 107.
Grive rouge à tête bleue azur, *ibid. n.* 8. p. 107.
Grives blanches de Friſch, *ibid. n.* 9. p. 107.
Grive ou Tourdelle, ou Pie Grieche d'Albin, *ibid. n.* 10. p. 107.
Grive, ou Moineau ſolitaire, *ibid. n.* 11. p. 108.
Grive rouge de Surinam, *ibid. n.* 12. p. 108.
Petite Grive variée, Ipajuba, ou Japu de Marcgrave, peut-être le même que le Roſſignol de Virginie, *ibid. n.* 13. p. 108.
Petite Grive à goſier noir, Baltimore de Cateſby, *ibid. n.* 14. p. 108.
Grive variée de noir & de jaune, autre Baltimore de Cateſby, *ibid. n.* 15. p. 109.
Grive noire, Merle Pie d'Albin, *ibid. n.* 16. p. 109.
Grive brune de paſſage de la Caroline, *ibid. n.* 17. p. 109.
Grive ou Merle aquatique, *ibid. n.* 18. p. 109.
Grive rouſſe, *ibid. n.* 19. p. 109.
Grive aux yeux bleus, Oiſeau de Banana de la Jamaïque d'Albin, *ibid. n.* 20. p. 109.
Petite Grive cendrée, ou blanche, le Mocqueur de Cateſby, *ibid. n.* 21. p. 109.
Grive aux jambes rouges, & l'iris dorée, *ibid. n.* 22. p. 109.

Petite Grive de Cateſby, *ibid. n.* 23. p. 109.
Grive ou Merle des Indes, Jacapu de Marcgrave, *ibid. n.* 24. p. 109.
Grive à couronne rouge, *ibid. n.* 25. p. 109.
Grive ou Cul blanc à poitrine jaune de Cateſby, *ibid. n.* 26. p. 110.
Grive ou Merle brun de la Jamaïque, *ibid. n.* 27. p. 110.
Grive hupée, ou Preneur de Mouches hupé, *ibid. n.* 28. p. 110.
Petite Grive de l'Amérique, Nichtingale de Rai, Concocktlatelli de Nieremberg & d'Hernandez, & peut-être le Mocqueur de Cateſby, *n.* 29. p. 110.
Grive ou Baniahbow de Bengale, *ibid. n.* 30. p. 110.
Grive hupée, ou Oiſeau de Paradis du Breſil, Cuiri-Acamaku hupé de Seba, *ibid. n.* 31. p. 110.
Grive ou Merle de rocher, grande queue d'Albin, *ibid. n.* 32. p. 110.
Grive jaune & noire de Cateſby, *ibid. n* 33. p. 110.
Grive hupée, ou Geai de Boheme, *ibid. n.* 34. p. 111.
Grive ou Jaſeur de la Caroline, *ibid. n.* 35. p. 111.
Grive de marais, chantante, *ibid. n.* 36. p. 111.
Grive couleur de roſe, *ibid. n.* 37. p. 111.
Gros-Becs, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. p. 133.
Gros-Bec ordinaire, *ibid. n.* 1. p. 133.
Gros-Bec de Gamboa, *ibid. n.* 2. p. 133.
Gros-Bec hupé des Indes, *ibid. n.* 3. p. 133.
Gros-Bec verd, *ibid. n.* 4. p. 133.
Gros-Bec couleur ſanguine, ou Bouvreuil, ou Pivoine, *ibid. n.* 5. p. 133.
Gros-Bec noir de Cateſby, *ibid. n.* 6. p. 133.
Gros-Bec bleu de Cateſby, *ibid. n.* 7. p. 133.
Gros-Bec aux ailes noires du Mexique, *ibid. n.* 8. p. 133.
Gros-Bec violet, *ibid. n.* 9. p. 133.
Gros-Bec bleu-azur, *ibid. n.* 10. p. 133.
Gros-Bec noirâtre, ou Rouge queue noirâtre d'Albin, *ibid. n.* 11. p. 134.
Gros-Bec bleuâtre, *ibid. n.* 12. p. 134.
Gros-Bec, nommé Loxia, *ibid. n.* 13. p. 134.
Groſſan de Feuillée, eſpece de Mouette, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 17. p. 183.
Grue, *Fam.* IV. *Genre* XVIII. p. 163.
Grue vulgaire, *ibid. n.* 1. p. 163.
Grue des Indes, *ibid. n.* 2. p. 163.

Grue Baléarique, *ibid. n.* 3.
Grue blanche du Japon, *ibid n.* 4.
Grande Grue des Indes, *ibid. n.* 5. p. 164.
Grue de Numidie, ou Demoiſelle, *ibid n.* 6. p. 164.
Guacaguaca, grande Mouette cendrée, *Fam.* V. *Genre* III. *n.* 2. p. 180.
Guainumbi. Voyez Colibri, *Fam.* IV. *Genre* XIV. p. 146.
Guara, eſpece de Courlis, *n.* 5. p. 152.
Guepiers ou Merops, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* II. *n.* 10. p. 152.
Guepier cendré, *ibid. n.* 11. p. 152.
Guepier de Geſner, *ibid. n.* 12 p. 153.
Guepier du Breſil, *ibid. n.* 13. p. 152.
Guillemot ou Lomvia, *Fam.* VII. *n.* 2. p. 191.
Guiraquera de Marcgrave, *Fam.* IV. *Genre* VIII. *Tribu* I. *n.* 3. p. 121.
Guit-Guit, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 11. p. 149.

H.

HARLE de Belon, *Fam.* V. *Genre* II. *eſp.* II. *n.* 2. p. 184.
Harponnier, *Fam.* IV. *Genre* XX. *n.* 1. c'eſt une eſpece de Heron, p. 170.
Harponnier cendré, *ibid. n.* 2. p. 170.
Harponnier à coeffure rouge, *ibid. n.* 3. p. 170.
Hautgef, eſpece de Lare ou de Mouette. Voyez Mouette.
Henbarrier, ou Perturbateur des Poules d'Albin, eſpece de Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 22. p 93.
Héron étoilé d'Albin, ou Oiſeau de combat, ou Soldat, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n* 10 p. 143.
Héron cendré, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* I. *n.* 1. p. 165.
Grand Heron blanc, *ibid. n.* 2. p. 165.
Héron noir, *ibid. n.* 3. p. 165.
Héron étoilé, *ibid. n.* 4. p. 165.
Héron varié, ou Corbeau de nuit, Nycticorax, *ibid. n.* 5. p. 166.
Petit Héron étoilé, *ibid. n.* 6. p. 166.
Héron bleu, *ibid. n.* 7. p. 166.
Heron brun, ou Butor brun, *ibid. n.* 8. p. 166.
Héron étoilé, ou Butor hupé de l'Amérique, *ibid. n* 9. p. 166.
Petit Héron blanc de la Caroline, *ibid. n.* 10. p. 166.
Héron, Porphyrio, eſpece d'Ibis, ou Oiſeau pourpre d'Albin, *ibid. n.* 11. p 166.

Héron cendré, tirant ſur le jaune, *ibid. n.* 12. p. 167.
Héron verd & jaune, *ibid. n* 13. p. 167.
Grand Héron hupé de l'Amérique, *ibid. n.* 14. p. 167.
Hibou, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. p. 95.
Grand Hibou, *ibid. n.* 1. p. 95.
Hibou cendré, *ibid. n* 3. p. 97.
Petit Hibou, *ibid. n.* 4. p. 97.
Hibou ou Duc à oreille, *ibid. n.* 7. p. 98.
Hirondelle de Mer des Hollandois, qui ſent l'ambre, *Fam.* IV. *Genre* VIII. *Tribu* I. *n.* 4. p 122.
Hirondelle domeſtique ou de cheminée, *Fam.* IV. *Genre* VIII. *Tribu* II. *n.* 1. p. 121.
Hirondelle ruſtique ou de fenêtre, *ibid. n.* 2. *p.* 122.
Hirondelle de rivage, *ibid. n.* 3. ou petit Martinet, p. 122.
Grande Hirondelle de muraille, ou Grand Martinet, *ibid. n.* 4. p. 122.
Hirondelle de l'Amérique, *ibid.* p. 122.
Grande Hirondelle du détroit de Gibraltar, *ibid.* p. 122.
Hirondelle qui imite l'Alouette par ſon chant, *ibid. n.* 5. p. 121.
Hirondelle de l'Amérique, *ibid. n.* 6. p. 123.
Hirondelle de la Chine, *ibid. n.* 7. *p.* 123.
Hirondelle de Mer, eſpece de Mouette, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 3. nommée auſſi Vautour pêcheur, & Gerfault marin, p. 180.
Grande Hirondelle de mer d'Albin, eſpece de Mouette, *ibid. n.* 10. p 182.
Petite Hirondelle de mer d'Albin, *ibid. n.* 12. p. 132.
Hirondelle de Mer de Sloane, *ibid. n.* 15. p. 183.
Hoche-queue. Voyez Bergeronette.
Hoytzillin, eſpece de Grimpereau du Mexique, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 3. dont quatre eſpeces, p. 148.
Hoitzillin, nommé Papillon, *ibid. n.* 6. p. 149.
Hoixotoel, eſpece de Corneille, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 100. *n.* 9.
Hulote, Oiſeau nocturne, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* IV. p. 96.
Hulotte Vautour, *ibid. n.* 9. p. 98.
Hulotte Faucon, *ibid. n.* 10. p. 98.
Hupe, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* II. *n.* 14. p. 153.
Hupe, eſpece d'Oiſeau de Paradis, *ibid. n.* 15. p. 153.
Hupe de Montagne, *ibid. n.* 16. p. 153.

I.

JABIRU, eſpece de Grue. Voyez Grue, p. 164.
Jacamaciri, Pic du Breſil, *Fam.* III. *Genre* II. *n.* 15. p. 81.
Jacapani, eſpece de Roſſignol, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. *n.* 13. p. 115.
Jacapu de Marcgrave, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 24. p. 109.
Jacobin, Pigeon, p. 160. *n.* 5.
Jambu de Piſon, Perdrix, *n.* 3. p. 157.
Japu, p. 108. *n.* 13.
Jaſeur de la Caroline, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 35. p. 111.
Ibis, au mot Cicogne, p. 168.
Ipajuba, ou Japu de Marcgrave, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 13. p. 108.

K.

KAKATOEHA, Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 5. p. 76.
Kakopit-Tſiæi, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 7. p. 149.
Kvvtge-gef de Martens, eſpece de Mouette, *Fam.* VII. *n.* 9. p. 192.
Knyper, Oiſeau à bec de ſcie, *Fam.* V. *Genre* II. *eſp.* II. *n.* 1. p. 184

L.

LANIER, eſpece de Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I *Tribu* III. *n.* 26. Voyez à Faucon-Lanier les différentes eſpeces, *p.* 91 *& ſuiv.*
Lares. Voyez Mouettes, *Fam.* V. *Genre* II. p. 179. & 180.
Lavandiere. Voyez Bergeronette.
Lauray, Perroquet du Breſil, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 17. p. 78.
Linot, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III. p. 131.
Linot ſimple, *ibid. n.* 1. p. 131.
Linot de rocher, ou de montagne, *ibid. n.* 2. p. 131.
Linot rouge, *ibid. n.* 3. p. 131.
Linot à poitrine jaune, *ibid. n.* 4. p. 132.
Linot jaune & noir, *ibid. n.* 5. p. 132.
Linot vert, ou Serin commun, *ibid. n.* 6. p. 132.

Linot du Mexique, *ibid. n.* 7. p. 132.
Linot à queue longue du Breſil, *ibid. n.* 8. p. 132.
Linot bleu du Mexique, eſpece de Pinçon, *Fam* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 8. p. 137.
Lomben de Martens, *Fam.* VII. *n.* 8. p. 192.
Loom ou Lumme, eſpece de Plongeon, *Fam* V. *Genre* II. *eſp.* III. *n* 1. p. 186.
Lomvia ou Guillemot, *Fam.* VII. *n.* 2. p. 191.
Loxia, eſpece de Gros-Bec, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 13. p. 135.

M.

MAcao, Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 1. p. 76. *n.* 2. p. 77. *n.* 26. p. 78.
Macao bleu jaune, *ibid. n.* 2. p. 76.
Maccao, Perroquet de la Jamaïque, *ibid.* p. 79.
Macreuſe. Voyez Diable de Mer.
Malle Mutke, eſpece de Lare ou de Mouette, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 1. p. 180.
Manucodiata, Oiſeaux de Paradis, *Fam.* IV. *Genre* III. *n.* 13. p. 103.
Maripoſa des Eſpagnols, eſpece de Gros-Bec, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 6. p. 134.
Mauce, eſpece de Mouette, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 2. p. 180.
Mathoen des Hollandois. Voyez Pies de Mer.
Mauvis, eſpece de Grive, *Fam.* V. *Genre* V. *n.* 4. p. 106.
Merle du Mexique de Seba, du Genre des Pies, *Fam.* IV. *Genre* III. *n.* 5. p. 102.
Merle noir, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 5. p. 106.
Merle à collier, *ibid. n.* 6. p. 107.
Merle doré, *ibid. n.* 7. p. 108.
Merle-Pie d'Albin, ou Grive noire, *ibid. n.* 16. p. 109.
Merle des Indes, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 24. p. 109.
Merle brun de la Jamaïque, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 27. p. 110.
Merle aquatique, *ibid. n.* 18. p. 119.
Merle de rocher, *ibid. n.* 32. p. 110.
Méſange au croupion jaune de Cateſby, du Genre des Roſſignols, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. *n.* 8. *p.* 15.
Méſange de Bahama, *ibid. n.* 9. p. 115.
Méſange à queue longue d'Albin, eſpece de Bergeronette, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 8. p. 118.
Grande Méſange, *Fam.* IV. *Genre* IX. *n.* 1. p. 123.

Méſange-Pinçon, *ibid.*
Méſange de bois, *ibid. n.* 2. p. 123.
Méſange nonette ou bleue, *ibid. n.* 3. p. 123.
Méſange brune, *ibid. n.* 4. p. 124.
Méſange au capuchon noir de l'Amérique, *ibid. n.* 5. p. 124.
Méſange hupée, *ibid n.* 6. p. 124.
Méſange à queue longue, *ibid. n.* 7. p. 124.
Méſange à barbe noire, ou Moineau d'Inde, ou Mouſtache, *ibid. n.* 8. p. 124.
Méſange à queue longue & à tête variée, *ibid. n.* 9. p 124.
Méſange de Lithuanie, *ibid. n.* 10. p. 124.
Méſange jaune de la Caroline, *ibid. n.* 11. p. 124.
Méſange hupée de Cateſby, *ibid. n.* 12. p. 124.
Méſange à tête couleur d'or, *ibid. n.* 13. p. 124.
Méſange de l'Amérique à gorge jaune, *ibid. n.* 14. p. 125.
Méſange à figure de Pic, *ibid. n.* 15. p. 125.
Meſſager, Pigeon, p. 160 *n.* 4.
Mineur, petite Corneille des Indes Orientales, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 101 *n.* 13.
Mituparanga, Coq de Curaſſau, *Fam.* IV. *Genre* XVI *n.* 3. p. 154.
Mitu, *ibid.*
Moineau d'Inde, *Fam.* IV. *Genre* IX. *n.* 8. p. 124.
Moine, Vautour Moine, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* II *n.* 10. p. 90.
Moineau ſolitaire, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 11. p. 108.
Moineau domeſtique, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* I. *n.* 1. p. 126.
Moineau d'arbre, *ibid. n.* 2. p. 126.
Moineau, Serin de Canarie, *ibid. n.* 3 p. 126.
Moineau de Bengale, *ibid. n.* 4. p. 127.
Moineaux de la Chine, *ibid. n.* 5. & 6. p. 127.
Moineau noir, *ibid. n.* 7. p. 127.
Moineau de neige, *ibid. n.* 7. p. 127.
Moineau de Bahama, *ibid. n.* 9. p. 127.
Petit Moineau de Cateſby, *ibid. n.* 10. p. 127.
Moineau de Prez, *ibid. n.* 11. p. 127.
Moineau bleu brun, *ibid. n.* 12. p. 127.
Moineau approchant du Serin, *ibid. n.* 13. p. 127.
Moineau hupé à bec rouge, *ibid. n.* 14. p. 128.
Très-beau Moineau d'Afrique, *ibid. n.* 15. p. 128.
Moineau hupé, *ibid. n.* 16. p. 128.

Moineau noir, avec une bande blanche, *ibid.* *n.* 17. p. 128.
Moineau varié, *ibid.* *n.* 19. p. 128.
Moineau brun à tête noire, *ibid.* p. 128.
Petit Moineau montain, *ibid.* *n.* 20. p. 128.
Moineau du Cap de Bonne-Espérance, *ibid.* *n.* 21. p. 128.
Moineau à queue très-longue, *ibid.* *n.* 22. p. 128.
Moineau musqué, ou Roitelet des Indes, *Fam.* IV. *Genre* XIV. *n.* 3. p. 147.
Monocéros, *Fam.* III. p. 85.
Moqueur de Catesby, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 21. p. 109. & *n.* 29. p. 110.
Morillon. Voyez Dotterel des Anglois.
Mouettes ou Lares, *Fam.* V. *Genre* II. p. 179. & 180.
Grande Mouette, *ibid.* *n.* 1. *p.* 180.
Grande Mouette cendrée, *ibid.* *n.* 2. p. 180.
Mouette, Hirondelle de Mer, Vautour pêcheur, Gerfaut marin, *ibid.* *n.* 3. p. 180.
Petite Mouette cendrée, *ibid.* *n.* 4. p. 181.
Mouette à bec noir, *ibid.* *n* 5. p. 181.
Grande Mouette grise, ou Bourguemestre de Groenland, *ibid.* *n.* 6. p. 181.
Mouette brune, *ibid.* *n.* 7. p. 181.
Mouette à tête rouge, *ibid.* *n.* 8. p. 181.
Petite Mouette d'Irlande, *ibid.* *n.* 9. p. 181.
Mouette blanche, ou grande Hirondelle d'Albin, *ibid.* *n.* 10. p. 182.
Petite Mouette cendrée, *ibid.* *n.* 11. p. 182.
Petite Mouette noire, ou petite Hirondelle d'Albin, *ibid.* *n.* 12. p. 182.
Mouette pêcheur, *ibid.* *n.* 13. p. 182.
Mouette tachetée du Comte de Marsilly, *ibid.* *n.* 14. p. 182.
Mouette ou Hirondelle de mer de Sloane, *ibid.* *n.* 15. p. 183.
Mouette rieuse de Catesby, *ibid.* *n.* 16. p. 183.
Mouette de Feuillée, *ibid.* *n.* 17. p. 183.
Mouette paresseuse, *ibid.* *n.* 18. p. 183.
Moustache, espece de Mésange, *Fam.* IV. *Genre* IX. *n.* 8. p. 124.
Mucucugua, *Fam.* II. *Genre* III. *n.* 4. p. 73.
Murmures de Mango, *Fam.* IV. *Genre* XV. *n.* 18. p. 150.

## N.

NEgro-Jabiruguacu, espece de Grue. Voyez Grue.
Nochtotolt, espece de Grimpereau du Mexique, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Trib.* I. *n.* 2. p. 148.
Nycticorax, ou Corbeau de nuit, espece de Héron, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *n.* 5. p. 166.
Nyctingale de Rai, espece de Grive de l'Amérique, *Fam.* V. *Genre* V. *n.* 29. p. 110.

## O.

OCostinitzcam, Corneille du Mexique, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 100. *n.* 8.
Oies, *Fam.* V. *Genre* I. p. 171.
Oie Cigne, *ibid.* n. 1. au mot Oie p. 171.
Oie domestique, *ibid. n.* 2. p. 171.
Oie sauvage, *ibid. n.* 3. p. 171.
Oie d'Espagne, *ibid. n.* 4. p. 171.
Oie de Moscovie & de Siberie, *ibid. n.* 5. p. 171.
Oie de Canada, *ibid. n.* 6. p. 171.
Oie de Chili, *ibid. n.* 7. p. 172.
Oie de Brenta, *ibid. n.* 8. p. 172.
Oie Tardone de Belon, *ibid. n.* 9. p. 173.
Oie à plumes molles, *ibid. n.* 10. p. 172.
Oie de neige, *ibid. n.* 11. p. 173.
Oie nommée Embergoose par Sibbald, *ibid. n.* 12. p. 173.
Oie du même, nommée Duntergoose, *ibid. n.* 13. p. 173.
Oie de Solan, *Fam.* VI. *n.* 6. p. 188.
Oie de Magellan, ou Pinguin, *Fam.* VII. *n.* 4. p. 191.
Oiseau de Cocho, espece de Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 22. p. 78.
Oiseau de Fange d'Albin, *Salicaria* de Gesner, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Trib.* I. *n.* 4. p. 115.
Oiseau à poitrine argentée de M. Frisch, du Genre des *Sylvia*, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 10. p. 118.
Petit Oiseau de l'Amérique à tête noire, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III *n.* 18. p. 119.
Petit Oiseau varié de Seba, *ibid. n.* 19. p. 119.
Petit Oiseau d'Edouard, rouge à la poitrine, le dos & la queue bleus, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Trib.* III. *n.* 21. p. 120.

Oiſeau de Ris de Cateſby, eſpece d'Ortolan, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* II. *n.* 6. p. 130.
Oiſeau à tête rouge d'Albin, eſpece de Linot, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III. *n.* 3. p. 132.
Oiſeau des Amaduvads, eſpece de Pinçon, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 15. p. 139.
Oiſeau de Jupiter, Chardonneret, *Fam.* IV. *Genre* X. *Fam.* V. *n.* 4. p. 136.
Oiſeau de combat, ou Soldat, Héron étoilé d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 10. p. 143.
Oiſeau de Banana d'Albin, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. n. 20. p. 109.
Oiſeau à bec de ſcie, *Fam.* V. *Genre* II. *eſp.* II. *n.* 4. p. 185.
Oiſeau de Montagne, Coq de Curaſſau, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 3. p. 152.
Oiſeau du Tropique, *Fam.* VI. *n.* 7. p. 190.
Oiſeau à bec tranchant d'Albin, ou Alka, *Fam.* VII. n. ſ.
Oiſeau de Paradis, dont dix eſpeces, *Fam.* IV. *Genre* III. n. 13. p. 103.
Oiſeau de Paradis du Breſil, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 31. p. 110.
Onocrotale ou Pelican, *Fam.* VI. *n.* 1. p. 187.
Ortolans, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* II. p. 129.
Ortolan blanc, *ibid. n.* 1. p. 129.
Ortolan, Traguet d'Albin, *ibid. n.* 2. p. 129.
Ortolan, Zivola d'Olina, *ibid. n.* 3. p. 129.
Ortolan varié, ou petit Pinçon de Montagne d'Albin, *ibid. n.* 4. p. 129.
Ortolan jaune, *ibid. n.* 5. p. 130.
Ortolan de la Caroline, *ibid n.* 6. p. 130.
Ortolan d'Amboïne, *ibid n.* 7. p. 130.
Ortolan du Mexique, *ibid. n.* 8. p. 130.
Ortolan jaune du Mexique, *ibid. n.* 9. p. 130.
Ortolan à tête noire, *ibid. n.* 10. p. 130.
Oryzevora, Gros-Bec de l'Iſle de Java, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 12. p. 135.
Outarde, *Fam.* II. *Genre* III. *n.* 1. p. 72.
Outarde d'Arabie, *ibid. n.* 3. p. 73.
Outarde du Breſil, *ibid. n.* 4. p. 73.
Outarde d'Albin, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 4. p. 74.

P.

PAlette, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* III. *n.* 1. p. 168.
Palette du Breſil, *ibid. n.* 2. p. 169.
Palette de couleur rouge, *ibid. n.* 3. p. 169.
Paon, *Fam.* IV. *Genre* XVI. p. 155.
Papillon, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. n. 6.
Paradis. Voyez Oiſeaux de Paradis.
Pauxi de Nieremberg, p. 154. *n.* 3.
Pelican d'arbre de l'Amérique, *Fam.* IV. *Genre* XIX. p. 169. *n.* 5.
Pelican ou grand Goſier, *Fam.* VI. *n.* 1. p. 187. 188.
Perdrix, *Fam.* IV. *Genre* XVI. p. 157.
Perdrix cendrée ou griſe, *ibid. n.* 1.
Perdrix de Damas, *ibid. n.* 2.
Perdrix de la nouvelle Angleterre, *ibid. n.* 3.
Perdrix rouge, *ibid. n* 4.
Perdrix nommée Alchata, *ibid. n.* 5.
Perdrix de la Virginie, *ibid. n.* 6.
Perdrix blanche, ou Bartavelle, *ibid. n.* 4. au mot Coq de Bruyere, p. 158.
Perroquets, *Fam.* III. *Genre* I. p. 76.
Grand Perroquet de Macao, *ibid. n.* 1. p. 76.
Perroquet bleu & jaune, Macacaow, *ibid. n.* 2. p. 76.
Perroquet à tête bleue, *ibid. n.* 3. p. 76.
Perroquet à tête verte, *ibid. n.* 4. p. 76.
Perroquet nommé Kakatoeha, *ibid. n.* 5. p. 76.
Perroquet blanc, nommé Ratoeha, *ibid. n.* 6. p. 77.
Perroquet roux à tête noire, *ibid. n.* 7. p. 77.
Perroquet roux aux ailes & cuiſſes vertes, *ibid. n.* 8. p. 77.
Perroquet verd au front blanc; *ibid. n.* 9. p. 77.
Perroquet verd à tête de ſafran, *ibid. n.* 10. p. 77.
Perroquet verd, à tête, épaules, & cuiſſes jaunes, *ibid. n.* 11. p. 77.
Grand Perroquet verd, *ibid. n.* 12. p. 77.
Perroquet cendré à queue rouge, *ibid. n.* 13. p. 77.
Perroquet à tête jaune, *ibid. n.* 14. p. 77.
Perroquet couleur de ſafran, *ibid. n.* 15. p. 77.
Petit Perroquet d'Angola, *ibid.* p. 78.
Perroquet à tête noire, *ibid. n.* 16. p. 78.
Perroquet à tête bleu-céleſte, *ibid. n.* 17. p. 78.
Perroquet, Oiſeau de Paradis de Cuba, *ibid. n.* 18. p. 78.

Perroquet de la Caroline, *ibid. n.* 19. p. 78.
Perroquet verd à queue longue, *ibid. n.* 20. p. 78.
Petit Perroquet verd, *ibid. n.* 21. p. 78.
Perroquet verd des Indes Orientales d'Albin, & un autre d'Edouard, *ibid.*
Perroquet à collier rouge, *ibid. n.* 22. p. 78.
Perroquet de Madagascar, *ibid. n.* 23. p. 78.
Perroquet des Barbades, *ibid. n.* 24. p. 78.
Perroquet de Bengale, *ibid. n.* 25. p. 79.
Perroquet de la Jamaïque, nommé Maccaovv, *ibid. n.* 26. p. 79.
Perroquet des Indes Orientales, *ibid. n.* 27. p. 79.
Petit Perroquet hupé rouge de Seba, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III. *n.* 3. p. 133.
Perturbateur des Poules, espece de Faucon. Voyez Faucon & Henrarrier.
Petrell, Pinçon de mer ou de tempête, *Fam.* VII.
Petronelle des Italiens, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 11. p. 118.
Phœnicoptere, ou Flamand, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *n.* 4. p. 169.
Pics, *Fam.* III. *Genre* II. p. 79
Grand Pic noir, *ibid. n.* 1. p. 79.
Pic à bec blanc, *ibid. n.* 2. p. 79.
Grand Pic noir à tête rouge, *ibid. n.* 3. p. 79.
Petit Pic noir, *ibid. n.* 4. p. 79.
Pic verd de M. Frisch, *ibid. n.* 5. p. 80.
Grand Pic verd bigarré, ou grand Grimpereau, *ibid. n.* 6. p. 80.
Pic grivelé de Catesby, ou petit Grimpereau, ou Pic vert bigarré, *ibid. n.* 7. p. 80.
Petit Pic verd tacheté de Catesby, *ibid. n.* 8. p. 80.
Pic verd velu de Catesby, *ibid. n.* 9. p. 80.
Pic verd à ventre jaune, *ibid. n.* 10. p. 80.
Pic verd à ventre rouge, *ibid. n.* 11. p. 80.
Pic verd à tête & collier rouge, *ibid. n.* 12. p. 80.
Pic verd de Bengale, *ibid. n.* 13. p. 80.
Pic à collier, ou Torcol, *ibid. n.* 14. p. 81.
Pic du Brefil, *ibid. n.* 15. p. 81.
Pic, Curucui de Marcgrave, *ibid. n.* 16. p. 81.
Pic verd jaune, *ibid. n.* 7. p. 81.
Pic de muraille, *ibid.*

Grand Pic verd de Cateſby, du Genre de Coucous, *Fam.* II. *Genre* III. *n.* 3. p. 82.
Pie de mer, *Fam.* II. *Genre* V. *n.* 1. p. 75.
Pie de mer de Cateſby, *ibid. Genre* VI. p. 75.
Pie du Breſil, ou Toucan, *Fam.* III. *Genre* VI. p. 85.
Pie vulgaire, *Fam.* IV. *Genre* III. *n.* 1. p. 101.
Pie mangeuſe de glan, ou Geai, *ibid. n.* 2. *p.* 101.
Pie bleue hupée de Cateſby, ou Geai bleu hupé, *ibid. n.* 3. p. 102.
Pie, Caſſe-noiſette, *ibid. n.* 4. p. 102.
Pie, Merle du Mexique, *ibid. n.* 5. p. 102.
Pie du Mexique, *ibid. n.* 6. p. 102.
Pie ou Geai de Straſbourg, *ibid. n.* 7. Le Geai du Cap de Bonne-Eſpérance d'Albin en approche, p 102.
Pie ou Geai de Bengale d'Albin, *ibid. n.* 8. p. 103.
Pie grieche de Bengale d'Albin, *ibid. n.* 9. p. 103. & *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 14. p. 138.
Pie de Ternate de Seba, *ibid. n.* 10. p. 103.
Pie blanche & noire, ou Oiſeau de Paradis des Indes Orientales, *ibid. n.* 11. p. 103.
Pie jaune & noire de Rai, *ibid. n.* 12. p. 103.
Pie de Paradis, *ibid. n.* 13. p. 103. Ce ſont les Oiſeaux de Paradis, dont dix eſpeces différentes, p. 103.
Pie noire de la Jamaïque, *ibid. n.* 14. p. 104.
Pie grieche d'Albin, ou Tourdelle, eſpece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 10. p. 107.
Pie de mer, ou Plongeon à long bec, *Fam.* VII. *n.* 3. p. 191.
Pigeons, *Fam.* IV. *Genre* XVII. p. 159.
Pigeon commun, *ibid. n.* 1. p. 160.
Pigeon grouleux ou de Fuie, *ibid. n.* 2. p. 160.
Pigeon a large queue, *ibid. n.* 3. p. 160.
Pigeon courrier, *ibid. n.* 4. p. 160.
Pigeon Jacobin, *ibid. n.* 5. p. 160.
Pigeon Turc, *ibid. n.* 6. p. 160.
Pigeon à collier, *ibid. n.* 7. *p.* 161.
Pigeon de bois, *ibid. n.* 8.
Pigeon de rocher, *ibid. n* 9.
Pigeon Biſet, *ibid. n.* 10.
Pigeon ſauvage de l'Iſle de S. Thomas, *ibid. n.* 11.
Pigeon, Tourterelle, *ibid. n.* 12.
Pigeon, Tourterelle des Indes, *ibid n.* 13.
Pigeon, Colombe de Portugal, *ibid. n.* 14.

Pigeon ou Colombe à tête noire de la Jamaïque, *ibid. n.* 15.
Pigeon de passage de la Caroline, *ibid. n.* 16.
Pigeon, Tourterelle de la Caroline, *ibid. n.* 17. p. 162.
Pigeon à couronne blanche, *ibid. n.* 18.
Pigeon des Indes Orientales, *ibid. n.* 19.
Pigeon, Tourterelle des Indes Orientales, *ibid. n.* 20.
Beau Pigeon de la Chine, *ibid. n.* 21.
Pigeon de Sloane, *ibid. n.* 22.
Pigeon de Nincombar, *ibid. n.* 23.
Pigeon, petite Tourterelle de Catesby, *ibid. n.* 24.
Pigeon de Guinée, *ibid. n.* 25.
Pigeon brun des Indes, *ibid. n.* 26. p. 163.
Pigeon Cavalier d'Albin, *ibid. n.* 27. *ibid.*
Pigeon de Groenland, *Fam.* VI. p. 190.
Pinçons, *Fam.* IV. *Genre* X.
Petit Pinçon de montagne d'Albin, *ibid. Tribu* III. *n.* 4. p. 129. & 131. *n.* 12.
Pinçon vulgaire, *ibid. Tribu* V. *n.* 1. p. 136.
Pinçon blanc de Schvenkfeld, *ibid.*
Pinçon montain, *ibid. n.* 2. p. 136.
Pinçon à tête blanche, ou Pinçon-Pie, *ibid. n.* 3. p. 136.
Pinçon de Jupiter, ou Chardonneret, *ibid. n.* 4. p. 136.
Pinçon, Chardonneret de l'Amerique, *ibid. n.* 5. p. 136.
Pinçon de Bahama, *ibid. n.* 6. p. 137.
Pinçon de trois couleurs, *ibid. n.* 7. p. 137.
Pinçon, Linote bleue du Mexique, *ibid. n.* 8. p. 137.
Pinçon rouge, Preneur de Mouches de Catesby, *ibid. n.* 9. p. 137.
Pinçon à tête blanche, *ibid. n.* 10. p. 138.
Pinçon hupé, *ibid. n.* 11. p. 138.
Pinçon à poitrine bleue, *ibid. n.* 12. p. 138.
Pinçon, Chardonneret de la Chine, *ibid. n.* 13. p. 138.
Pinçon noir du Mexique, *ibid. n.* 14. p. 138.
Petit Pinçon rouge, ou Oiseau des Amaduvats d'Albin, *ibid. n.* 15. p. 139.
Pinçon brun de l'Amérique, *ibid. n.* 16. p. 139.
Pinçon brun & noir du même Païs, *ibid. n.* 17. p. 139.
Pinçon de mer ou de tempête, *Fam.* VII. *n.* 12. p. 192.
Pinguin, ou Punguin, Oie de Magellan, *Fam.* VII. *n.* 4. p. 191.
Pintade, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 2. p. 154.
Pirate, *Tribu* VI. *n.* 7.
Pivoine ou Bouvreuil, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 5. p. 134.

Pititli, espece de Moineau. Voyez Moineaux.
Plongeon de mer d'Albin, espece de Canard, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 30. au mot Canard, p. 179.
Grand Plongeon, *Fam.* V. *Genre* II. *esp.* III. *n.* 1. p. 185.
Plongeon Arctique, *ibid. n.* 2. p. 186.
Plongeon de Groenland, *ibid. n.* 3. p. 186.
Plongeon, ou Pie de mer à long bec, *Fam.* VII. *n.* 3. p. 191.
Pluvier verd, *Fam.* II. p. 74. *n.* 2.
Pluvier cendré, *Fam.* II. *n.* 3. p. 74.
Pluvier criard, *ibid. n.* 8. p. 74.
Porphyrio d'Amboïne, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *n.* 11. p. 166.
Poule domestique, *Tribu* IV. *Genre* XVI. *n.* 1. au mot Coq, p. 154.
Poule Pintade, ou de Guinée. Voyez Pintade, p. 154.
Poule rouge, p. 154. *n.* 3.
Poule d'eau, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 2. p. 142.
Poule d'eau. Voyez Foulque.
Préconsul ou Bourguemestre de Martens, *Fam.* VII. *n.* 6. p. 181. *n.* 7. p. 192.
Preneur d'Huîtres de Catesby, *Fam.* II. *Genre* VI. p. 75.
Preneur de Mouches hupé, espece de Grive, *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 28. p. 110.
Preneur de Mouches noirâtre de Catesby, du Genre des Rossignols, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. *n.* 5. p. 115.
Preneur de Mouches aux yeux rouges, *ibid n.* 6. p. 115.
Preneur de Mouches brun, *ibid. n.* 7. p. 115.
Preneur de Mouches brun & blanc de Sloane, *ibid. n.* 11. p. 115.
Preneur de Mouches d'un brun pâle du même, *ibid. n.* 14. p. 116.
Preneur de Mouches d'Edouard, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 23. p. 120.
Preneur de Mouches de Catesby, ou Pinçon rouge, *Fam.* IV. *Genre* X. *Fam.* V. *n.* 9 p. 139.
Proyer de Belon, *Fam.* IV. Voyez Bouvreuil.
Prunelle de Jonston, *Fam.* V. *Genre* VII. *Tribu* III *n.* 13. p. 119.
Puffin, espece de Mouette, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 18. p. 183.
Pyrod, Merle doré, *Fam.* IV. *Genre* V. p. 107. *n.* 7.

## Q

QUatre-Occhi des Italiens, espece de Canard, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 27. au mot Canard, p. 178.
Quercerelle, *Fam.* IV. *Tribu* III. *n.* 7. p. 91.

## R.

RAle, *Fam.* IV. *Genre* XIII. p. 144.
Râle terrestre, ou Roi des Cailles, *ibid. n.* 1. p. 144.
Râle aquatique, *ibid. n.* 2. p. 144.
Râle cendré, *ibid. n.* 3. p. 145.
Râle terrestre de l'Amérique, *ibid. n.* 4. p. 145.
Râle aquatique de Bengale, *ibid. n.* 5. p. 145.
Râle aquatique à bec rouge, *ibid. n.* 6. p. 145.
Râle d'Edouard, *ibid.* n. 7. p. 145.
Ramier, espece de Pigeon, *Fam.* IV. *Genre* XVII. p. 161. *n.* 10.
Ratoeha, Perroquet, *Fam.* III. *Genre* I. *n.* 5. p. 77.
Rhinoceros, le même que Topeau.
Roi de Guinée, *Fam.* III. *Genre* V. p. 85.
Roi des Oiseaux de Paradis, p. 104. *n.* 7.
Roitelet, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* II. p. 116.
Roitelet ordinaire, *ibid. n.* 1. p. 116.
Roitelet non hupé, *ibid. n.* 2. p. 116.
Roitelet hupé, *ibid. n.* 3. p. 116.
Roitelets non hupés d'Albin, *ibid. n.* 15. p. 119.
Ronckje, espece de Colibri, *Fam.* V. *Genre* XIV. *n.* 3. p. 147.
Rossignols, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* I. p. 114.
Rossignol vulgaire, *ibid. n.* 1. p. 114.
Rossignol, Becfigue des Italiens, *ibid. n.* 2. p. 114.
Rossignol, Becfigue d'Olina, *ibid. n.* 3. p. 114.
Rossignol, Oiseau de fange d'Albin, *ibid. n.* 4. p. 115.
Rossignol noir, Preneur de Mouches de Catesby, *ibid. n.* 5. p. 115.
Rossignol, ou Preneur de Mouches aux yeux rouges de Catesby, *ibid. n.* 6. p. 115.
Rossignol, Preneur de Mouches brun du même, *ibid. n.* 7. p. 115.
Rossignol ou Mésange au croupion jaune du même, *ibid. n.* 8. p. 125.

Roſſignol ou Méſange de Bahama, *ibid. n.* 9. p. 115.
Roſſignol brun & jaune de Sloane, *ibid. n.* 10. p. 115.
Roſſignol ou Preneur de Mouches brun & blanc de Sloane, *ibid. n.* 11. p. 115.
Roſſignol aux ailes variées, *ibid. n.* 12. p 115.
Roſſignol, Jacapanini de Marcgrave, *ibid. n.* 13. p. 115.
Roſſignol, ou Preneur de Mouches d'un brun pâle de Sloane, *ibid. n.* 14. p. 116.
Roſſignol bleu & rouge d'Edouard, *ibid. n.* 15. p. 116.
Roſſignol bigarré, ou Arlequin de Cateſby, *ibid. n.* 16. p. 116.
Roſſignol de Bengale, *ibid. n.* 18. p. 116.
Roſſignol de muraille, *ibid. Tribu* III. *n.* 2. & de même que le Rouge-queue d'Albin, p. 117.
Le Roſſignol de l'Amérique d'Edouard, le Roſſignol de muraille de Cateſby, ſont des varietés.
Rotge, eſpece de Mouette de Martens, *Fam.* VII. n. 11. p. 192.
Rouge-gorge de l'Amérique hupé, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 10. p. 149.
Rouge-gorge, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 1. p. 117.
Rouge-gorge bleue de l'Amérigue, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* p. 3. 117.
Rouge-gorge verte, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 16. p. 119.
Rouge-gorge d'Edouard, verte & à tête noire. *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 22. p. 120.
Rouge-queue d'Albin, le même que le Roſſignol de muraille, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 2. p. 117.
Rouge-queue à goſier plombé, *ibid. n* 3. p. 117.
Rouge-queue de M. Friſch, *ibid. n.* 4. p. 118.
Rouge-queue à goſier gris du même, *ibid. n.* 5.
Rouge-queue noirâtre d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV. *n.* 11. p. 135.
Rouge-queue de Bengale, *n.* 14. p. 119.
Rouge queue d'Edouard, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 24. p. 120.
Rouge-queue griſe & à goſier noir, *ibid. n.* 25. p. 120.
Rouge-queue de la Chine, eſpece de Chardonneret, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 13. p. 138.

## S.

SAcre, Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 2. p. 91.
Saligna, eſpece de Corneille, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 100. *n.* 9.
Sargon d'Albin, eſpece de Canard, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 13. au mot Canard, p. 177.
Senateur de Martens, *Fam.* VII. *n.* 6. p. 192.
Serin de Canarie, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* I. *n.* 3. p. 126.
Serin de Canarie bâtard, *ibid. n.* 13.
Serin commun, *ibid. Tribu* III. *n.* 6.
Serran ou Verdier, *n.* 4. p. 134.
Soldat, ou Oiſeau de combat, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 10 p. 143.
Stront-jager, eſpece de Mouette de Martens, *Fam.* VII. *n.* 10. p 192.
Suceur de miel, *Fam.* IV. *Genre* XV. *n.* 5. p. 149.
Sylvia, tous les petits Oiſeaux qui vivent dans les bois, comme les Rouges-gorges, Fauvettes, &c. *Fam.* IV. *Genre* VII. *Trib.* II. n. 1. *& ſuiv.* p. 114. *& ſuiv.*

## T.

TAdorne de Belon, eſpece d'Oie, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 9. p. 173.
Tantale, *Fam.* IV. *Genre* XIX. *Tribu* III. *n.* 5. p. 169.
Tarin, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III. *n.* 6. p. 132.
Tatac, petit Oiſeau de l'Amérique, de la Tribu des *Sylvia*, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 20. p. 120.
Tauraco, ou Oiſeau Royal, *Fam.* III. *Genre* V. p. 85.
Tepetotolt, Coq de Curaſſau, *Fam.* IV. *Genre* XVI. *n.* 3. p. 154.
Tête noire, *Fam.* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 14. p. 119.
Topeau ou Rhinoceros, *Fam.* III. *Genre* VI. *n.* 2. p. 85.
Torcol, eſpece de Pic, *Fam.* III. *Genre* II. *n.* 14. p. 81.
Totac de la nouvelle Eſpagne, *Fam* IV. *Genre* VII. *Tribu* III. *n.* 20. p. 120.
Totan, *Fam.* IV. *Genre* XII. *n.* 1. p. 142.
Toucan, ou Pie du Breſil, *Fam.* III. *Genre* XVII. *n.* 1. p. 85.
Tourdelle ou Pie-Grieche d'Albin, eſpece de Grive *Fam.* IV. *Genre* V. *n.* 10. p. 107.

Tourterelle. *Fam.* IV. *Genre* XVII. *n.* 12. p. 161.
Tourterelle des Indes, *ibid. n.* 13. p. 161.
Tourterelle ou Colombe de Portugal, *ibid. n.* 14.
Tourterelle ou Colombe de la Jamaïque, *ibid. n.* 15.
Tourterelle de la Caroline, *ibid. n.* 17. p. 162.
Tourterelle des Indes Orientales, *ibid. n.* 19. p. 162.
Petite Tourterelle de Cateſby, *ibid. n.* 24. p. 162.
Tourterelle de mer, *Fam.* VII. *n.* 1. p. 190.
Traguet d'Albin, eſpece d'Ortolan, *Fam.* VI. *Genre* X. *Tribu* II. *n.* 2. p. 129.
Trembleur, eſpece de Canard, *Fam.* V. *Genre* I. *n.* 6. p. 176.
Trompette de Brac, p. 85.
Tropitotle, Vautour, p. 89. *n.* 8.
Tunitien, eſpece de Faucon, *n.* 4. p. 91.

V.

VAneau, *Fam.* II. *Genre* IV. *n.* 1. p. 73.
Vaneau des Indes, *ibid. n.* 20. p. 75.
Vautour, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* II. p. 88.
Vautour doré, *ibid. n.* 1. p. 88.
Vautour à Lievre, *ibid. n.* 2. p. 89.
Vautour couleur châtain, nommé Faux Perdrieux, *ibid. n.* 3. p. 89.
Vautour d'Albin, nommé Aigle du Soleil, *ibid. n.* 4. p. 89.
Vautour cendré, *ibid. n.* 5. p. 89.
Vautour blanc, *ibid. n.* 6. p. 90.
Vautour Aigle, *ibid. n.* 7. p. 90.
Vautour du Breſil, Urubu du Breſil, Tropitotle d'Hernandez, Aura de Nieremberg, *ibid. n.* 8. p. 89.
Vautour, nommé Cuntur, *ibid. n.* 9. p. 89.
Vautour Moine, *ibid. n.* 10. p. 90.
Vautour Faucon, *Fam.* IV. *Genre* I. *Tribu* III. *n.* 1. p. 90.
Vautour marin, eſpece de Mouette, *Fam.* V. *Genre* II. *n.* 3. p. 180.
Verdier, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* III n. 6. p. 132.
Verdier d'Albin, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* IV, *n.* 4. p. 133.
Urubu, Vautour du Breſil, *Fam.* IV. *Genre* I. *n.* 8. p. 77.
Urutaurana, ou Urutavi, Aigle du Breſil, *Fam.* IV. *Genre* I. *n.* 8. p. 87.

X

XOchitenacalt, Pie de mer du Breſil, *Fam.* III. *Genre* VI. *n.* 1. p. 85.
Xomolt, eſpece de Pinçon de Seba, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* V. *n.* 11. p 138.

Y.

YAyauhquitotolt, Oiſeau de la nouvelle Eſpagne, *Fam.* IV. *Genre* XV. *Tribu* I. *n.* 4. p. 148.
Yrzquauhtli, eſpece de Corneille, *Fam.* IV. *Genre* II. p. 100. *n.* 11.

Z.

ZIvola, eſpece d'Ortolan, *Fam.* IV. *Genre* X. *Tribu* II. *n.* 3. p. 129.

---

## *Table du premier Ordre de la Claſſe des* AMPHIBIES, *Animaux qui ont des pieds, avec les Genres & les Eſpeces auxquels ils appartiennent, ſuivant les méthodes de MM.* LINNÆUS *&* KLEIN.

A.

AGuaquaquan, Crapaut du Breſil, *Ordre* I *Genre* II. *n.* 2. & 8. p. 209.
Alligator, Crocodile d'Afrique & des Indes Occidentales, *Ordre* I. *Genre* III. *n.* 1-3.
Ameira, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 9. 15. p. 219.
Aquaqua, Crapaut du Breſil, p. 209.
Argus, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 9. p. 213.
Aſcalabos, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 1. & 2. p. 217. 218.
Aycuraba, Lézard, *n.* 30. p. 215.

B.

Basilic, Dragon volant, ou Lézard volant, *Ordre* I. *Genre* III. n. 2. à la fin.
Brochet de Rochefort, Salamandre, p. 223. 224.

C.

Cagado, Tortue des Indes, p. 203. *n.* 3.
Cameleon, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* X. *n.* 1. 2. 3. 4. p. 225.
Carett, Tortue de Mer, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* II. *n.* 3. p. 205.
Caïman, Crocodile de Surinam & de l'Amérique, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* 1. *n.* 4. p. 111.
Coffre, Tortue de Mer, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* II. *n.* 5. p. 205.
Cordile, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* VII. *n.* 1. 2. 3. p. 222.
Crapaut, *Ordre* I, *Genre* II *art.* II. *n.* 1. p. 208.
Crapaut du Brefil, *ibid. n.* 2. p. 209.
Autre, *ibid. n.* 3. p. 209.
Petit Crapaut de l'Amérique bigarré, *ibid. n.* 4. p. 209.
Crapaut cornu & épineux de la Virginie, *ibid. n.* 5. p. 209.
Crapaut rare de l'Amérique, *ibid. n.* 6. p, 209.
Crapaut d'Afrique, *ibid. n.* 7. p. 209.
Crapaut du Brefil, nommé Aguéquaquan, *ibid. n.* 8. p. 209.
Crapaut de l'Amérique, nommé Pipal, *ibid. n.* 9. p. 209.
Petit Crapaut de l'Amérique, *ibid. n.* 10. p. 209.
Crapaut de Pruſſe, *ibid. n.* 11. p. 209.
Crocodile, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* I. *n.* 1. p. 211.
Crocodile de l'Amérique, *ibid. n.* 2. p. 211.
Crocodile des Indes Occidentales, *ibid. n.* 3. p. 211.
Crocodile, nommé Caïman, *ibid. n.* 4. p. 211.
Cutezpallin, Lézard du Mexique, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 29. p. 215.

D.

Dragon volant, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p. 216.
Dragon du Brefil, p. 218.

G.

Galeotes, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p 218.
Gekkos, espece de Salamandre, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* VI. *n.* 1. 2. 3. 4. 5. p. 222.
Grenouille vulgaire, *Ordre* I. *Genre* II. *art.* I. *n.* 1. p. 206.
Grenouille de l'Amérique, *ibid. n.* 2. p. 206.
Grenouille de Surinam. *ibid. n.* 3. p. 206.
Autre, *ibid. n.* 4. p. 206.
Grenouille de la Virginie, *ibid. n.* 5. p. 206.
Autre, *ibid. n.* 6. p. 206.
Grenouille du Bresil, *ibid. n.* 7. p. 206.
Grande Grenouille de la Virginie, *ibid. n.* 8. p. 206.
Grenouille grise de la Virginie, *ibid. n.* 9. p. 206.
Grenouille de mer de l'Amérique, *ibid. n.* 10. p. 206.
Grenouille terrestre de la Virginie, *ibid. n.* 11. p. 207.
Grenouille d'eau, *ibid. n.* 12. p. 207.
Grenouille d'arbre, *ibid. n.* 13. p. 207.
Petite Grenouille du Bresil, *ibid. n.* 14. p. 207.
Grenouille, nommée Lemnia, *ibid. n.* 15. p. 207.
Grenouille tachetée d'Afrique, *ibid n.* 16. p. 207.
Grenouille d'eau de l'Amérique, *ibid. n.* 17. p. 207.
Grenouille de l'Amérique, marbrée de brun, *ibid. n.* 15. p. 207.
Grenouille de M. Linnæus, la même que *n.* 9. p. 207. & 208.
Autre Grenouille, *n.* 20. p. 208.
Grenouille aquatique, *ibid. n.* 21. p. 208.

I.

Jaboti, Tortue, *Ordre* I. *art.* I. *n.* 3. p. 203. & *n.* 8. p. 203.
Jekko, Salamandre, p. 220 Voyez Gekko.
Iguana, Lézard d'Amboine, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p. 218.
Jubeti, Tortue du Bresil, *Ordre.* I. *Genre* I. *art.* I. *n.* 5. p. 203.
Jurucua, Tortue de mer du Bresil, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* II. *n.* 2. p. 203.

K

KAgado d'Acao, Tortue de la nouvelle Eſpagne, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* I. *n.* 7. p. 203.
Kemphanem, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III *n.* 2. p. 218.
Kolotes, Lézard, p. 218.

L.

LEguana, Lézard de Surinam, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p. 218.
Leguana de Bontius, *ibid.* p. 218.
Lemnia, eſpece de Grenouille, p, 207. *n.* 15.
Lézards, *Ord.* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 1. *& ſuiv.* p. 210 *& ſuiv.*
Lézard volant, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 42. p. 216.
Lézard ſolaire, *Ordre* I. p. 218.
Linguana, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p. 217.

M.

MAyouba, p. 223. n. 4.
Mydas, Tortue de Caraſſau, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* I. *n.* 4. p. 203.

N.

NArtaruga, Tortue de mer du Breſil, p. 204. *n.* 2.

O.

OPhiomachus, ou Dragon volant, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. *p.* 218.

P

PIpa, Grenouille du Breſil, p. 206. *n.* 7.
Pipal, Crapaut de l'Amérique, *Ordre* I. *Genre* II. *art.* II. *n.* 9. p. 209.

Q.

QUetzpaleo, Lézard du Breſil, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 28. p. 218.

S.

## S.

Salamandre, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* V. *n.* 1. p. 220.
Grande Salamandre de l'Amérique, *ibid. n.* 2. p. 221.
Petite Salamandre aquatique, *ibid. n.* 3. p. 221.
Petite Salamandre brune, *ibid. n.* 4. p. 221.
Salamandre aquatique de l'Amérique, *ibid. n.* 5. p. 221.
Saurus ou Tejuguacu, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 52. p. 217.
Sauvegarde, Lézard de l'Amérique, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 5.
Scinq, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* IX. *n.* 1. 2. 3. 4. p. 223.
Senembi, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p 217. & 218.
Seps, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* IX *n.* 1. 2. p. 224. *n.* 1.
Soager, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. p. 218.

## T.

Talatec, Lézard de la nouvelle Espagne, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 27. p. 215.
Tamacolin, Lézard de la nouvelle Espagne, *Ordre* I. *Genre* III. p. 215. II. *n.* 27. & *art.* III. *n.* 2.
Tapayaxin, Lézard de la figure des Salamandres, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* IV. *n.* 11.
Taraguico-Aycurabà, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 30 p. 215.
Taraguira, Lézard, *Ordre* I. *art.* II. *n.* 20. p. 214.
Tartaruga, Tortue de mer, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* II. *n.* 2. p. 204.
Tecuixim, Lézard, *Ordre.* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 7. p. 218.
Tecunhana, Lézard du Brésil, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 21. p. 214.
Tegujuacu, Lézard de l'Amérique, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 7. p. 213.
Tejuguacu, Lézard de l'Isle de Ceylan, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 31. 52. p. 214.
Temapara, Lézard de l'Amérique, *Ordre I. Genre* III. *art.* II. *n.* 16. p. 214.
Texixincoyolt, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 7. p. 213.
Texotzin-Guanes, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 1. p. 212.

Tileuetzpallin, Lézard de la nouvelle Espagne, *Ordre* I. *Genre* III. *art* II. *n.* 6. p. 213.
Tortue de terre, *Ordre* I. *Genre* I. *art.* I. *n.* 1. p. 202.
Grande Tortue des Indes, *ibid. n.* 2. p. 203.
Tortue de terre du Brefil, nommée Jaboti, *ibid. n.* 3. p. 203.
Tortue de Curaſſau, nommée Mydas, *ibid. n.* 4. p. 203.
Tortue du Brefil, nommée Jubeti, *ibid. n.* 5. p. 203.
Tortue de l'Iſle de Ceylan, *ibid. n.* 6. p. 203.
Tortue de la nouvelle Eſpagne, nommée Kagadu d'Agao, *ibid. n.* 7. p. 203.
Petite Tortue d'Amboïne, *ibid. n.* 8. p. 203.
Autre, *ibid. n.* 9. p. 203.
Tortue de l'Iſle de Ceylan, *ibid n.* 10. p. 203.
Tortue des Indes Orientales, *ibid. n.* 11. p. 203.
Tortue de mer, *Genre* I. *art.* II. *ibid. n.* 1. p. 204.
Tortue de mer du Breſil, *ibid, n.* 2. p. 204.
Tortue de mer, nommée *Carett*, *ibid. n.* 3. p. 205.
Tortue franche, *ibid. n.* 4. *p.* 205.
Tortue de mer, nommée Coffre, *ibid. n.* 5. p. 205.
Petite Tortue de mer de Seba, *ibid. n.* 6. p. 205.
Tortue de l'Amérique, *ibid. n.* 7. p. 205.
Tupinambis, Lézard Amphibie de l'Amérique, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* II. *n.* 50. p. 216.

Y.

Yviana d'Oviedo, Lézard, *Ordre* I. *Genre* III. *art.* III. *n.* 2. de Wormius, *ibid.* p. 218.

# TABLE DES SERPENS.

*Second Ordre de la Claſſe des Amphibies, avec leurs Genres & leurs Eſpeces.*

A.

Acontias, *Ordre* II. p. 241.
Æſping, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 19. p. 234.
Ahaetulla, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 14. p. 233.
Ammobate, Couleuvre, p. 238.

Ammodyte Serpent, *Ordre* II. *Genre* IV. n. 20. p. 237.
Amphysbœne, Serpent, *Ordre* II. *Genre* II. p. 227.
Amphysbœne de Ceylan, *ibid.* p. 227.
Amphysbœne d'Amboine, *Genre* III. p. 228.
Anacandaia, p. 241.
Anacandra, Serpent, *Genre* V. p. 238.
Anguigena, p. 241.
Antrachina, p. 241.
Anvoye ou Aveugle, Serpent, *Ordre* II. *Genre* I. p. 227.
Autre Anvoye, *Genre* III. p. 228.
Apamea, Serpent, *Ordre* II *Genre* II. p. 227.
Apachycoalt, Couleuvre, *Genre* IV. *n.* 4. p. 220.
Apoa, p. 242.
Argus, *ibid.*
Aspic, *ibid.*
Ataligato, *ibid.*

B.

Bali-Salan-Boekit, Serpent, p. 242.
Bayhapua, Serpent, p. 242.
Bitin, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 22. p. 236.
Bochir, Serpent, p. 242.
Boicocininga, Serpent, *Ordre* II. *Genre* VI. p. 240.
Boiguacu, Serpent, *Ordre* II. *Genre* V. p. 238.
Bojobi, Serpent, p. 242.
Boiquatrara, *ibid.*
Boitapio, Serpent, *ibid.*
Boyana, Serpent, *ibid.*

C.

Cabo, Serpent, p. 242.
Caracara, Serpent, *ibid.*
Caracoras, Serpent, p. 243.
Cayata, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Cencoatel, Couleuvre, *Genre* IV. *n.* 3. p. 229.
Cencoatl. *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 335.
Cenchrias d'Amboine, p. 241.
Cenchris, Serpent, *Ordre* II. *Genre* V. p. 238.
Cenchrus, Serpent, *ibid.*
Ceraste, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 236.
Chayquarada, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 1.
Chelydrus, Serpent, p. 243.
Chiameta, Serpent, *ibid.*

Cobella, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 18. p. 234.
Cobra, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Cobras de Cabelos, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 7. dans la note, p. 230.
Cobra de Cabelo, *ibid.* p. 231.
Coecuba, Serpent, p. 242.
Couleuvres, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 1. jusqu'à 26. p. 228. *& suiv.*

D.

DAme des Serpens, *Ordre* II. *Genre* VI. p. 239.
Depone, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 27. p. 238.
Dipsas, p. 238. p. 243.
Driynus, Serpent, p. 243.
Duberria, Serpent, *ibid.*

E.

EChis, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Empereur, Serpent, p. 243.
Encetra, Serpent, *ibid.*
Esculape du Bresil, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 7. à la fin de la note, p. 232.

G.

GIboya, ou Jaboya, Serpent, *Ordre* II. *Genre* V. p. 238.
Gliricapa, p. 243.
Guacu, Serpent, *ibid.*

H.

HÆmacathes, Serpent, p. 243.
Hotambaia, *ibid.*
Hippo, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 15. p. 234.
Hydre, Serpent, p. 243.

I.

JAcua-Acanga, Serpent, p. 244.
Jakana, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Jararæca, Couleuvre, *ibid.*
Javara-Epeba, p. 244.
Ibiara, Serpent, *Ord.* II. *Genre* II. p. 221. p. 244.
Ibiboca, Couleuvre, *Genre* IV. *n.* 15. p. 234.
Ibirakoa, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Inteſtin, Serpent, p. 244.

K.

Ikkanetta, Serpent, p. 244.
Koppar-Orm, nom Suedois donné à un Anvoye, *Genre* III.

L.

Lemnia, Serpent, p. 244.
Lentiſque, Serpent, *ibid.*
Lyrica, Serpent, *ibid.*

M.

Macacoalt, Serpent, p. 244.
Macoatl, *ibid.*
Malpolon, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 15. p. 234.
Mamballa, Serpent, p. 244.
Mangonizo, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 236.
Maraſſus, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 236.
Millio, Serpent, p. 244.
Moluros, *ibid.*
Myrus, *Ordre* II. *Genre* II.

N.

Naia, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 6. p. 230.
Autre Naia, *n.* 7. p. 230. 231.
Nepa, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Ninbo-Quanque Cholla, Serpent, p. 244.

O.

Ormiaſlo, nom Suedois, donné à une eſpece d'Anvoye, *Genre* III.

P.

Paraguajana, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 236.
Pela, Serpent, p. 244.
Petola, Couleuvre, *Ord.* II. *Genre* IV. *n.* 5. p. 229.
Petzcoal, Serpent, p. 245.
Phyticus, Serpent, *ibid.*
Pimberan, Serpent. *Ordre* II. *Genre* V. p. 238.
Polonga, Serpent, p. 245.

Prince Asmodée, Serpent du Japon, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 236. 245.

R.

REine des Serpens, *Ordre* II. *Genre* V. p. 239.
Roi des Serpens, p. 245.
Rotange, Serpent, *ibid.*

S

SColopax, Serpent p. 245.
Scytale, Serpent, *Ordre* II. *Genre* III. p. 228.
Sega, Serpent, p. 245.
Sepedon, Serpent, *ibid.*
Serena, Serpent, *ibid.*
Serpent des Indes, couronné, ou à lunettes, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 7. à la note, p. 227.
Serpent étranger, *Ordre* I. *Genre* V. p. 238.
Serpent d'arbre, *ibid.*
Serpent à figure d'yeux, *ibid.*
Serpent à sonnette, *Ordre* II. *Genre* VI. p. 239.
Serpens de différens Païs, p. 245.
Serreur, *Constrictor*, Serpent, *Ordre* II. *Genre* V. p. 238.
Sibon, Couleuvre, *n.* 11. p. 233.
Stupide, Serpent, *Ordre* II. *Genre* V.

T.

TAcuman, Serpent, p. 246.
Talie-boebot, Couleuvre-Serpent, p. 243.
Tamacailla-Huilia, Serpent, p. 246.
Tamachia, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Tesauchcoatl, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 23
Teuhtlacet-zauhqui, Serpent, *Ordre* II. *Genre* VI. p. 240.
Textilia, Serpent, p. 246.
Titu, Serpent, *ibid.*
Tlehua, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 27. p. 238.
Tojuqua, Serpent, p. 246.

V.

VIpere, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p. 235.
Vipere, *ibid.* *n.* 20. p. 235. 236.
Vipere à sonnette de l'Amérique, *Ordre* II. *Genre* VI. p. 240.

Autre, de l'Amérique, *ibid.*
Autre, des Indes Orientales, *ibid.*
Autre, de l'Amérique, *ibid.*

X.

Xalxalhua, Couleuvre, *Ordre* II, *Genre* V. *n.* 27. p 238.

Z.

Zeboa, Couleuvre, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 20. p.236.

## TABLE DE LA CLASSE DES POISSONS.

*Avec les Ordres, les Genres, & les Eſpeces où ils ſont rangés ſuivant la méthode d'Artedi.*

A.

ABLE, ou Ablette, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 24. p. 309.
Abucatuxia, *Ordre* IV. *Genre* VIII. *n.* 2. p. 287.
Acarauna, *Ordre* IV. *Genre* VI. *n.* 2. 3. p. 284. 285.
Agone, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 3. p. 322.
Aigle, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 5. p. 255.
Aiguillat, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 3. 4. p. 258. 259.
Albo des Italiens, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 41. p. 312.
Albula (grand), *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 1. p. 327.
Albula (petit), *ibid.*
Albula (très-petit), *ibid. n* 2.
Albula d'Amboïne, *ibid. n.* 5. p. 329.
Alec, eſpece de Hareng, *Ordre* IV. *Genre* IV. p. 321.
Aloſe, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 3. p. 322.
Altavela, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 4. p. 255.
Ammodytes, ou Anguille de ſable, *Ordre* V. *Genre* XVII. p. 334.
Anableps, *Ordre* V *Genre* XIX. p. 337.
Anchois, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 4. p. 323.
Ange, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 6. p. 259.
Anguille de ſable, *Ordre* V. *Genre* XVII. p. 334.
Anguille, *Ordre* V. *Genre* XVIII. *n* 1. p. 334.
Antacée du Boryſthene, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 2. p. 263.
Anthie, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 9. p. 280.
Aphys-Goujon, *Ordre* IV. *Genre* XII. *n.* 4. p. 294.
Aphys de Schoneveld, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 4. p. 304.
Apron, *Ordre* IV. *Genre* XVIII. *n.* 3. p. 301.

Araigne de mer, Dragon de mer, ou Vive, *Ordre* IV. *Genre* XVII. *n.* 1. p. 298.
Aſp des Suedois, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 21. p. 309.
Aſpredo, *Ordre* IV. *Genre* XIV p. 296.
Atinga, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 17. & 18. p. 269.

B.

Bague, *Ordre* IV. *Genre* XIII. p. 296.
Baleines, *Ordre* I. *Genre* I. II. III. IV. p. 250.
Bambele, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 3. p. 304.
Barbeau, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 2. *p.* 304.
Barbillon, *ibid.*
Bécaſſe de mer, *Ordre* III. *Genre* IV. *n.* 6. p. 270.
Bezole, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 1. p. 327.
Bid ou Blinds des Anglois, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 16.
Biorka, Biorkna, Biorkfiſch, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 26. p. 310.
Blenne de mer, *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 7. p. 287.
Blicke, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 30. p. 310.
Bogue, ou Bogue Ravel, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 6. p. 274.
Bonite, *Ordre* IV. *Genre* XI. *n.* 4. p. 292.
Bordeliere, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 29. p. 310.
Boulerot noir, ou Goujon marin, *Ordre* IV. *Genre* XII. *n.* 2. p. 294.
Autre Boulerot, *ibid. n.* 2.
Boulerot blanc, *ibid. n.* 3.
Breme, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 27. p. 310.
Brochet, *Ordre* V. *Genre* IX. *n.* 1. p. 329.
Brochet-Perche, ou Nagmaul des Allemands, *Ordre* IV. *Genre* XVIII *n.* 2. p. 300.
Buſolt, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 5. p. 267.
Bubulca, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 32. p. 311.
Buffe des Anglois, *Ordre* IV. *Genre* VIII. *n.* 4. p. 301.
Butterfiſch des Anglois, *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 5. p. 283.

C.

Cabiliau, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 9. p. 314.
Cabot, *Ordre* IV. *Genre* VII. p. 286.
Cantheno, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 2. p. 273.
Canus, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 13. p. 281.
Callicthys, *Ordre* IV. *Genre* IX. p. 287.

Capelan, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 17. p. 316.
Carapo du Breſil, *Ordre* V. *Genre* XV. p. 333.
Cardaire, eſpece de Raie, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 11. Voyez Raie.
Carpe, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 6. p. 305.
Catodon, Poiſſon cetacée, *Ordre* I. *Genre* II. p. 249.
Celerin, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 1. p. 322.
Centrine, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 5. p. 259.
Chabot, ou Goujon de riviere, *Ordre* IV. *Genre* XV. *n.* 1. p. 296.
Chætodon, *Ordre* IV. *Genre* VII. *n.* 1. 2.
Charbonnier, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 2. p. 312.
Chat de rocher, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 12. p. 261.
Chien de mer étoilé, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 2. p. 258.
Chien de mer bleu, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 13. p. 261.
Chromis, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 10. p. 275.
Congre, *Ordre* V. *Genre* XVIII. *n.* 2. p. 335.
Copſo ou Colpeſce, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 2. p. 262.
Coquillade, *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 4. p. 283.
Corbeau de mer, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 4. p. 289.
Corp de Rondelet, *Ordre* IV. *Genre* I. *n.* 2. p. 272.
Curimata, *Ordre* V. *Genre* XIII. *n.* 1. p. 327.

## D.

DArd, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 16. p. 308.
Dauphin, *Ordre* I *Genre* V. *n.* 2. p. 252.
Dentale, *Ordre* IV. *Genre* II *n.* 5. p. 274.
Derbio, *Ordre* IV. *Genre* XI. *n.* 5. p. 290.
Donzelle, *Ordre* IV. *Genre* V. *n.* 1. 2. 3. p. 284.
Donzelline, *Ordre* V. *Genre* II *n.* 12.
Dorade, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 1. p. 272. 273.
Dorée, *Ordre* IV. *Genre* VIII. *n.* 1. p. 286. 287.
Dragon de mer, ou Vive, *Ordre* IV. *Genre* XVII. *n.* 1. p. 298.
Dragoncule, ou Lézard de mer, *Ordre* IV. *Genre* XV. *n.* 5. p. 296.

## E.

EGlefin, ou Ægrefin, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 4. p. 312.
Eguille, *Ordre* V. *Genre* IX. *n.* 2. 3. p. 330.
Elops, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 1. p. 202.
Emiſole, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 2. p. 258.
Empereur, Epée, ou Eſpadon, *Ordre* IV. *Genre* XIII. p. 295.
Eperlan, *Ordre* V. *Genre* VII. *n.* 1. p. 326.

Esquisele, *Ordre* V. *Genre* IV. p. 321.
Esturgeon, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 1. p. 262. *n.* 5. p. 263.
Exocet, *Ordre* V. *Genre* XI. p. 331.

F.

FAren, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 28.
Farra, Ferra, Pala, *Ordre* V. *Genre* VII. *n.* 16.
Fiatola, *Ordre* V. *Genre* IV. p. 333.
Fin-Fisch, Baleine, *Ordre* I. *Genre* IV. *n.* 2. *p.* 251.
Fisgurn des Allemands, *Ordre* V. *Genre* XIII. p. 332.
Flacopsaro, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 1. 2. 3. p. 267.
Fletan, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 3. p. 318.
Flez, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 4. p. 318.
Flossade, espece de Raie, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 8. p. 256.
Folio, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 11. p. 320.
Foulon, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 6. p. 255

G.

GAlanga, ou Grenouille Pêcheur, *Ordre* III. *Genre* I. *n.* 1. p. 265.
Gaperva de Marcgrave, *Ordre* III. *Genre* IV. *n.* 1. 2. 3. 4. 5.
Gardon, *Ordre* V. *Genre* I. *n* 10. p. 306.
Gattorugine, *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 2. p. 282.
Girella, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 7 p. 279.
Goberge, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 18. p. 317.
Goifon, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 14. p. 307.
Goujon Vairon, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 14. p. 307.
Goujon marin, ou Boulerot noir, *Ordre* IV. *Genre* XII. *n.* 1.
Goujon de riviere, *Ordre* IV. *Genre* XV. *n.* 1. & 2. p. 296.
Goujon Vairon, ou Goifon, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 14.
Grenouille Pêcheur, *Ordre* III. *Genre* I. *n.* 1. p. 265.
Grive, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 4. p. 278.
Grislagine, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 11. p. 306.
Guajacuja, *Ordre* III. *Genre* I. *n.* 2. p. 266.
Guamajacu-Atinga, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 18.
Guaperva, *Ordre* III. *Genre* IV. *n.* 1. *& suiu.* p. 270.
Guaracapema, *Ord.* V. *Genre* IV. *n.* 1.
Guebucu, *Ordre* IV. *Genre* XI. p. 295.
Guiniad, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 1.
Gurnard des Anglois, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 8. p. 290.

H.

HAreng, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 1. p. 321.
Hautin, ou Outin, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 4. p. 329.
Hautin de Belon, *Ordre* V. *Genre* XII. p. 331.
Hippocambe, *Ordre* V. *Genre* XX. *n.* 1. p. 337.
Hirondelle de mer, ou Corbeau de mer, *Ordre* IV *Genre* X. *n.* 4. p. 289.
Hirondelle de mer, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 6 p. 290.
Huch des Allemands, *Ordre* V. *Genre* VI. *n.* 5.
Huſen des Allemands, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 2.
Hvasſbuk, *Ordre* V. *Genre* IV *n.* 2. p. 322.

J

JAguacare, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 15. p. 281.
Ichthyocolla, *Ordre* II. *Genre* III. *n.* 2. p. 262.
Jeſes, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 33. p. 312.
Iperuguiba, *Ordre* V. *Genre* X p. 331.
Juamajacu Atinda, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 18. p. 269.
Juſcle, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 7. p. 274.

K

KAraſſe & Karayche, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 8. p. 306.

L.

LAbre, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 16. 17. 18. p. 281.
Lamantin, *Ordre* I. *Genre* I. p. 249.
Lampugo. *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 1. p. 320.
Lamie, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 14. p. 261.
Lamproie de riviere, *Ordre* II. *Genre* IV. *n.* 1. p. 263.
Lamproie de mer, *ibid.* *n.* 2. p. 264.
Lamproie aveugle. *ibid.* *n.* 3. p. 264.
Lavaret, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 1. p. 327.
Leopard, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 18. p. 217.
Lézard de mer, *Ordre* IV. *Genre* XIII. *n.* 5. p. 296.
Lézard étranger, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 2.
Lievre marin, *Ordre* III. *Genre* II.
Limande, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 2. p. 318.
Loche piquante, *Ordre* V. *Genre* XIII. *n.* 1. p. 332.
Loche franche, *ibid.* *n.* 2. *ibid.*
Lote, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 11. p. 315.
Loup de mer, ou Lubin, *Ordre* IV. *Genre* XVIII. *n* 7. p. 302
Loup marin, *Ordre* V. *Genre* XVI. p. 334.
Lubin, *Ordre* IV. *Genre* XVIII. *n.* 7. p. 302.
Lump des Anglois, *Ordre* III. *Genre* II. p. 266.
Lumpen, *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 6. p. 281.

Lune ou Mole, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 4. p. 267.
Lyra, *Ordre* IV. *Genre* XVII. *n.* 3. p. 299.

M.

MAlarmat, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 10. p. 291.
Manati, *Ordre* I. *Genre* I. p. 249.
Maquereau, *Ordre* IV. *Genre* XI. *n.* 1. p. 291.
Marſouin, *Ord.* I. *Genre* V. *n.* 1. p. 252.
Marteau, ou Zygene, ou Poiſſon Juif, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 7. p. 274.
Mendole, ou Juſcle, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 7. p. 274.
Merlan, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 1. p. 312.
Merlan de la petite eſpece, *ibid. n.* 7. p. 314.
Merle de mer, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 12. p. 281.
Merlu, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 8. p 314.
Meſoro. *Ordre* IV. *Genre* IV. *n.* 1. p. 282.
Meunier, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 7. p. 305. *n.* 13. p. 307. *n.* 34. p. 311.
Milan de mer, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 5. p. 289.
Milandre, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 9. *p.* 260.
Mirallet, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 7. p. 255.
Miſgürn, ou Fiſgurn des Allemands, *Ord.* V. *Genre* XIII. *n.* 3. p. 332.
Mole, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 4. p. 362. *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 1. p. 278.
Morme, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 9. p. 275.
Morrude, *Ordre* IV. *Genre* X *n.* 7. p. 290.
Morrue, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 9. *n.* 10. p. 315.
Morrue verte, *ibid. n.* 15. p. 316.
Muge volant, *Ordre* V. *Genre* XI.
Mulet, *Ordre* IV. *Genre* X. *n.* 1. p. 288. & 289.
Roi des Mulets, *ibid. n.* 3.
Murene, *Ordre* V. *Genre* XVIII. *n* 6. p. 336.
Muſchebout, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 18. p. 317.
Muſtele, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 12. p. 315.
Myrus, *Ordre* V. *Genre* XVIII. *n.* 3. p. 335.

N.

NAgmaul des Allemands, *Ordre* IV. *Genre* XVI. *n.* 2. p. 300.
Narhval des Iſlandois, *Ordre* I. *Genre* III. p. 250.
Naſe ou Naſen, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 19. p. 309.

Nasterling, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 22. p. 309.
Nigreil, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 14. p. 277.
Nord-Kaper, *Ordre* I. *Genre* V. *n.* 3. p. 252.

O.

Ombre de mer, *Ordre* IV. *Genre* I. *n.* 1. p. 271.
Ombre du Lac de Genève, *Ordre* V. *Genre* VI. *n.* 7. p. 325.
Ombre de riviere, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 3. p. 328.
Orca, ou Norkaper, *Ordre* I. *Genre* V. *n.* 3. p. 252.
Orchere, *Ordre* IV. *Genre* XIX. *n.* 1. 2. 3. p. 302. 303.
Orphe, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 11. p. 276.
Ostracion, *Ordre* III. *Genre* III. *n.* 1. 2. 3. *& suiv.* p. 267. *& suiv.*

P.

Pagel, *Ordre* IV. *Genre* II. n. 3. p. 273.
Pagre, *Ordre* IV. *Genre* II. *n.* 4. p. 273.
Pala, *Ordre* V. *Genre* VIII. *n.* 1.
Paon, *Ordre* IV. *Genre* III. *n.* 3. p. 278.
Paru, *Ordre* IV. *Genre* VI. *n.* 1. p. 284.
Pastenague, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 3. p. 253.
Pegouse, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 11. p. 320.
Pelamide, *Ordre* IV. *Genre* XI. *n.* 2. p. 292.
Perce-pierre, *Ordre* IV. *n* 3. p. 283.
Perche de riviere, *Ordre* IV. *Genre* XVIII. *n.* 4. p. 300.
Petite Perche de riviere, *ibid. n.* 4. p. 301.
Perche de Mer, *ibid. n.* 6. p. 301.
Perpeire, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 11. p. 320.
Picarel, *Ordre* IV. *Genre* II. n. 8. p. 275.
Picho, ou Pigo de Salvien, *Ordre* V. *Genre* I. *n.* 35. p. 311.
Pilchard, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 3. p. 323.
Plie, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 1. p. 317.
Pogge, *Ordre* IV. *Genre* XV. *n.* 4. p. 296.
Poisson Juif, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 7. p. 259.
Pole, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 5 p. 318.
Pollack des Anglois, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 3. p. 312.
Pompile, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 3 p. 321.
Porc ou Centrine, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 5. p. 259.
Porc de mer, ou Centrine, *ibid.*
Pouting, ou Pout, *Ordre* V. *Genre* II. *n.* 5. p. 312.
Pucelle, *Ordre* V. *Genre* IV. *n.* 3. p. 323.

Q.

Quarrelet, *Ordre* V. *Genre* III. *n.* 1. p. 317.

R.

Raie d'Ariſtote, *Ordre* II. *Genre* I. *n.* 1. p. 253.
Rai bouclée, *ibid. n.* 2. *p.* 253.
Raie, nommée Ronce, *ibid.* p. 253.
Raie, nommée Paſtenague, *ibid. n.* 3. p. 254.
Raie, nommé Altavela, *ibid. n.* 4. p. 255.
Raie, nommée Aigle, *ibid. n.* 5. p. 255.
Raie, nommée Foulon, *ibid. n.* 6. p. 255.
Raie, nommée Miraillet, *ibid. n.* 7. p. 255.
Raie, nommée Floſſade, *ibid. n.* 8. p. 256.
Raie ondée, *ibid. n.* 9. p. 256.
Raie, nommée Torpille, *ibid n.* 10. p. 256.
Raie étoilée, *ibid.*
Raie piquante de pluſieurs eſpeces, *ibid.*
Raie épineuſe, nommée Cardaire, *ibid.*
Rape, ou Rappe, Raubalet, *Ord.* V. *Genre* I. *n.* 31. p. 311.
Raſoir, *Ord.* V. *Genre* IV *n.* 1. & 2. *p.* 321.
Raſpecon, ou Tapecon, *Ord.* IV. *Genre* XVII. *n.* 2. p. 299.
Raubalet, *Ord.* V. *Genre* I. *n.* 31. p. 311.
Remora, *Ord.* V. *Genre* X. p. 330
Renard, *Ordre* II. *Genre* II *n.* 8. p. 260.
Rexvon-Ruy de Gronovius, *Ord.* V. *Gen.* I. *n.* 37. p. 312.
Rhinobate, *O.* II. *G.* I. *n.* 1. p. 253.
Rhomboïde de Rondelet, *O.* V. *G.* III. *n.* 11. p. 320.
Roi des Poiſſons, du Genre des Carpes, *O.* V. *G.* I. *n.* 20. p. 309.
Roi des Mulets, *O.* IV. *G.* X. *n.* 3. p. 289.
Ronce, *O.* II. *G.* I. *n.* 2. p. 253.
Rootaug, *O.* V. *G.* I. *n.* 18. p. 308.
Roſſe, *O.* V. *G.* I. *n.* 15. p. 308.
Rotele, *O.* V. *G.* I. *n.* 5. p. 306.
Rouget, *O.* IV. *G.* X. *n.* 7. p. 290. *n.* 9. p. 291.
Rouſſette, *O.* II. *G.* II. *n.* 10. & 11. p. 260. 261.
Ruſvorn de Gronovius, *O.* V. *G.* I. *n.* 36. p. 312.

S.

Salmarin, *Ord.* V. *Genre* VI. *n.* 12. p. 326.
Salvelin des Allemands, *O.* V. *G.* VI. *n.* 8. p. 325.
Sanglier, *O.* IV. *G.* VIII. *n.* 3. p. 287.
Sardine, *O.* V. *G.* IV. *n.* 3. p. 323.
Sargo, *O.* IV. *G.* II. *n.* 13. p 270.
Saumon, *O.* V. *G.* VI. *n.* 1. p. 323.
Saumon gris, *ibid. n.* 2. p. 323.

Saumon du Lac de Garde, *ibid. n.* 6.
Saumon du Lac de Genêve, *n.* 10. p. 325.
Petit Saumon, *ibid. n.* 11. p. 326.
Saupe, *O.* IV. G. II. *n.* 15. p. 277.
Saure ou Lézard étranger, *O.* V. G. VII. *n.* 2.
Scare, *O.* IV. G. III *n.* 6. 10. 11. p. 279. 280. 281.
Schroll des Allemands, *O.* IV. G. XVIII. *n.* 4. p. 301.
Schraitſer de Ratiſbone, *ibid. n.* 5. p. 301.
Scie ou Vivelle, *O.* II. G. II. *n.* 1. p. 257.
Scieurel, *O.* IV. G. XI. *n.* 3. p. 292.
Scorpeno, *O.* IV. G. XVI. *n.* 1. 2. p. 297. 298.
Scorpion marin, *O.* IV. G. XV. *n.* 3. p. 296.
Serpent marin, *O.* V. G. VVIII. *n.* 4. p. 336.
Serpent marin tacheté, *ibid. n.* 5.
Serran, *O.* IV. G. III. *n.* 8. p. 280.
Silure, *O.* V. G. II. *n.* 13. p. 316.
Soldat, *O.* IV. G. III. *n.* 14. p. 181.
Sole, *O.* V. G. III. *n.* 6. p. 319.
Sorge marine, *O.* V. G. II. *n.* 2.
Sorrat, *Ordre* II. *Genre* II. *n.* 14. p. 262.
Soufleur, *O.* I. G. VI. *n.* 1. 2. p. 253.
Spet, *O.* IV. G. XI. *n.* 6. p. 293.
Sparaillon, *O.* IV G. II. *n.* 12. p. 276.
Sterlett des Suedois, *O.* II. G. III. *n.* 3.
Suetolt, *O.* III. G. III. *n.* 5. p. 267.
Suiſſe, *O.* V. G. I *n.* 16. p. 308.
Surmulet, *O.* IV. G. X *n.* 1. p. 289.
Synaride ou Dentale, *O.* IV. G. II. *n.* 5. p. 274.

T.

TAmoata, *O.* IV. G IX. p. 288. & p. 333.
Tapecon, *O.* IV. G. XVII. *n.* 2. p. 299.
Taureau marin, ou Lamantin, *O.* I. G. I. p. 249.
Temelo, *O.* V. G. VIII. *n.* 3.
Tenche, *O.* V. G. I. *n.* 12. p. 307.
Tetart, *ibid. n.* 7.
Thon, *O.* IV. G. XI. *n.* 2. p. 292.
Tiburon, *O.* II. *n.* 14. p. 261.
Tiphle de Geſner, *O.* V. G. XX. *n.* 13. p. 337.
Tomelo, *O.* V. G. VIII. p. 338.
Torpille, *O.* II. G. I *n.* 10. p. 256.
Torsk des Suedois, *O.* V. G. II. *n.* 6. p. 314.
Tourd, *O.* IV. G. III. *n.* 4. 5. p. 278. 279.
Trochinus, *O.* IV. G. XVII. *n.* 1. *& ſuiv.*

Trompette de mer, O. V. G. XX. *n.* 4. p. 337.
Truite ſaumonée, O. V. G. VI. *n.* 3. p. 324.
Truite ordinaire, *ibid. n.* 4. *n.* 5. p. 324.
Truite, ou Saumon du Lac de Garde, *n.* 6. p. 325.
Truite, ou Saumon du Lac de Genêve, *n.* 10. p. 335.
Turbot ſans piquans, O. V. G. III. *n.* 8. p. 319.
Turbot piquant, non écailleux, *ibid. n.* 9. p. 320.
Turbot piquant, *ibid. n.* 10. p. 320.

V.

VAndoiſe, O. V. G. IV. *n.* 16. p. 308.
Vandoiſe de Suede, *ibid. n.* 17. p. 308.
Verdone, O. IV. G. III. *n.* 2. p. 278.
Veron, Goiſon, O. V. G. IV. *n.* 14. p. 307.
Veron, O. V. G. I. *n.* 1. p. 316.
Vetula, O. IV. G. VI. *n.* 3. p. 285.
Vilain, O. V. G. I. *n.* 7.
Vipere marine, O. V. G. XX. *n.* 2. p. 337.
Vive, O. IV. G. XVIII. *n.* 1. p. 298.
Vivelle. O. II. G. II. *n.* 1. p. 267.
Vrowfiſch de Ratiſbone, O. V. G. I. *n.* 39. p. 312.
Wapper des Allemands, O. V. G. I. *n.* 40. p. 312.
Wimba, O. V. G. I. *n.* 25. p. 329.
Wimba, O. V. G. VIII. *n.* 6. p. 309.

Z

ZErte, ou Blicke, O. V. G. I. *n* 30. p. 310.
Zygene, ou Marteau, O. I. G. II. *n.* 7. p. 259.

*Fin des Tables du premier Volume.*